

Probabilidade

Teoremas

Prof.: Wagner Pinheiro
wagner2235@gmail.com

Sumário

- 1 Teorema do Produto das Probabilidades
- 2 Independência Estocástica (ou Probabilística)
- 3 Teorema da Probabilidade Total
- 4 Teorema de Bayes

Teorema do Produto das Probabilidades

Visto que a probabilidade condicional de A na hipótese B (ou dado B) é

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (1)$$

A fórmula anterior é frequentemente usada na forma

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) \quad (2)$$

Esse resultado é conhecido pelo nome de teorema do produto das probabilidades (ou teorema das probabilidades compostas).

Para generalizar esse resultado para três eventos A , B , C , então, aplique (2) uma vez mais; segue-se então que,

$$P(A \cap B \cap C) = P[A|(B \cap C)] \cdot P(B|C) \cdot P(C)$$

As generalizações para quatro ou mais eventos saem diretamente.

Independência Estocástica (ou Probabilística)

No caso em que $P(A|B)$ entende-se que A é estocasticamente (probabilisticamente) independente de B . A expressão $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$ mostra que a condição $P(A|B) = P(A)$ pode ser escrita na forma

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Suponhamos agora três eventos A , B e C , tais que

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

a) $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

b) $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

Se os eventos A , B e C satisfazem a (a) e (b), eles são *mutuamente independentes*.

Teorema da Probabilidade Total

Será enunciado agora um teorema útil que relaciona a probabilidade de um evento com probabilidades condicionais, o qual é chamado Teorema da Probabilidade Total.


Os eventos B_1, B_2, \dots e B_n constituem uma partição de um espaço amostral Ω , se e somente se, as seguintes condições são verificadas.

- $B_i \cap B_j = \emptyset$ para $i \neq j$
- $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$
- $P(B_i) > 0$

Teorema da Probabilidade Total

Sejam B_1, B_2, \dots e B_n eventos *mutuamente exclusivos e exaustivos*.
Então, para um evento arbitrário A ,

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$



Teorema da Probabilidade Total

Para entendimento, note que é possível escrever A como a união de eventos mutuamente exclusivo, isto é,

$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$$

logo

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n)$$

Mediante aplicação da definição de probabilidade condicional onde teremos:

$$P(A|B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} \Rightarrow P(A \cap B_i) = P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

$$= \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

Exemplo

Uma urna contém 3 bolas brancas e 2 bolas amarelas. Uma segunda urna contém 4 bolas brancas e 2 amarelas. Escolhe-se, ao acaso, uma urna e dela retira-se, também ao acaso, uma bola. Qual a probabilidade de que seja branca?

Teorema de Bayes

Com base nas definições $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$ e $P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$ é possível estabelecer as seguintes relações, igualando-se ambas as expressões:

Sejam A e B dois eventos arbitrário com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, então

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Teorema de Bayes

A idéia a partir de agora é particionar Ω em conjuntos mutuamente exclusivos tais como B_1, B_2, \dots e B_n , cuja união, por definição, forma o espaço amostral $B_1, B_2, \dots, B_n = \Omega$. Combinando este resultado com o teorema da probabilidade total, temos como consequência,

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j) \cdot P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)}$$

para qualquer j onde os B_i representam um conjunto de eventos mutuamente exclusivos e exaustivos.

O resultado dado pela Equação acima é chamado Teorema de Bayes, e sua utilidade consiste em permitir-nos calcular a probabilidade a posteriori $P(B_j|A)$ em termos das informações a priori $P(A)$ e $P(B)$.

Exemplo

A urna A contém 3 fichas vermelhas e 2 azuis, e a urna B contém 2 fichas vermelhas e 8 azuis. Joga-se uma moeda “honesta”. Se a moeda der cara, extrai-se uma ficha da urna A ; se der coroa, extrai-se da urna B . Uma ficha vermelha é extraída. Qual a probabilidade de ter saído cara no lançamento?