GUIA PRÁTICO · 2026

TESTOSTERONA EM DIA.

Um passo a passo de 30 dias para cuidar da saúde hormonal masculina com hábitos sustentáveis, acessíveis e baseados em evidências.

1 SONO	2 MOVIMENTO	3 PESO E COMIDA	4 PREVENÇÃO	5 AVALIAÇÃO

Sem atalhos milagrosos. Sem hormônios por conta própria. Comece pelo que você consegue praticar hoje.

— VISÃO GERAL

COMECE PELO QUE IMPORTA

Hormônio não funciona como um botão. O foco é melhorar o contexto de saúde, e investigar sintomas quando for necessário.

A IDEIA CENTRAL

A perda de peso, quando há excesso de gordura corporal, e a atividade física são as primeiras medidas recomendadas para muitos casos de testosterona baixa associada à obesidade. Nenhum hábito isolado garante aumento em quem já tem níveis normais. **[1, 2]**

CINCO AÇÕES, NA ORDEM DE PRIORIDADE

1 **Durma de verdade**
Reserve tempo para 7 a 9 horas de sono e mantenha horários regulares.

2 **Mova o corpo**
Faça força 2 ou mais dias por semana e caminhe regularmente.

3 **Cuide do peso, se for o caso**
Ajuste a alimentação sem dietas radicais nem restrições extremas.

4 **Reduza o que atrapalha**
Diminua o álcool em excesso, não use anabolizantes e observe o sono.

5 **Investigue sintoma que não passa**
Teste só quando fizer sentido clínico. Exame isolado não basta.

Meta de hoje: anote a sua hora de dormir, os seus treinos atuais e se existe algum sintoma persistente. Esse é o ponto de partida do seu plano.

Material educativo. Não substitui consulta, diagnóstico nem tratamento médico.

PASSOS 01 E 02

SONO E MOVIMENTO

Comece por duas rotinas que também melhoram saúde geral, disposição, condicionamento e composição corporal.

1 · PROTEJA O SEU SONO

Meta: 7 a 9 horas para a maioria dos adultos. Priorize qualidade e constância. **[3]**

- Defina uma hora fixa para acordar.
- Crie 30 a 60 minutos de desaceleração antes de deitar.
- Deixe o quarto escuro, confortável e silencioso.
- Evite cafeína no fim do dia, se ela atrapalhar o seu sono.

2 · TREINE FORÇA E FAÇA CARDIO

Meta semanal: pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada e 2 sessões de fortalecimento. Pode distribuir em blocos curtos. **[4]**

SEMANA EXEMPLO

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Força: corpo todo	Caminhada 30 min	Força: corpo todo	Caminhada 30 min	Caminhada 30 min	Caminhada 30 min	Caminhada 30 min

Força simples: agachamento ou sentar e levantar, flexão adaptada, remada com elástico, ponte de glúteos e prancha. Comece leve, com 1 ou 2 séries, e progrida aos poucos.

Se você tem lesão, dor ou alguma condição de saúde, converse com um profissional antes de mudar a sua rotina de treino.

PASSO 03

COMIDA DE VERDADE

A alimentação ajuda principalmente por sustentar energia, nutrientes e um peso saudável, e não por existir um alimento mágico.

SE HÁ SOBREPESO OU OBESIDADE

Busque perda de peso gradual e sustentável, com orientação quando possível. Em homens com hipogonadismo funcional relacionado à obesidade, isso pode melhorar a testosterona. Dieta extrema não é o caminho. **[1, 2]**

UM DIA DE ALIMENTAÇÃO SIMPLES

Manhã	Ovos, fruta e aveia ou pão. Café sem exageros.
Almoço	Arroz, feijão, legumes e frango, ovos ou sardinha.
Lanche	Banana, iogurte natural ou fruta com amendoim.
Jantar	Repita uma refeição equilibrada e ajuste a porção à fome.

LISTA DE COMPRAS ACESSÍVEL

Arroz · feijão · ovos · sardinha · frango · aveia · banana · frutas da estação · verduras e legumes · leite ou iogurte, se você consome · amendoim.

Regra útil: varie os alimentos e inclua fontes de proteína, gorduras alimentares e vegetais. Não corte grupos alimentares sem necessidade.

PASSO 04

CORTE OS ATALHOS FALSOS

Parte da estratégia é deixar de lado práticas que podem comprometer a saúde ou criar falsa expectativa.

01

Álcool em excesso

Evite episódios de consumo pesado e reduza a frequência. Priorize noites com o sono preservado.

02

Anabolizantes

Não use testosterona nem esteroides por estética. Eles podem suprimir a produção natural e a fertilidade.

03

Ronco e apneia

Ronco alto, pausas respiratórias e sonolência durante o dia justificam avaliação médica.

[5]

04

Remédios e doenças

Alguns opioides e corticoides podem interferir. Nunca pare medicação sem conversar com o médico.

[1]

05

Testo boosters

Tribulus, misturas e nutracêuticos não têm evidência sólida para uso rotineiro.

[1]

06

Treino sem recuperação

Evite exagero. Progrida com descanso, alimentação suficiente e regularidade.

SUPLEMENTO NÃO É TRATAMENTO HORMONAL

Zinco, vitamina D e outros nutrientes devem ser avaliados conforme a dieta, o risco de deficiência e a orientação profissional. Corrigir uma deficiência pode ser importante, mas tomar dose alta sem indicação não garante elevar a testosterona.

PLANO DE AÇÃO

SEU DESAFIO DE 30 DIAS

Não busque perfeição. Marque os dias em que você cumpriu pelo menos 3 das 4 ações da rotina abaixo.

Semana 01

Organize o ambiente

Escolha a hora de dormir e de acordar, registre o sono, faça duas caminhadas e planeje os treinos.

Semana 02

Crie constância

Faça pelo menos 2 treinos de força e some caminhadas ao longo dos dias. Ajuste uma refeição.

Semana 03

Ajuste o básico

Aproxime-se dos 150 minutos de atividade moderada. Mantenha a rotina de sono e reduza excessos.

Semana 04

Consolide e revise

Repita o que funcionou. Compare sono, disposição, atividade e sintomas, não uma taxa ideal.

A ROTINA DE 4 PONTOS

- **Sono suficiente**
- **Movimento**
- **Refeições equilibradas**
- **Sem excessos evitáveis**

ACOMPANHE O SEU MÊS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Imprima esta página ou marque no celular. O que conta é a constância, não a nota.

ACOMPANHAMENTO

QUANDO PROCURAR UM MÉDICO

Sintoma que não passa merece investigação. Nem toda fadiga ou queda de libido é causada por testosterona baixa.

SINAIS QUE MERECEM CONVERSA CLÍNICA

- Queda persistente do desejo sexual.
- Menos ereções matinais ou disfunção erétil.
- Infertilidade ou dificuldade reprodutiva.
- Perda de massa muscular sem explicação.
- Cansaço importante e persistente.
- Fraturas ou perda de densidade óssea.

COMO É FEITA A CONFIRMAÇÃO

- **1.** O médico avalia sintomas, histórico e medicamentos.
- **2.** Havendo suspeita, solicita testosterona total pela manhã, geralmente entre 7h e 10h, conforme a orientação de jejum.
- **3.** Se vier baixa, é preciso repetir o exame em outro dia antes de concluir o diagnóstico.
- **4.** Outros exames e outras causas são avaliados caso a caso. **[1, 6]**

Cuidado com a reposição. Testosterona por conta própria pode prejudicar a fertilidade e exige avaliação de contraindicações e acompanhamento. Não comece, não altere e não interrompa tratamento hormonal sem orientação médica. **[1, 2, 6]**

FONTES PRINCIPAIS

[1] SBEM, SBU e ABEMSS · Consenso brasileiro, 2026.
[2] SBEM · Posicionamento sobre reposição, 2026.
[3] CDC · Sono em adultos.
[4] CDC · Atividade física em adultos.
[5] NIH / NHLBI · Sintomas de apneia do sono.
[6] Endocrine Society · Diretriz para diagnóstico.

Desafio Abdômen Forte · João Gabriel dos Anjos (Carninha) · Novembro de 2026.
Conteúdo educativo. Não é consulta, diagnóstico nem prescrição. Procure um médico para avaliar o seu caso.