

# Angående utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

## Rapporter om misstänkta biverkningar

Till Läkemedelsverket inkommer rapporter om misstänkta biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården samt från konsumenter och patienter. Rapporterna registreras i den svenska databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar.

För att underlätta tolkningen av statistik och uppgifter från databasen, har nedanstående information sammanställts.

## Varför behövs rapporter om misstänkta biverkningar?

Vid godkännandet av nya läkemedel är de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga eller sällsynta biverkningar är oftast mer begränsad. En bra rapportering om misstänkta biverkningar är därför viktig vid övervakning av riskprofilen hos läkemedel när de sen används av en större grupp patienter.

## Vad ska rapporteras?

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård dvs. sjukvårdshuvudmannen (i praktiken anställda läkare, tandläkare, sjuksköterskor, farmaceuter) ska rapportera alla misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. *Det är särskilt viktigt att allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar rapporteras.* Biverkningsdefinitionen har sedan juli 2012 breddats och omfattar nu samtliga negativa effekter av läkemedel inkluderande även biverkningar vid användning utanför godkänd indikation.

## Vad är en allvarlig misstänkt biverkning?

En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

## Hur görs en sambandsbedömning av rapporter om misstänkta biverkningar?

Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att rapportera redan vid *misstanke* om en läkemedelsbiverkning. Det innebär att den som rapporterar in den misstänkta biverkningen inte behöver ha fastställt ett samband mellan läkemedlet och händelsen.

I de flesta fall kan ett samband med läkemedlet bekräftas först efter analys av flera liknande rapporter samt med stöd från den samlade vetenskapen, där alla rapporter om misstänkta biverkningar är ett viktigt tillskott till det större pusslet. Sambandsbedömning kommer att göras i det samlade underlaget vid detektion och utredning av en potentiell säkerhetsrisk. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid denna bedömning är bland annat patientens sjukdom, samtidigt intag av andra läkemedel, tidsförlopp för intaget och händelsen samt möjlig mekanism.

## Hur ska uppgifterna från databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar tolkas?

Rapporteringen om misstänkta biverkningar ska ses som en viktig pusselbit av flera i ett sammanhang där läkemedelssäkerheten övervakas av Läkemedelsverket. Rapporteringen är ett redskap för att identifiera signaler om misstänkta säkerhetsproblem med läkemedel.

För Läkemedelsverket  
Veronica Arthurson  
Enhetschef, Enheten för läkemedelssäkerhet

## Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Biverkningsrapporteringen är ett viktigt verktyg för den löpande säkerhetsövervakningen av godkända läkemedel. Men enskilda rapporter kan inte ge svaret på ett eventuellt samband mellan läkemedlet och den rapporterade biverkningen. Den samlade vetenskapen behövs för att konstatera om det finns en riskökning för en viss misstänkt biverkning eller ej. Inrapporterade biverkningar behöver alltså inte vara orsakade av läkemedlet, utan kan bero på andra faktorer.

Läkemedelsverket kodar rapporter enligt den internationella MedDRA-terminologin för biverkningar, sjukdomar och indikation för läkemedel. MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) är ett system som används för kodning av medicinsk terminologi. Sist i sammanställningen finns en preliminär översättning av MedDRA-termer till svenska.

<b>SOC</b>	<b>SOC - Systemorganklass</b>
Blood	Blodet och lymfsystemet
Card	Hjärtat
Cong	Medfödda och/eller genetiska störningar
Ear	Öron och balansorgan
Endo	Endokrina systemet
Eye	Ögon
Gastr	Magtarmkanalen
Genrl	Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Hepat	Lever och gallvägar
Immun	Immunsystemet
Infec	Infektioner och infestationer
Inj&P	Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
Inv	Undersökningar
Metab	Metabolism och nutrition
Musc	Muskuloskeletala systemet och bindväv
Neopl	Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)
Nerv	Centrala och perifera nervsystemet
Preg	Graviditet, puerperium och perinatalperiod
Psych	Psykiska störningar
Prod	Produktrelaterade fel och händelser
Renal	Njuror och urinvägar
Repro	Reproduktionsorgan och bröstkörtel
Resp	Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Skin	Hud och subkutan vävnad
SocCi	Sociala förhållanden
Surg	Kirurgiska och medicinska åtgärder
Vasc	Blodkärl

# Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Vaxzevria (f.d. COVID-19 Vaccine AstraZeneca) rapporter handlagda till och med 2022-01-05

Antal handlagda rapporter	Totalt
Vaxzevria	5,426

Rapportör / allvarlig eller icke allvarlig	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Hälso och Sjukvård	581	966	1,547
Konsument	2,731	1,148	3,879
<b>Antal rapporter</b>	<b>3,312</b>	<b>2,114</b>	<b>5,426</b>

Allvarlighetsgrad	Allvarlig	Allvarlig	Ej allvarlig	Ej allvarlig	
Rapporter per åldersgrupp/kön	Kvinna	Man	Kvinna	Man	Totalt
0-9 år				1	1
10-19 år	8	2	17	5	32
20-29 år	97	22	260	44	423
30-39 år	161	33	380	68	642
40-49 år	178	33	378	38	627
50-59 år	221	39	431	42	733
60-69 år	300	180	433	132	1,045
70-79 år	442	314	741	299	1,796
80-89 år	38	35	26	6	105
90+	2	4			6
okänt	3	2	7	4	16
<b>Antal rapporter</b>	<b>1,450</b>	<b>664</b>	<b>2,673</b>	<b>639</b>	<b>5,426</b>

Ursprungsregion för rapporter från hälso- och sjukvården (rapporter från privatpersoner ej medräknade)	Antal rapporter
0 Länsuppgift saknas	578
AB Stockholm	221
AC Västerbotten	32
BD Norrbotten	26
C Uppsala	37
D Södermanland	24
E Östergötland	65
F Jönköping	55
G Kronoberg	31
H Kalmar	29
I Gotland	8
K Blekinge	16
M Skåne	171
N Halland	53
O Västra götaland	133
S Värmland	74
T Örebro	35
U Västmanland	25
W Dalarna	28
X Gävleborg	27
Y Västernorrland	23
Z Jämtland	24

## Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

<b>Ursprungsregion för rapporter från hälso- och sjukvården (rapporter från privatpersoner ej medräknade)</b>	<b>Antal rapporter</b>
<b>Antal rapporter</b>	<b>1,547</b>


I tabellen nedan visas antal rapporter per åldergrupp där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.

Läkemedelsverket kan inte med bestämdhet säga hur många som faktiskt avlidit på grund av vaccinationerna. Vi kan endast återge hur många rapporter som har inkommit där patienten uppges ha avlidit. De rapporterade dödsfallen kan vara förknippade med de misstänkta vaccinen i fråga, men de kan även bero på patientens eventuella andra sjukdomar, andra läkemedel som patienten använder, eller andra faktorer.

<b>Dödsfall Åldersfördelning/ kön</b>	<b>50-59 år</b>	<b>60-69 år</b>	<b>70-79 år</b>	<b>80-89 år</b>	<b>90+</b>	<b>Totalt</b>
Kvinna	1	5	9	3		18
Man	1	4	18	3	1	27
<b>Antal rapporter</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>45</b>

## Handlagda rapporter

Diagrammet visar fördelningen av handlagda rapporter om misstänkta biverkningar per systemorganklass. Värt att notera är att en rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar



Tabellen visar de tio systemorganklasser med flest rapporterade misstänkta biverkningar. Under respektive systemorganklass visas de tre vanligaste misstänkta biverkningarna om fler än tio. Siffrorna inom parentes bakom termerna motsvarar antalet handlagda rapporter där dessa termer förekommer.

Systemorganklass exempel på rapporterade misstänkta biverkningar	Antal rapporter
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället	3742
feber (2536), frossa (1660), trötthet (1104)	
Centrala och perifera nervsystemet	2976
huvudvärk (2183), yrsel (735), domningar (176)	
Muskuloskeletala systemet och bindväv	2064
muskelvärk (1076), ledvärk (844), smärta i extremitet (571)	
Magtarmkanalen	1260
illamående (800), kräkningar (260), buksmärta (160)	
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum	689
tungt att andas (236), lungemboli (121), näsblödning (119)	
Blodkärl	516
trombos (91), högt blodtryck (74), djup ventrombos (72)	
Hud och subkutan vävnad	485
klåda (69), svettningar (67), utslag (61)	
Hjärtat	343
hjärtklappning (167), förmaksflimmer (39), hjärtinfarkt (26)	
Undersökningar	333
ökad hjärtfrekvens (109), ökat blodtryck (66), minskat blodtryck (64)	
Ögon	243
synnedsättning (48), suddig syn (42), ögonsmärta (39)	