

Tabela suplementar 1: Cinco alimentos com maiores médias de contribuição de CATd em gestantes participantes do Estudo Multicêntrico de Deficiência de Iodo (EMDI Brasil), segundo os centros. Brasil, 2019.

Centro (n=11)	Média de consumo diário (mmol/dia)
Palmas	
Feijão	1,28
Café	1,10
Laranja	0,28
Arroz	0,20
Rúcula	0,11
Aracaju	
Café	3,16
Feijão	1,25
Flocos de milho	0,39
Suco de fruta	0,13
Bolacha recheada	0,12
São Luís	
Café	2,40
Feijão	0,63
Arroz	0,32
Laranja	0,11
Bolacha recheada	0,11
Vitória	
Café	1,95
Feijão	1,24
Achocolatado em pó	0,12
Laranja	0,12
Suco de fruta	0,10
Macaé	
Café	2,03
Feijão	1,24
Arroz	0,15
Suco de fruta	0,09
Banana	0,07
Belo Horizonte	
Café	2,13
Feijão	1,85
Achocolatado em pó	0,44
Pimenta do reino	0,20
Arroz	0,14
Viçosa	
Café	2,40
Feijão	1,35
Laranja	0,29
Chá	0,26
Arroz	0,21
Ribeirão Preto	

Café	1,55
Feijão	1,48
Chá	1,13
Arroz	0,19
Achocolatado em pó	0,16

Rondonópolis

Feijão	1,58
Café	1,57
Tereré	0,32
Arroz	0,20
Laranja	0,17

Brasília

Café	1,51
Feijão	1,21
Arroz	0,18
Laranja	0,17
Sementes de chia	0,15

Pinhais

Café	2,42
Feijão	0,82
Chá	0,61
Laranja	0,19
Arroz	0,14
