

Tables and Figures

Table 1: Participant Characteristics by Treatment Group, Un-weighted and Weighted

	Without Surgery (n=6,980)	With Surgery (n=2,204)	p-value	Without Surgery (n=9,155)	With Surgery (n=9,365)	p-value
	N(%)	N(%)		N(%)	N(%)	
Sex			0.81			0.84
Male	3,722(53)	1,168(53)		4,871(53)	4,957(53)	
Site			<0.01			0.93
Hodgkin	2,698(39)	991(45)		3,670(40)	3,744(40)	
Race			<0.01			0.90
Black	549(8)	219(10)		764(8)	790(8)	
Registry/Location			<0.01			0.62
1	2,433(35)	513(23)		2,954(32)	3,065(33)	
2	2,589(37)	558(25)		3,151(34)	3,292(35)	
20	1,958(28)	1,133(51)		3,050(33)	3,008(32)	
SEER Stage			<0.01			0.14
Localized	1,461(21)	609(28)		2,029(22)	1,991(21)	
Regional	1,150(16)	354(16)		1,475(16)	1,398(15)	
Distant	1,609(23)	418(19)		2,012(22)	1,975(21)	
Unknown	2,760(40)	823(37)		3,639(40)	4,001(43)	
	Mean(SD)	Mean(SD)		Mean(SD)	Mean(SD)	
Birth Year	1937(23)	1940(23)	<0.01	1938(0.3)	1937(0.6)	0.24
Age	49(22)	47(21)	<0.01	48(0.3)	49(0.5)	0.93
Grade of Lymphoma	7.5(2.4)	7.5(2.3)	0.72	7.5(0.03)	7.5(0.06)	0.69




Figure 1: Inverse Probability Weighted KM Curve