

Table 1: Participant Characteristics by Treatment Group,  
Unweighted and Weighted

	Without Surgery (n=6980)	With Surgery (n=2204)	p-value	Without Surgery (n= 9,155)	With Surgery (n= 9,365)	p-value
	N(%)	N(%)		N(%)	N(%)	
<b>Sex</b>			0.81			0.84
<b>Male</b>	3722(53)	1168(53)		4,871(53)	4,957(53)	
<b>Site</b>			<0.01			0.93
<b>Hodgkin</b>	2698(39)	991(45)		3,670(40)	3,744(40)	
<b>Race</b>			<0.01			0.90
<b>Black</b>	549(8)	219(10)		764(8)	790(8)	
<b>Registry/Location</b>			<0.01			0.62
<b>1</b>	2433(35)	513(23)		2,954(32)	3,065(33)	
<b>2</b>	2589(37)	558(25)		3,151(34)	3,292(35)	
<b>20</b>	1958(28)	1133(51)		3,050(33)	3,008(32)	
<b>SEER Stage</b>			<0.01			0.14
<b>Localized</b>	1461(21)	609(28)		2,029(22)	1,991(21)	
<b>Regional</b>	1150(16)	354(16)		1,475(16)	1,398(15)	
<b>Distant</b>	1609(23)	418(19)		2,012(22)	1,975(21)	
<b>Unknown</b>	2760(40)	823(37)		3,639(40)	4,001(43)	
	Mean(SD)	Mean(SD)		Mean(SD)	Mean(SD)	
<b>Birth Year</b>	1937(23)	1940(23)	<0.01	1938(0.3)	1937(0.6)	0.24
<b>Age</b>	49(22)	47(21)	<0.01	48(0.3)	49(0.5)	0.93
<b>Grade of Lymphoma</b>	7.5(2.4)	7.5(2.3)	0.72	7.5(0.03)	7.5(0.06)	0.69




Figure 1: Inverse Probability Weighted KM Curve