



Estudos Clínicos em Recrutamento

Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia - GHC

Junho/2026



PULMÃO

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
Pulmão NSCLC Neoadjuvante/ Adjuvante MK2870-019	- NSCLC escamoso e não escamoso, ressecável, Estágio II-IIIB(N2) - ECOG 0-1 - Capaz de receber tratamento neoadj - EGFR não mutado	Neoadj: Pembro+ QT Tratamento Adj: MK2870 + Pembrolizumabe X Pembrolizumabe	clique para acessar
Pulmão NSCLC Neoadjuvante/ Adjuvante V940-009	-NSCLC Estágios II-IIIB (N2) -Capaz de receber quimio + pembro - Excluir mutação EGFR -Após cirurgia concluída (R0-R1) Tecido cirúrgico adequado disponível - ECOG 0-1	NeoAdj: V940 + Pembrolizu- mabe + QT Adj: V940 + Pembrolizumabe X Pembrolizumabe + Placebo	clique para acessar
CA240-0029 MOUNTAINTAP-29 1ªLinha del MTAP	- NSCLC mtx sem terapia sistêmica prévia (1 ciclo de SoC anterior à rando é permitido) - Deleção de MTAP homozigótica avaliada (pelo estudo ou local) - Mtx no SNC sintomáticas (excluídas) - ECOG 0-1	BMS-986504 + pembrolizumabe + quimioterapia X placebo + pembrolizumabe + quimioterapia	clique para acessar
TROPION Lung 10 NSCLC Adeno 1ªLinha PD-L1 ≥ 50%	- NSCLC Estágio IIIB, IIIC, IV - Expressão de PD-L1 em CT ≥ 50% - Histologia não escamosa - ECOG 0-1	Dato-DXd + Rilvegostomig X Rilvegostomig X Pembrolizumabe	clique para acessar
DESTINY-Lung06 - DS8201-793 1ªLinha HER2+, PD-L1 <50%	- NSCLC não escamoso mtx ou loc av - Sem tratamento sistêmico anterior mtx - Superexpressão de HER2 e TPS de PD-L1 < 50% (pelo estudo) - ECOG 0-1	T-DXd + Pembro X Pembro + QT (peme + cispla ou carbo por 4 ciclos)	clique para acessar
Pulmão NSCLC MB12-C-02-24 (benito) 1ª Linha mtx Não Escamoso	- NSCLC não escamoso avanç, estágio IV - Sem tratamento sistêmico anterior mtx - Aceita pcts c/ outras mutações (exceto EGFR e ALK), caso não tenha opção de tratamento – ECOG 0-1	MB12 (biossimilar de Pembro) + Peme + QT X Pembrolizumabe + Peme + QT (platina)	clique para acessar



Estudos Clínicos em Recrutamento

Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia - GHC

Junho/2026



PULMÃO

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
Pulmão NSCLC 20210033 (MARIGOLD) 1ª Linha mtx Não Escamoso ON HOLD	- NSCLC não escamoso em estágio IV - Sem tratamento sistêmico anterior para doença metastática - Sem mutações EGFR, ALK e ROS-1 - ECOG 0-1	<u>Ind:</u> ABP 234 (biossimilar de Pembro) + QT X Pembrolizumabe + QT <u>Manut:</u> ABP 234 + Peme X Pembro + Peme	clique para acessar
Pulmão NSCLC ARTEMIDE Lung 02 1ª Linha mtx Escamoso	-NSCLC escamoso Est. IV -PD-L1 >1% a 49% -Sem terapia anterior p/ doença mtx -Sem mutações EGFR, ALK e ROS-1 -ECOG 0 ou 1	Rilvegostomig + QT (carbo + pacli ou nab-pacli) X Pembrolizumabe + QT	clique para acessar
Pulmão NSCLC ARTEMIDE Lung 03 1ª Linha mtx Não Escamoso	-NSCLC não escamoso Est. IV -PD-L1 >1% a 49% -Sem terapia anterior p/ doença mtx -Sem mutações EGFR, ALK e ROS-1 -ECOG 0 ou 1	Rilvegostomig + QT (platina + peme) x Pembrolizumabe + QT (platina + peme)	clique para acessar
CO45042 - Krascendo 2 NSCLC KRAS G12C 1ª Linha	- NSCLC mtx sem terapia sistêmica prévia - não escamoso - se terapia neoadj, adj ou periop ou cCRT (intenção curativa) deve ter um intervalo sem tto de pelo menos 12 m - Mutação de KRAS G12C - ECOG 0-1	Divarasibe+ pembrolizumabe X Pembrolizumabe + Pemetrexede + Carboplatina ou Cisplatina	clique para acessar
TROPION Lung 17 NSCLC Não Escamoso 2ª Linha + ON HOLD	- NSCLC não escamoso (IIIB, IIIC ou IV) -Sem docetaxel e anti-TROP2 anterior - 1-2 linhas anteriores, incluindo QT à base de platina e anti-PD-1 - Positivo para biomarcador QCS-NMR de TROP2 (amostra disponível) ECOG 0 ou 1	Dato-DXd X Docetaxel	clique para acessar



Estudos Clínicos em Recrutamento

Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia - GHC

Junho/2026



COLORRETAL

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
Colorretal 1ª Linha MOUNTAINEER-03 (SGNTUC-029)	- CCR metastático, HER2+, RAS do tipo selvagem - Nenhum tratamento prévio na condição metastática, - Pode ter recebido tratamento adjuvante se concluído >6 meses antes da inclusão - ECOG 0 ou 1	Tucatinibe + Trastuzumabe mFOLFOX6 X mFOLFOX6 ou mFOLFOX6 + bevacizumabe ou mFOLFOX6 + cetuximabe	clique para acessar
Colorretal 1ª Linha KRAS G12C MK1084-012	- CRC localmente avançado, irressecável ou metastático, não tratado anteriormente - Mutação KRAS G12C por exame local ou central - pMMR/não-MSI-H por exame local - ECOG 0-1	MK-1084 + Cetuximabe + mFOLFOX6 X mFOLFOX6 +/- Bevacizumabe	clique para acessar
Colorretal 2ª Linha OrigAMI-3 ON HOLD	- CRC recorrente, irressec ou mtx - Recebeu 1 linha de tratamento sistêmico para mCRC - Sem tratamento anterior com anti-EGFR e irinotecano - KRAS/NRAS/BRAF do tipo selvagem	Amivantamabe + FOLFIRI X Cetuximabe ou Bevacizumabe + FOLFIRI	clique para acessar

MELANOMA

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
0439-24 (INTAS) Melanoma Ressecado	- Melanoma cutâneo estágio IIB/C, III ou e IV - Não mais do que 12 semanas entre a ressecção cirúrgica final e randomização. - Sem terapia sistêmica anterior - Metástases no SNC tratadas são permitidas - ECOG 0-1	Xdivane (biossimilar de Nivolumabe) X Nivolumabe EU ou Nivolumabe US	clique para acessar



Estudos Clínicos em Recrutamento

Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia - GHC

Junho/2026



Grupo Hospitalar Conceição

BEXIGA

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
Bexiga Neoadj e Adj NIAGARA-2	- CCT invasivo muscular em estadio T2-T4aN0/1M0 ou T1N1M0 (N2 e N3 não são elegíveis) - Cirurgia robótica pelo estudo - CrCl >40 a <60 - ECOG 0-1	Neoadj: Durvalumabe+ddMVAC Durva + gem/cis (escolha investigador) Adj: Durvalumabe	clique para acessar

PRÓSTATAS

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
Próstata CRPCm MEVPRO-2 (C2321003)	- Sem tto prévio no estágio CRPCm - Nenhum tto prévio c/ QT, ARSi (enzalutamida, apalutamida, darolutamida), abiraterona ou outro tto sistêmico no cenário CRPCm (exceto ADT, antiandrógenos de 1ª geração) - ECOG 0-1	Mevrometostat + Enzalutamida X Placebo + Enzalutamida	clique para acessar
Próstata BRCAm Adjuvante EvoPAR- Prostate02	- CA de próstata recém-diagnosticado de alto risco e risco muito alto (localiz/localm avançado) ou participantes com BCR de alto risco após prostatectomia radical - BRCAm (testado pelo estudo) - Realizar - PSMA-PET após a conclusão da RT (pelo estudo) - ECOG 0 ou 1	Coorte A: Saruparibe/placebo + ADT Coorte B: Saruparibe/placebo + ADT + abiraterona	clique para acessar



Estudos Clínicos em Recrutamento

Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia - GHC

Junho/2026



GÁSTRICO / ESÔFAGO

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
Gástrico ARTEMIDE-Gastric01 1ª Linha	-Gástrico ou ds JGE localm avançado ou mtz confirmado histologicamente -Sem terapia sistêmica anterior para doença avançada - HER2+ (IHC3+ ou 2+/ISH-positivo) - CPS≥1 - ECOG 0-1	Rilve + T-DXd + 5-FU/Cape X Pembro + Trastuzumabe + 5-FU/Cape + platina X Rilve + Trastuzumabe + 5 FU/Cape + platina	clique para acessar
Esôfago MK3475-06B 2ª Linha	- ESCC localm avanç ou mtz 2a linha anteriormente expostos à terapia com PD-1/PD-L1 - Bloco tumoral disponível - ECOG 0 ou 1	QT (paclitaxel ou irinotecano) X Pembrolizumabe + MK-4830 (anti-ILT4) + QT X Pembrolizumabe + MK-4830 (anti-ILT4) + lenvatinibe X MK2870	clique para acessar
Esôfago MK3475-06C 1ª Linha	- 1L adenocarcinoma gástrico/JGE/ esofágico localmente avançado irressecável/metastático - negativo para HER2 - ECOG 0 ou 1	Pembrolizumabe + CAPOX/ mFOLFOX6 X Pembrolizumabe + MK-2870 (TROP2ADC) + capecitabina ou 5-FU + LV	clique para acessar

FÍGADO

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
1ª Linha HCC ARTEMIDE-HCC01	- HCC diag histo/cito ou radiologic - Inelegíveis para terapia curativa Estágio B (não elegível para terapia locorregional) ou Estágio C de BCLC - Nenhum tto sistêmico prévio mtz ECOG 0-1 e Classe A 5-6 de Child-Pugh - Sem trombose do tumor da veia porta principal	T300 + Rilvegostomig X Beva + Rilvegostomig + Beva X Atezo + Beva	clique para acessar



Estudos Clínicos em Recrutamento

Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia - GHC

Junho/2026



CABEÇA E PESCOÇO

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
LiGeR-HN-01	- HNSCC mtx ou localm re- corrente		
MCLA-158-CL03	- Permitida terapia anterior 6 meses	Petosentamabe	
1ª Linha	antes tto estudo se adm como parte (biespecífica EGFR + LGR5)		
CPS $\geq$ 1%	do tto multimodal para localm avanç	+	
SLOT REQUEST (Solicitar vaga)	- Tratamentos prévios com terapias anti-PD-(L)1 ou anti-EGFR não são permitidos	Pembrolizumabe	clique para acessar
	- CPS $\geq$ 1	X	
	- ECOG 0-1	Pembrolizumabe	
eOLVE-HNSCC Cabeça e Pescoço	-HNSCC Estágios III, IVA ou IVB LA não ressecado		
Pós cCRT	-SCC de OP, OC, HP ou LX		
SLOT REQUEST (Solicitar vaga)	-Doença controlada após término da cCRT definitiva	Volrustomig X	clique para acessar
	-Amostra de tecido disponível para PD-L1	Observação	
	-Status de HPV (p16) conhecido (somente OPC)		

MAMA

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
Mama TNBC	- TNBC localm recorrente ou mtx sem		
1ª Linha	tto prévio, PDL1 CPS <10 (incluindo negativo)	sac-TMT (anti-TROP2) X	
	- Se tto prévio em estágio inicial deve ter concluído o tto com intenção curativa $\geq$ 6meses antes da 1ª recorrência	sac-TMT + pembrolizumabe	
	- Deve ter recebido antraciclina (neo)adjuvante e/ou taxano	X Tratamento de escolha :	
	- ECOG 0-1	Pacli ou Nab-pacli ou	
		Gencitabina + carbo	clique para acessar



Estudos Clínicos em Recrutamento

Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia - GHC

Junho/2026



TRATO BILIAR

Neoplasia	Estudo	Tratamento	Link Clinical Trials
JZP598-302 1ªLinha HER2+	- CTB irresssecável ou metastático localmente avançado (incluindo CVB, CCIH ou CCEH) - Recebeu não mais do que 2 ciclos gencitabina e um agente de platina com ou sem um inibidor de PD-1/L1 - - HER2+ (IHQ 3+; ou IHQ 2+/ ISH+)	Zanidatamab ± Durvalumab + CisGem X ± Durvalumab + CisGem	clique para acessar
Destiny BTC-01 1ªLinha HER2+	-BTC avançado ou mtx (colangiocarcinoma [IHCC ou EHCC] ou câncer de vesícula biliar [GBC]) - Nenhum tratamento anterior no cenário avançado/mtx. Dx recorrente >6 meses após cirurgia primária ou terapia adjuvante - HER2 (IHQ 3+/2+) - - ECOG 0-1	T-DXd + Rilvegostomig X T-DXd X Gem/Cis + Durva até PD (TOPAZ-1)	clique para acessar
Artemide-Biliary02 1ªLinha	- BTC localmente avançado ou metastático - Não tratado previamente no contexto avançado - Sem imunoterapia prévia - Status de PD-L1 conhecido (pode testar pelo estudo) - ECOG 0-1	Rilvegostomig + Gencitabina e cisplatina X Durvalumabe + Gencitabina e cisplatina	clique para acessar