```
# Carolyn Gineth Castañeda Poveda
# Asignación 2: Uso de restricciones y estadísticas descriptivas
# 1. Abrir archivo en excel
# 2. Importar la base de datos a excel a R en un objeto llamada conjunto
conjunto <- read.csv("Tarea1.CSV", header = T)</pre>
View(conjunto)
# 3. Aplicar la función subset para la variable Altura de acuerdo a las siguintes
indicaciones
      -Incluir los datos iguales o menores a la media (objeto en R se llame: H.media)
H.media <- subset(conjunto, conjunto$Altura <= mean(conjunto$Altura))</pre>
mean(conjunto$Altura)
   13.94256
View (H.media)
      -Incluir los datos menores a 16.5 m (objeto en R se llame: H.16)
H.16 <- subset(conjunto, conjunto$Altura < 16.5)</pre>
View (H.16)
# 4. Aplicar la función subset para la variable Vecinos
      - Incluir los árboles que tengan un número de vecinos iguales o menores a 3 (Objeto
en R:vecinos3)
Vecinos3 <- subset(conjunto, conjunto$Vecinos <= 3)</pre>
View(Vecinos3)
      - Incluir los árboles que tengan un número de vecinos mayores a 4 (Objeto en R:
Vecinos4)
Vecinos4 <- subset(conjunto, conjunto$Vecinos > 4)
View(Vecinos4)
# 5.Aplicar la función subset para la variable Diametro
      - Incluir los diámetros menores a la media (objeto en R: DBH-media)
mean(conjunto$Diametro)
DBHmedia <- subset(conjunto, conjunto$Diametro < mean(conjunto$Diametro))
View(DBHmedia)
# Incluir los diámetros mayores a 16 (Objeto en R DBH-16)
DBH16 <- subset(conjunto, conjunto$Diametro > 16)
View(DBH16)
# 6.Aplicar la función subset para la variable Especie
     -Incluir la especie Cedro Rojo
EspmC <- subset(conjunto, conjunto$Especie == "C")</pre>
View(EspmC)
     -Incluir la especie Tsuga heterófila y Douglasia verde
EspmTD <- subset(conjunto, conjunto$Especie != "C")</pre>
View(EspmTD)
```

```
# 7.Determinar cuantas observaciones son menores o iquales a 16.9 cm de Diamtero
ObsDi <- subset(conjunto, conjunto$Diametro <= 16.9)
View (ObsDi)
# 31 observaciones
# 8. Determinar cuantoas observacions son mayores a 18.5 metros de Altura
ObsAl <- subset(conjunto, conjunto$Altura > 18.5)
View (ObsAl)
# 2 observaciones
# Visualización de datos
# 9.Con la función hist generar los histogramas para los objetos creados en el apartado
anterior
      Altura
hist(conjunto$Altura, xlab = "altura", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de Altura",
     xlim = c(8,24), ylim = c(0, 14), col = "darkseagreen1")
     H.media
hist(H.media$Altura, xlab = "altura", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de Altura -
H.media",
     xlim = c(8,14), ylim = c(0, 8), col = "darkseagreen3")
     H.16
hist(H.16$Altura, xlab = "altura", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de Altura -
H.16",
     xlim = c(8,18), ylim = c(0, 13), col = "darkseagreen4")
     vecinos
hist(conjunto$Vecinos, xlab = "vecinos", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de
Vecinos".
     xlim = c(0,6), ylim = c(0, 15), col = "bisque")
hist(Vecinos3$Vecinos, xlab = "vecinos", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de
Vecinos3",
     col = "bisque2")
hist (Vecinos 4 $ Vecinos, xlab = "vecinos", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de
Vecinos4",
     , col = "bisque4")
     Diametro
hist(conjunto$Diametro, xlab = "diametro", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de
Diametro",
    , col = "cadetblue1")
     DBH-media
hist(DBHmedia$Diametro, xlab = "diametro", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de
Diametro - DBHmedia",
     , col = "cadetblue3")
     DBH-16
hist(DBH16$Diametro, xlab = "diametro", ylab = "frecuencia", main = "Histograma de
Diametro - DBH16",
     , col = "cadetblue4")
# Estadísticas básicas
# 10. Determinar la media (mean) de los objetos (variable y respectivos subsets), así como
su desviación estándar (sd).
      Altura
mean(conjunto$Altura)
sd(conjunto$Altura)
      H.media
```

mean(H.media\$Altura)
sd(H.media\$Altura)

- # H.16 mean(H.16\$Altura) sd(H.16\$Altura)
- # Vecinos
  mean(conjunto\$Vecinos)
  sd(conjunto\$Vecinos)
- # Vecinos-3
  mean(Vecinos3\$Vecinos)
  sd(Vecinos3\$Vecinos)
- # Vecinos-4
  mean(Vecinos4\$Vecinos)
  sd(Vecinos4\$Vecinos)
- # Diametro
  mean(conjunto\$Diametro)f
  sd(conjunto\$Diametro)
- # DBH-media
  mean(DBHmedia\$Diametro)
  sd(DBHmedia\$Diametro)
- # DBH-16
  mean(DBH16\$Diametro)
  sd(DBH16\$Diametro)