

BONO 3 · AZÚCAR EN EQUILIBRIO



SOS Antojo de Dulce

Qué hacer en los primeros 10 minutos, para que se te pase sin pan y sin refresco. Déjalo guardado en el celular.

10 MINUTOS · 12 RESCATES

de la Abuela Mei

Guía de cuidado casero de uso tradicional, de carácter informativo. No es un medicamento y no sustituye la consulta ni el tratamiento médico.

Alto. Primero esto.

Antes de cualquier remedio de este cuaderno, contesta una sola pregunta: **¿esto es un antojo, o se te está bajando el azúcar?**

Se parecen. Los dos dan hambre de repente y ganas de dulce. Pero se atienden **al revés**: el antojo se pasa sin azúcar, y la bajada se atiende **con azúcar, ya**.

Confundirlos es lo único de este cuaderno que puede hacerte daño. Por eso esta es la primera página y no la última.

Suena a antojo

- Llega a una **hora fija**: casi siempre entre 4 y 6 de la tarde
- Se te antoja **algo en particular**: el pan de la esquina, ese chocolate, no cualquier cosa
- Comiste hace 2 o 3 horas y comiste bien
- Aparece con **aburrimiento, enojo o cansancio**
- Se te olvida si te distraes con algo
- No traes temblor ni sudor frío

Suena a azúcar baja

- **Temblores** en las manos
- **Sudor frío**, de repente, sin calor
- El corazón **acelerado** o golpeando
- Mareo, piernas débiles, ganas de sentarte
- **Visión borrosa** o doble
- Te comerías **cualquier cosa**, con urgencia
- Te sientes **rara** y te cuesta explicar por qué
- Te saltaste una comida, caminaste de más o tomaste alcohol

Si es o si dudas: azúcar baja se trata así

Mídete si puedes. Menos de **70 mg/dL** es azúcar baja. **Si no tienes con qué medirte y dudas, trátalo como bajada.** Es mucho peor esperar a ver qué pasa.

La regla del 15 y 15: toma **15 gramos de azúcar rápida** — una cucharada de azúcar en medio vaso de agua, medio vaso de refresco **normal** (no de dieta), medio vaso de jugo, una cucharada de miel o 3 tabletas de glucosa. Siéntate y **espera 15 minutos.** Vuelve a medirte. Si sigue abajo de 70, repite. Cuando suba, come algo de verdad.

Después avísale a tu médico, **aunque ya se te haya pasado.**

Y si la persona **no puede tragar o está inconsciente:** nada a la boca, de lado en el piso, y al **911.**

Si es antojo, entonces sí

Pasa a la página siguiente. Tienes diez minutos por delante y todo lo que necesitas está aquí.

EL MÉTODO

Los primeros diez minutos

Un antojo fuerte dura menos de lo que crees. Lo que hay que hacer es atravesarlo, no vencerlo.

Un antojo no es una línea recta que sube y sube. Es una ola: sube, se queda arriba unos minutos y **baja sola**. El chiste no es aguantar toda la tarde. Es aguantar la ola.

Casi siempre son **entre siete y diez minutos**. Por eso este cuaderno se llama así y no «cómo dejar el azúcar para siempre»: diez minutos sí se pueden.

0:00

Ponte de pie y sal de la cocina

No decidas nada todavía. Solo cambia de cuarto. La mitad del antojo de la tarde se sostiene porque estás viendo el pan.

0:30

Toma agua, un vaso entero

Despacio, de pie. La sed y el antojo de dulce se confunden más de lo que uno cree, sobre todo con el azúcar alta.

1:00

Pon a hervir el agua

Este paso es el que de verdad funciona, y no por la planta: **preparar algo ocupa las manos y toma minutos**. Son minutos que el antojo está pasando.

2:00

Escoge tu rescate

De la lista de las páginas que siguen. El que tengas a la mano — el mejor rescate es el que sí puedes hacer hoy, no el ideal.

5:00

Siéntate a tomarlo. Sin teléfono y sin tele

En taza, sentada, oliéndolo. Si te lo tomas de pie y viendo el celular, tu cabeza no registra que comiste algo.

8:00

Pregúntate qué pasó hoy

¿Fue la hora? ¿Te saltaste la comida? ¿Te enojaste? ¿Estás cansada? Apúntalo en una línea. En una semana vas a ver tu patrón.

10:00

Ya pasó

Casi siempre ya pasó. Si no pasó del todo pero bajó, también cuenta: no es todo o nada.

Lo que no funciona

- ✗ **Aguantar a fuerza de voluntad**, sin hacer nada. Aguantar sola diez minutos viendo el reloj hace el antojo más grande.
- ✗ **«Nada más un pedacito.»** Con el pan dulce casi nunca es un pedacito, y tú ya lo sabes.
- ✗ **Castigarte después.** La culpa no baja el azúcar y sí hace que mañana comas más.
- ✗ **Saltarte la cena** para compensar. Eso te trae otro antojo más fuerte en la noche — y si usas insulina o glibenclamida, una bajada.

ESCOGE UNO

Los doce rescates

Ordenados por lo que tardan. El mejor es el que tengas a la mano ahorita.

No necesitas los doce. Necesitas **tres** que puedas hacer sin pensar: uno caliente, uno frío y uno que se mastique. Subráyalos ahora y deja de escoger cada tarde.

2
minutos

1. Agua caliente con canela y clavo

Si ya la tienes hecha en el termo, **30 segundos**. Es el R-29 del libro. El más parecido a un postre sin serlo.

1 minuto

2. Agua fría con limón y hierbabuena

Cuando el antojo viene con calor y con sed. Ten la jarra hecha desde la mañana.

12
minutos

3. Té de cáscara de manzana con canela

El R-35. Tarda, y eso es parte de por qué sirve: los doce minutos son el remedio.

3
minutos

4. Un vaso de agua y lavarte los dientes

Suena tonto y es de los que mejor funcionan. Con la boca a menta, el pan deja de antojarse.

30
segundos

5. Mistela de canela y manzana

El R-44, si la tienes lista en el refrigerador. **30 ml** en medio vaso de agua, no a tragos.

5
minutos

6. Té verde con hierbabuena

El R-32. Para el antojo con sueño. **No después de las 6** o no duermes.

1 minuto

7. Jamaica fría sin azúcar

El R-14, del jarro que ya tienes hecho. Para el antojo de refresco.

0
minutos

8. Un puño chico de nueces o cacahuates sin sal

Diez o doce, contados y servidos **en un plato** — nunca de la bolsa. La grasa y la proteína cortan el antojo mejor que la fruta.

3
minutos

9. Jícama con limón y chile en polvo

Cuando lo que quieres es **masticar**, no tomar. Déjala picada desde la mañana.

2
minutos

10. Pepino con limón y sal

Lo mismo: cruje, dura y no te mueve el azúcar.

0
minutos

11. Un cuadrito de chocolate amargo, del de 70% o más

Un cuadrito, no la barra. Sirve cuando el antojo es de sabor y no de hambre. Si sabes que no te vas a quedar en uno, este no es tu rescate.

10
minutos

12. Salir a caminar a la cuadra

Es el R-43 usado de otro modo. Sales, das la vuelta y vuelves: los diez minutos del antojo se te fueron caminando.

Los que se preparan de antes

Cuatro de estos doce solo sirven **si ya están hechos**: la jamaica, el agua de limón, la mistela y la jícama picada. Déjalos listos en la mañana del domingo y te resuelven la semana.

El antojo de las cinco no se gana a las cinco. Se gana el domingo en la mañana.

TEN ESTO LISTO

Tu kit de los diez minutos

Lo que debe estar en la cocina y lo que debe estar en la bolsa. Sin esto, el cuaderno no sirve.

En la cocina, a la vista

- ✓ Un **termo** con agua de canela y clavo, hecho en la mañana
- ✓ Una **jarra** de jamaica o de agua de limón con hierbabuena en el refrigerador
- ✓ Un **frasco** con nueces o cacahuates sin sal — y un platito chico al lado
- ✓ Jícama o pepino **ya picado**, en tóper, al frente del refrigerador
- ✓ Tu **taza favorita**, limpia y a la mano. Esto no es adorno: la taza bonita hace que te sientes a tomártelo

Y lo que NO debe estar a la vista

El pan dulce, las galletas y el refresco, **en el mueble de arriba y hasta atrás**. No se trata de tirarlos — se trata de que cueste tres movimientos en vez de uno.

En esos tres movimientos te da tiempo de acordarte de este cuaderno.

En la bolsa, siempre

- ✓ **Azúcar de rescate**: un sobre de azúcar, un jugo chico de caja o tabletas de glucosa. Esto no es para el antojo — **es para una bajada**, y no debe faltar nunca
- ✓ Una bolsita con **nueces** o cacahuates
- ✓ Una botella de agua
- ✓ La **tarjeta** de la página siguiente, o su foto en el celular

La diferencia, otra vez

El azúcar de la bolsa **no se toca** para un antojo. Es para una bajada de verdad. Si te la acabas en los antojos, el día que la necesites no va a estar.

PARA QUE VUELVA MENOS

Los cinco disparadores

El antojo de las cinco casi nunca empieza a las cinco. Empieza antes, y casi siempre en el mismo lugar.

SI EL ANTOJO VIENE DE	SE NOTA EN QUE	QUÉ HACER DISTINTO
Saltarte comidas	Llegas a la tarde con hambre de verdad y te comerías lo que sea	Come tu comida completa, con proteína. El antojo de las cinco casi siempre se armó al mediodía.
Un desayuno de puro pan	El antojo te da a media mañana y otra vez a media tarde	Mete huevo, frijol o queso al desayuno. La mañana sostiene la tarde.
La hora y la costumbre	Llega puntual, a la misma hora, aunque no tengas hambre	Ten el rescate preparado a las 4:30 , antes de que llegue. A la costumbre se le gana con otra costumbre.

SI EL ANTOJO VIENE DE	SE NOTA EN QUE	QUÉ HACER DISTINTO
-----------------------------	----------------	--------------------

El cansancio	Viene con sueño y con ganas de algo rápido	Diez minutos sentada con los pies en alto, y el té. El cuerpo pide descanso y tú le estabas dando pan.
---------------------	--	--

El coraje o la tristeza	Llega después de un disgusto, y quieres algo dulce específico	Este no se quita con té, y no te voy a decir que sí. Sal a caminar, háblale a alguien. Y si es todos los días, eso se platica con el médico: no es glotonería.
--------------------------------	---	--

Una semana de apuntes

Durante siete días, cada vez que te dé el antojo apunta tres cosas: **la hora, qué habías comido y cómo andabas de ánimo.**

Al séptimo día vas a ver tu patrón escrito, y ahí se acaba el misterio. Casi siempre son las mismas dos cosas.

Y SI YA TE LO COMISTE

No pasa nada. En serio.

Porque va a pasar. A todas nos pasa, y la parte que hace daño no es el pan: es lo que viene después del pan.

Qué hacer

1. **Nada de castigos.** No te saltes la cena ni te pongas a caminar una hora para «compensar». Eso desordena más.
2. **Tómate un vaso de agua** y, si puedes, sal a caminar **diez minutos**. Es el R-43, y es lo que de verdad ayuda después de algo dulce.
3. **Mídete a las 2 horas** si tienes con qué, y apúntalo. No para regañarte: para saber.
4. **La siguiente comida, normal.** No más chica, no más grande. Normal.
5. **Apunta qué pasó antes.** Ahí está la información que sirve.

Lo que sí importa

Un pan un martes no descompone nada. **Lo que descompone es el pan de todos los días** — y eso no se arregla con voluntad, se arregla con tener otra cosa lista a las cinco.

Por eso el kit de la página anterior es lo más importante de este cuaderno.

Cuándo dejar de verlo como antojo

Si comes a escondidas, si no puedes parar cuando empiezas, si después te sientes muy mal contigo o si esto te pasa casi todos los días: **eso ya no es un antojo y no se arregla con un té.**

Díselo a tu médico. Se atiende, es más común de lo que crees y no es falta de carácter.

RECÓRTALA

La tarjeta del refrigerador

Córtala por la línea y pégala donde la veas. O tómale foto y déjala en el celular — ahí la vas a encontrar más rápido.

— — — — RECORTA POR AQUÍ — — — —

SOS Antojo · 10 minutos

1. **¿Tiemblo o sudo frío?** → No es antojo. **Azúcar ya** (15 g) y espera 15 min.
2. Si no: **ponte de pie y sal de la cocina.**
3. **Un vaso de agua**, despacio.
4. **Pon el agua a hervir.**
5. Tu rescate: _____
6. **Siéntate a tomarlo.** Sin teléfono.
7. ¿Qué pasó hoy? ¿Hora, hambre o coraje?

Ya pasó. Casi siempre dura menos de diez minutos.

— — — — —

Llena el renglón en blanco

Escribe ahí **tus tres rescates**, los que de verdad vas a hacer. Una tarjeta con doce opciones no sirve a las cinco de la tarde: a esa hora nadie escoge entre doce.

Diez minutos. Nada más

No es fuerza de voluntad. Es tener algo listo y saber que **la ola baja sola**.

Prepara tu kit el domingo, escoge tus tres rescates y pega la tarjeta en el refrigerador. Con eso ya no llegas a las cinco a improvisar.

Y no se te olvide lo de la primera página: **si tiembles o sudas frío, no es antojo** — es azúcar y es ahora.

— *Abuela Mei*

Aviso legal. Este material es una guía de cuidado casero de uso tradicional, con fines informativos y educativos. No es un medicamento, no constituye consulta médica y no sustituye el diagnóstico, el tratamiento ni el seguimiento de un profesional de la salud. No suspendas ni modifiques por tu cuenta ningún medicamento para la diabetes, la presión o el corazón. Varias plantas de uso tradicional pueden interactuar con la metformina, las sulfonilureas, la insulina, los anticoagulantes y los medicamentos para la presión: consulta a tu médico antes de empezar. Si tienes embarazo, lactancia, enfermedad del riñón o del hígado, o una cirugía programada, consulta antes de usar cualquiera de estos remedios.