

Probleme date la examenul de logică matematică și computațională. Partea a VIII-a

Claudia MUREȘAN

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Str. Academiei Nr. 14, Sector 1, Cod poștal 010014, București, România

Adrese de email: c.muresan@yahoo.com, cmuresan11@yahoo.com

Abstract

Textul de față conține probleme date de autoare la examenul aferent cursului de logică matematică și computațională din anul I de studiu al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București.

În cele ce urmează vom folosi notația “ddacă” drept prescurtare pentru sintagma “dacă și numai dacă”.

Amintim abrevierea “i. e.” (“id est”), semnificând “adică”.

Pentru noțiunile și rezultatele pe care le vom folosi în exercițiile următoare, recomandăm consultarea bibliografiei de la sfârșitul acestui text.

Amintim denumirile alternative:

- *poset* (de la englezescul “partially ordered set”) \equiv *mulțime parțial ordonată*
- *lanț* \equiv *mulțime total ordonată* \equiv *mulțime liniar ordonată*
- *poset mărginit* \equiv *poset cu prim și ultim element*
- *latice mărginită* \equiv *latice cu prim și ultim element*

Structurile algebrice cu care vom lucra vor fi desemnate, uneori, prin mulțimile lor suport.

Pentru orice număr natural nenul n , vom nota cu \mathcal{L}_n lanțul cu n elemente.

Laticile vor fi notate cu (L, \vee, \wedge, \leq) , laticile mărginite cu $(L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$, iar algebrele Boole cu $(B, \vee, \wedge, \leq, \bar{\cdot}, 0, 1)$, cu semnificația uzuală pentru fiecare simbol din aceste notații.

Amintim că:

- pentru orice mulțimi A, B, M astfel încât $M \subseteq B$ și orice funcție $f : A \rightarrow B$ cu imaginea $f(A) \subseteq M$, se definește *corestricția lui f la M* ca fiind funcția $g : A \rightarrow M$ dată de: $g(x) = f(x)$, pentru orice $x \in A$; de obicei, corestricția lui f la M se notează tot cu f ;
- pentru orice relație binară R pe o mulțime A , se definește *inversa lui R* ca fiind relația binară pe A notată cu R^{-1} și dată de: $R^{-1} = \{(a, b) \mid a, b \in A, (b, a) \in R\} \subseteq A^2 = A \times A$;
- legătura dintre operațiile \vee și \wedge și relația de ordine \leq în orice latice (L, \vee, \wedge, \leq) este: pentru orice elemente $x, y \in L$, au loc echivalențele: $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă $x \wedge y = x$;

- în orice latice (L, \vee, \wedge, \leq) , pentru orice elemente $a, b, x, y \in L$, dacă $\begin{cases} a \leq b \\ \text{și} \\ x \leq y, \end{cases}$ atunci $\begin{cases} a \vee x \leq b \vee y \\ \text{și} \\ a \wedge x \leq b \wedge y; \end{cases}$
- dacă $(L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este o latice mărginită, iar $x, y \in L$, atunci, prin definiție, y este complement al lui x în L dacă $\begin{cases} x \vee y = 1 \\ \text{și} \\ x \wedge y = 0; \end{cases}$
- algebra Boole trivială este algebra Boole cu un singur element, adică algebra Boole cu $0 = 1$, iar algebrele Boole netriviale sunt algebrele Boole care nu sunt triviale, adică algebrele Boole cu cel puțin două elemente;
- în orice algebră Boole $(B, \vee, \wedge, \leq, \bar{\cdot}, 0, 1)$, pentru orice elemente $x, y \in B$, au loc echivalențele: $\begin{cases} x \leq y \Leftrightarrow x \rightarrow y = 1 \\ \text{și} \\ x = y \Leftrightarrow x \leftrightarrow y = 1; \end{cases}$
- **Teorema de structură a algebrelor Boole finite** afirmă că orice algebră Boole finită este izomorfă cu o putere naturală a algebrei Boole standard, $\mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$.

În exercițiile din logica propozițională clasică, vom nota cu:

- V mulțimea variabilelor propoziționale;
- E mulțimea enunțurilor;
- $(E/\sim, \vee, \wedge, \leq, \bar{\cdot}, 0, 1)$ algebra Lindenbaum–Tarski a logicii propoziționale clasice, despre care știm că este o algebră Boole;
- $\vdash \varphi$ faptul că un enunț φ este o teoremă formală.

Amintim că, pentru orice $\varphi \in E$, are loc echivalența:

$$\vdash \varphi \Leftrightarrow \hat{\varphi} = 1,$$

unde $\hat{\varphi} \in E/\sim$ este clasa enunțului φ în algebra Lindenbaum–Tarski E/\sim .

De asemenea, pentru orice interpretare $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$, vom nota cu $\tilde{h} : E \rightarrow \mathcal{L}_2$ unica extindere a lui h la E care transformă conectorii logici (primitivi) în operații booleene.

1 Lista 1 de subiecte

Exercițiul 1.1. Oricărui poset $\mathcal{P} = (P, \leq)$ îi asociem relația binară $R_{\mathcal{P}} = \{(a, b) \mid a, b \in P, a \not\leq b, b \not\leq a\} \subseteq P^2$ ($R_{\mathcal{P}}$ este mulțimea perechilor de elemente incomparabile în posetul \mathcal{P}).

Acum considerăm un poset fixat $\mathcal{P} = (P, \leq)$, cu $P \neq \emptyset$.

Să se demonstreze că:

- (i) $R_{\mathcal{P}}$ e ireflexivă;
- (ii) $R_{\mathcal{P}}$ e simetrică;
- (iii) $R_{\mathcal{P}} = \emptyset$ ddacă \mathcal{P} este lanț;
- (iv) dacă \mathcal{P} nu este lanț, atunci $R_{\mathcal{P}}$ nu e tranzitivă;
- (v) dacă $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \leq, \bar{\cdot}, 0, 1)$ este o algebră Boole, iar $\mathcal{P}_{\mathcal{B}} = (B, \leq)$ este posetul subiacent lui \mathcal{B} , atunci: $\{x \in B \mid xR_{\mathcal{P}_{\mathcal{B}}} \bar{x}\} = B \setminus \{0, 1\}$.

Rezolvare: (i) \leq e reflexivă, i. e., pentru orice $a \in P$, are loc $a \leq a$, ceea ce înseamnă că, pentru orice $a \in P$, $(a, a) \notin R_{\mathcal{P}}$, adică $R_{\mathcal{P}}$ este ireflexivă.

(ii) Fie $a, b \in P$, astfel încât $(a, b) \in R_{\mathcal{P}}$, adică $a \not\leq b$ și $b \not\leq a$, altfel scris, $b \not\leq a$ și $a \not\leq b$, i. e. $(b, a) \in R_{\mathcal{P}}$. Așadar, $R_{\mathcal{P}}$ e simetrică.

(iii) Au loc echivalențele: \mathcal{P} este lanț ddacă oricare două elemente ale sale sunt comparabile, i. e., pentru orice $a, b \in P$, avem $a \leq b$ sau $b \leq a$, ceea ce înseamnă că, oricare ar fi $a, b \in P$, are loc $(a, b) \notin R_{\mathcal{P}}$, adică $R_{\mathcal{P}} = \emptyset$.

(iv) Aplicând succesiv (iii), (ii) și (i), obținem: dacă \mathcal{P} nu este lanț, atunci $R_{\mathcal{P}} \neq \emptyset$, adică există $a, b \in P$ astfel încât $(a, b) \in R_{\mathcal{P}}$, prin urmare $(b, a) \in R_{\mathcal{P}}$, iar acum faptul că $(a, a) \notin R_{\mathcal{P}}$ arată că $R_{\mathcal{P}}$ nu este tranzitivă.

(v) Să notăm cu $M = \{x \in B \mid (x, \bar{x}) \in R_{\mathcal{P}_{\mathcal{B}}}\} \subseteq B$. Avem de demonstrat că $M = B \setminus \{0, 1\}$.

Cum $0 \leq 1 = \bar{0}$, iar $\bar{1} = 0 \leq 1$, rezultă că $(0, \bar{0}) \notin R_{\mathcal{P}_{\mathcal{B}}}$ și $(1, \bar{1}) \notin R_{\mathcal{P}_{\mathcal{B}}}$, adică $0 \notin M$ și $1 \notin M$, deci $M \subseteq B \setminus \{0, 1\}$.

Fie $x \in B \setminus \{0, 1\}$, arbitrar, fixat. Presupunem prin absurd că $x \notin M$, i. e. $(x, \bar{x}) \notin R_{\mathcal{P}_{\mathcal{B}}}$, i. e. $x \leq \bar{x}$ sau $\bar{x} \leq x$.

Dacă $x \leq \bar{x}$, atunci $x = x \wedge \bar{x} = 0$, ceea ce este o contradicție cu faptul că $x \in B \setminus \{0, 1\}$.

Dacă $\bar{x} \leq x$, atunci $x = x \vee \bar{x} = 1$, ceea ce este tot o contradicție cu faptul că $x \in B \setminus \{0, 1\}$.

Prin urmare, $x \in M$. Am demonstrat că $B \setminus \{0, 1\} \subseteq M$.

Rezultă că $M = B \setminus \{0, 1\}$.

Exercițiul 1.2. Să se demonstreze că algebra Boole a elementelor complementate ale unei latice distributive mărginite cu exact 5 elemente este izomorfă cu algebra Boole standard.

Rezolvare: Fie $\mathcal{L} = (L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ o latice distributivă mărginită cu exact 5 elemente: $L = \{0, a, b, c, 1\}$, și fie $C(L)$ mulțimea elementelor complementate ale lui L . (De fapt, nu era necesară precizarea “mărginită”, pentru că orice latice finită și nevidă este mărginită.)


\mathcal{L} este distributivă, prin urmare orice element al său are cel mult un complement, deci fiecare element din $C(L)$ are exact un complement. Pentru fiecare element $x \in C(L)$, vom nota cu \bar{x} unicul său complement din \mathcal{L} ; desigur, la rândul său, $\bar{x} \in C(L)$, iar unicul complement al lui \bar{x} este x ($\bar{\bar{x}} = x$).

Desigur, $0, 1 \in C(L)$, cu $\bar{0} = 1$ (și, implicit, $\bar{1} = 0$), de unde, conform unicității complementului, rezultă că niciunul dintre elementele a, b, c nu are drept complement pe 0 sau pe 1, așadar complementele elementelor a, b, c , dacă există, se află tot în mulțimea $\{a, b, c\}$.


Știm că $(C(L), \vee, \wedge, \leq, \bar{\cdot}, 0, 1)$ este o algebră Boole, unde am notat la fel operațiile și relația de ordine ale lui \mathcal{L} cu cele restricționate la $C(L)$ (cele induse pe $C(L)$). Această algebră Boole va fi referită tot prin $C(L)$, ca și mulțimea sa suport.

În posetul mărginit $(L, \leq, 0, 1)$ putem avea următoarele ordonări ale elementelor $0, a, b, c, 1$, modulo permutări ale mulțimii $\{a, b, c\}$:


- (i) $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$; atunci $\mathcal{L} = \mathcal{L}_5$ (\mathcal{L} este lanțul cu 5 elemente), cu următoarea diagramă Hasse:




- (ii) $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 1$, $0 \leq c \leq 1$, iar a, b, c sunt două câte două incomparabile; atunci \mathcal{L} este diamantul, care este o latice nedistributivă, deci acest caz este exclus:




- (iii) $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq c \leq 1$, iar a nu este comparabil nici cu b , nici cu c ; atunci \mathcal{L} este pentagonul, care este o latice nedistributivă, deci și acest caz este exclus:



- (iv) $0 \leq a \leq c \leq 1$, $0 \leq b \leq c \leq 1$, iar a și b sunt incomparabile:



- (v) $0 \leq a \leq b \leq 1$, $0 \leq a \leq c \leq 1$, iar b și c sunt incomparabile:



Cazurile în care se obține o latice distributivă sunt (i), (iv) și (v).

În cazul (i), cum \mathcal{L} este lanț, au loc: $\vee = \max$ și $\wedge = \min$, prin urmare, oricare ar fi $x, y \in \{a, b, c\}$, $x \vee y = \max\{x, y\} \in \{x, y\} \subseteq \{a, b, c\} = L \setminus \{0, 1\}$, deci $x \vee y \neq 1$. Rezultă că niciunul dintre elementele a, b, c nu este complementat ($a, b, c \notin C(L)$), așadar $C(L) = \{0, 1\} = \mathcal{L}_2$, adică $C(L)$ este (izomorfă cu) algebra Boole standard.

În cazul (iv), $a \vee b = a \vee c = b \vee c = c \neq 1$, așadar și aici $a, b, c \notin C(L)$, deci $C(L) = \{0, 1\} = \mathcal{L}_2$, adică $C(L)$ este (izomorfă cu) algebra Boole standard.

În cazul (v), $a \wedge b = a \wedge c = b \wedge c = a \neq 0$, deci și în acest caz $a, b, c \notin C(L)$, așadar $C(L) = \{0, 1\} = \mathcal{L}_2$, adică $C(L)$ este (izomorfă cu) algebra Boole standard.

Exercițiul 1.3. Fie $\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi \in E$, astfel încât: $\varphi = \neg \alpha \rightarrow (\beta \wedge \neg \gamma)$ și $\psi = (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \alpha$.

Să se demonstreze că: $\vdash \varphi$ ddacă $\vdash \psi$.

Rezolvare: Să notăm clasele enunțurilor α, β, γ în algebra Lindenbaum–Tarski E/\sim cu x, y, z , respectiv, adică: $x = \hat{\alpha}$, $y = \hat{\beta}$, $z = \hat{\gamma}$. Acum să calculăm clasele lui φ și ψ în E/\sim :

$$\hat{\varphi} = \hat{\alpha} \rightarrow (\hat{\beta} \wedge \hat{\gamma}) = \bar{x} \rightarrow (y \wedge z) = \bar{x} \vee \overline{(y \wedge z)} = x \vee \overline{(y \wedge z)};$$

$$\hat{\psi} = (\hat{\beta} \rightarrow \hat{\gamma}) \rightarrow \hat{\alpha} = (y \rightarrow z) \rightarrow x = \overline{(y \vee z)} \vee x = x \vee \overline{(y \vee z)} = x \vee (\bar{y} \wedge \bar{z}) = x \vee (y \wedge z).$$

Am folosit definiția implicației într-o algebră Boole și **legile lui de Morgan**.

Așadar, $\hat{\varphi} = \hat{\psi}$, prin urmare au loc echivalențele: $\vdash \varphi$ ddacă $\hat{\varphi} = 1$ ddacă $\hat{\psi} = 1$ ddacă $\vdash \psi$.

2 Lista 2 de subiecte

Exercițiul 2.1. Oricărui poset $\mathcal{P} = (P, \leq)$ îi asociem relația binară $Q_{\mathcal{P}} = \{(a, b) \mid a, b \in P, \exists \sup\{a, b\} \text{ în } \mathcal{P}\} \subseteq P^2$.

De asemenea, pentru orice poset $\mathcal{P} = (P, \leq)$, notăm cu $\overline{\mathcal{P}}$ posetul dual: $\overline{\mathcal{P}} = (P, \geq)$, unde am folosit notația uzuală $\geq = \leq^{-1}$.

Acum considerăm un poset fixat $\mathcal{P} = (P, \leq)$, cu $P \neq \emptyset$.

Să se demonstreze că:

(i) $Q_{\mathcal{P}}$ este reflexivă;

(ii) $Q_{\mathcal{P}}$ e simetrică;

(iii) $Q_{\mathcal{P}}$ nu e neapărat tranzitivă;


(iv) $Q_{\mathcal{P}} \supseteq (\leq \cup \geq)$;

(v) \mathcal{P} este latice ddacă $Q_{\mathcal{P}} = Q_{\overline{\mathcal{P}}} = P^2$.


Rezolvare: (i) Pentru orice $a \in P$, există $\sup\{a, a\} = \sup\{a\} = a$ în \mathcal{P} , aşadar $(a, a) \in Q_{\mathcal{P}}$, deci $Q_{\mathcal{P}}$ e reflexivă.

(ii) Pentru orice $a, b \in P$, $\{a, b\} = \{b, a\}$, deci există $\sup\{a, b\}$ în \mathcal{P} ddacă există $\sup\{b, a\}$ în \mathcal{P} , adică $(a, b) \in Q_{\mathcal{P}}$ ddacă $(b, a) \in Q_{\mathcal{P}}$, prin urmare $Q_{\mathcal{P}}$ e simetrică.


(iii) În fiecare dintre următoarele poseturi au loc: $(a, b) \in Q_{\mathcal{P}}$, $(b, c) \in Q_{\mathcal{P}}$, dar $(a, c) \notin Q_{\mathcal{P}}$, deci $Q_{\mathcal{P}}$ nu e tranzitivă (desigur, în cadrul unui examen, este suficient să se dea un singur (contra)exemplu):



$\sup\{a, b\} = x$
 $\sup\{b, c\} = y$
 mulțimea $\{a, c\}$ nu are majoranți,
 deci nu există $\sup\{a, c\}$



la fel ca în posetul anterior



$\sup\{a, b\} = \max\{a, b\} = a$
 $\sup\{b, c\} = \max\{b, c\} = c$
 mulțimea $\{a, c\}$ nu are majoranți,
 deci nu există $\sup\{a, c\}$

(iv) Fie $a, b \in P$, arbitrare, fixate.

Dacă $(a, b) \in \leq$, i. e. $a \leq b$, atunci există $\sup\{a, b\} = \max\{a, b\} = b$ în \mathcal{P} , deci $(a, b) \in Q_{\mathcal{P}}$. Prin urmare $\leq \subseteq Q_{\mathcal{P}}$.

Dacă $(a, b) \in \geq$, i. e. $a \geq b$, i. e. $b \leq a$, atunci există $\sup\{a, b\} = \max\{a, b\} = a$ în \mathcal{P} , deci $(a, b) \in Q_{\mathcal{P}}$. Prin urmare $\geq \subseteq Q_{\mathcal{P}}$.

Am obținut: $Q_{\mathcal{P}} \supseteq (\leq \cup \geq)$.

(v) Știm că supremul și infimul sunt noțiuni duale una alteia, adică supremul în posetul dual, $\overline{\mathcal{P}}$, coincide cu infimul în \mathcal{P} . Prin urmare, $Q_{\overline{\mathcal{P}}} = \{(a, b) \mid a, b \in P, \exists \inf\{a, b\} \text{ în } \mathcal{P}\}$.

Conform definiției, $\mathcal{P} = (P, \leq)$ este latice ddacă, pentru orice $a, b \in P$, există $\sup\{a, b\}$ și $\inf\{a, b\}$ în \mathcal{P} , adică, pentru orice $a, b \in P$, $(a, b) \in Q_{\mathcal{P}}$ și $(a, b) \in Q_{\overline{\mathcal{P}}}$, i. e. $Q_{\mathcal{P}} = Q_{\overline{\mathcal{P}}} = P^2$.

Exercițiul 2.2. Fie $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \leq, \bar{\cdot}, 0, 1)$ o algebra Boole și $(B^2, \vee, \wedge, \leq, \bar{\cdot}, 0, 1)$ algebra Boole produs direct a lui \mathcal{B} cu ea însăși, cu operațiile și relația de ordine definite pe componente și notate la fel ca acelea ale lui \mathcal{B} .

Considerăm funcția $f : B^2 \rightarrow B$, definită prin: $f(x, y) = x \vee y$, pentru orice $x, y \in B$.

Să se demonstreze că:

(i) f comută cu \vee , 0 și 1;

(ii) f e morfism boolean ddacă \mathcal{B} este algebra Boole trivială.

Rezolvare: (i) $f(0) = f(0, 0) = 0 \vee 0 = 0$ și $f(1) = f(1, 1) = 1 \vee 1 = 1$. Deci f comută cu 0 și cu 1.

Fie $x, y, a, b \in B$, arbitrare, fixate. $f((x, y) \vee (a, b)) = f(x \vee a, y \vee b) = x \vee a \vee y \vee b = x \vee y \vee a \vee b = f(x, y) \vee f(a, b)$. Deci f comută cu \vee . Am folosit asociativitatea și comutativitatea operației \vee a lui \mathcal{B} .

(ii) “ \Leftarrow ”: Dacă \mathcal{B} este algebra Boole trivială, i. e. $B = \{\beta\}$, cu unicul element $\beta = 0 = 1$ și cu toate operațiile de algebră Boole având ca rezultat pe β , atunci $B^2 = \{(\beta, \beta)\}$, cu toate operațiile de algebră Boole având ca rezultat pe (β, β) , iar $f : \{(\beta, \beta)\} \rightarrow \{\beta\}$ este definită prin: $f(\beta, \beta) = \beta \vee \beta = \beta$. Evident, în acest caz, f este morfism de algebre Boole.

“ \Rightarrow ”: Dacă f este morfism de algebre Boole, atunci f comută cu operația de complementare, așadar $f(\overline{(0, 1)}) = \overline{f(0, 1)}$, adică $f(1, 0) = \overline{0 \vee 1}$, i. e. $1 \vee 0 = \overline{1}$, adică $1 = 0$, deci \mathcal{B} este algebra Boole trivială.

Exercițiul 2.3. Să se demonstreze că: pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in E$, mulțimea

$$\Sigma = \{\varphi \wedge (\psi \leftrightarrow \neg \chi), ((\varphi \wedge \psi) \vee \neg \neg \chi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \leftrightarrow \psi)\} \subset E$$

nu admite niciun model (i. e. nu există nicio interpretare h , astfel încât $h \models \Sigma$).

Rezolvare: Să notăm cu $\alpha = \varphi \wedge (\psi \leftrightarrow \neg \chi) \in E$ și $\beta = ((\varphi \wedge \psi) \vee \neg \neg \chi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \leftrightarrow \psi) \in E$. Avem: $\Sigma = \{\alpha, \beta\} \subset E$. Presupunem prin absurd că există $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$, astfel încât $h \models \Sigma$, i. e. $\tilde{h}(\alpha) = \tilde{h}(\beta) = 1$.

Așadar, $1 = \tilde{h}(\alpha) = \tilde{h}(\varphi) \wedge (\tilde{h}(\psi) \leftrightarrow \overline{\tilde{h}(\chi)})$, deci $\tilde{h}(\varphi) = 1$ și $\tilde{h}(\psi) \leftrightarrow \overline{\tilde{h}(\chi)} = 1$, iar ultima dintre aceste două egalități este echivalentă cu $\tilde{h}(\psi) = \overline{\tilde{h}(\chi)}$.

Rezultă că $1 = \tilde{h}(\beta) = ((\tilde{h}(\varphi) \wedge \tilde{h}(\psi)) \vee \overline{\tilde{h}(\chi)}) \rightarrow ((\tilde{h}(\varphi) \rightarrow \tilde{h}(\chi)) \leftrightarrow \tilde{h}(\psi)) = ((1 \wedge \tilde{h}(\psi)) \vee \overline{\tilde{h}(\chi)}) \rightarrow ((1 \rightarrow \tilde{h}(\chi)) \leftrightarrow \tilde{h}(\psi)) = (\tilde{h}(\psi) \vee \overline{\tilde{h}(\chi)}) \rightarrow ((\overline{1} \vee \tilde{h}(\chi)) \leftrightarrow \tilde{h}(\psi)) = (\overline{\tilde{h}(\chi)} \vee \tilde{h}(\chi)) \rightarrow ((0 \vee \tilde{h}(\chi)) \leftrightarrow \tilde{h}(\chi)) = 1 \rightarrow (\tilde{h}(\chi) \leftrightarrow \overline{\tilde{h}(\chi)}) = 1 \rightarrow 0 = 0$, pentru că, în \mathcal{L}_2 , $\tilde{h}(\chi) \neq \overline{\tilde{h}(\chi)}$. Am obținut $1 = 0$ în \mathcal{L}_2 , ceea ce este o contradicție.

Așadar, nu există nicio interpretare h care să satisfacă Σ .

3 Lista 3 de subiecte

Exercițiul 3.1. Fie $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole.

Pentru orice relație binară $R \subseteq B^2$, notăm cu $\neg R$ următoarea relație binară pe B : $\neg R = \{(\bar{a}, \bar{b}) \mid a, b \in B, \text{ astfel încât } (a, b) \in R\} \subseteq B^2$.

Să se demonstreze că:

(i) pentru orice $R \subseteq B^2$ și orice $a, b \in B$, au loc echivalențele: $\begin{cases} aRb \text{ dacă } \bar{a} \neg R \bar{b}; \\ a \neg R b \text{ dacă } \bar{a} R \bar{b}; \end{cases}$

(ii) pentru orice $R \subseteq B^2$, $\neg \neg R = R$;

(iii) pentru orice $R \subseteq B^2$ și orice $S \subseteq B^2$, au loc: $\begin{cases} R \subseteq S \text{ dacă } \neg R \subseteq \neg S; \\ \neg(R \cup S) = \neg R \cup \neg S; \\ \neg(R \cap S) = \neg R \cap \neg S; \\ \neg(R \setminus S) = \neg R \setminus \neg S; \end{cases}$

(iv) dacă R este o congruență a lui \mathcal{B} , atunci $R = \neg R$;

(v) $\neg \leq = \geq$, unde am notat $\geq = \leq^{-1}$.

Rezolvare: Pentru cele ce urmează, fie $R \subseteq B^2$ și $a, b \in B$, arbitrare, fixate.

(i) Conform definiției lui $\neg R$, dacă aRb , atunci $\bar{a} \neg R \bar{b}$.

Dacă $\bar{a} \neg R \bar{b}$, atunci, conform definiției lui $\neg R$, există $c, d \in B$, astfel încât cRd și $\bar{c} = \bar{a}$, iar $\bar{d} = \bar{b}$. Unicitatea complementului în algebre Boole ne asigură de faptul că $c = a$ și $d = b$. Conform alegerii lui c și d , are loc cRd , așadar aRb .

Am demonstrat că aRb ddacă $\bar{a} \neg R \bar{b}$.

Din idempotența operației de complementare și echivalența anterioară rezultă că: $a \neg R b$ ddacă $\bar{\bar{a}} \neg R \bar{\bar{b}}$ ddacă $\bar{a} R \bar{b}$.

(ii) Folosind punctul (i), obținem echivalențele: $a \neg \neg R b$ ddacă $\bar{a} \neg R \bar{b}$ ddacă aRb . Așadar, $(a, b) \in \neg \neg R$ ddacă $(a, b) \in R$, prin urmare $\neg \neg R = R$.

(iii) Pentru acest punct, fie și $S \subseteq B^2$, arbitrară, fixată.

Dacă $R \subseteq S$, atunci, conform punctului (i), avem: dacă $a \neg R b$, ceea ce este echivalent cu $\bar{a} R \bar{b}$, atunci $\bar{a} S \bar{b}$, ceea ce este echivalent cu $a \neg S b$, așadar $\neg R \subseteq \neg S$. Deci are loc implicația: $R \subseteq S$ implică $\neg R \subseteq \neg S$, prin urmare și: $\neg R \subseteq \neg S$ implică $\neg \neg R \subseteq \neg \neg S$, ceea ce este echivalent cu $R \subseteq S$, conform punctului (ii). Așadar, au loc ambele implicații, adică este satisfăcută echivalența: $R \subseteq S$ ddacă $\neg R \subseteq \neg S$.

Prin aplicarea punctului (i) și a definițiilor operațiilor cu mulțimi, obținem:

$(a, b) \in \neg(R \cup S)$ ddacă $(\bar{a}, \bar{b}) \in R \cup S$ ddacă $\begin{cases} (\bar{a}, \bar{b}) \in R \\ \text{sau} \\ (\bar{a}, \bar{b}) \in S \end{cases}$ ddacă $\begin{cases} (a, b) \in \neg R \\ \text{sau} \\ (a, b) \in \neg S \end{cases}$ ddacă $(a, b) \in \neg R \cup \neg S$, prin urmare $\neg(R \cup S) = \neg R \cup \neg S$;

$(a, b) \in \neg(R \cap S)$ ddacă $(\bar{a}, \bar{b}) \in R \cap S$ ddacă $\begin{cases} (\bar{a}, \bar{b}) \in R \\ \text{și} \\ (\bar{a}, \bar{b}) \in S \end{cases}$ ddacă $\begin{cases} (a, b) \in \neg R \\ \text{și} \\ (a, b) \in \neg S \end{cases}$ ddacă $(a, b) \in \neg R \cap \neg S$, prin urmare $\neg(R \cap S) = \neg R \cap \neg S$;

$(a, b) \in \neg(R \setminus S)$ ddacă $(\bar{a}, \bar{b}) \in R \setminus S$ ddacă $\begin{cases} (\bar{a}, \bar{b}) \in R \\ \text{și} \\ (\bar{a}, \bar{b}) \notin S \end{cases}$ ddacă $\begin{cases} (a, b) \in \neg R \\ \text{și} \\ (a, b) \notin \neg S \end{cases}$ ddacă $(a, b) \in \neg R \setminus \neg S$, prin urmare $\neg(R \setminus S) = \neg R \setminus \neg S$.

(iv) Presupunem că R este o congruență a lui \mathcal{B} . Atunci R este compatibilă cu operația de complementare, așadar: dacă aRb , atunci $\bar{a}R\bar{b}$, ceea ce implică $\bar{\bar{a}}R\bar{\bar{b}}$, ceea ce este echivalent cu aRb , în conformitate cu idempotența complementării. Am demonstrat că aRb ddacă $\bar{a}R\bar{b}$.

Dar, conform punctului (i), $\bar{a}R\bar{b}$ ddacă $a \neg R b$.

Așadar, aRb ddacă $a \neg R b$, i. e. $(a, b) \in R$ ddacă $(a, b) \in \neg R$, deci $R = \neg R$.

(v) Conform definiției lui $\geq = \leq^{-1}$, are loc: $a \geq b$ ddacă $b \leq a$. Dar, conform unei proprietăți a algebrelor Boole, $b \leq a$ ddacă $\bar{a} \leq \bar{b}$, iar, conform punctului (i), $\bar{a} \leq \bar{b}$ ddacă $a \neg \leq b$.

Prin urmare, are loc echivalența: $a \geq b$ ddacă $a \neg \leq b$, adică $(a, b) \in \geq$ ddacă $(a, b) \in \neg \leq$, deci $\geq = \neg \leq$.

Exercițiul 3.2. Fie $(A, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ și $(B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ două latici mărginite (care vor fi referite prin mulțimile lor suport), iar $f : A \rightarrow B$ și $g : A \rightarrow B$ două morfisme de latici mărginite.

Notăm cu $M = \{x \in A \mid f(x) = g(x)\} \subseteq A$.

Să se demonstreze că:

(i) dacă A este algebră Boole, atunci $f(A)$ este algebră Boole și corestricția $f : A \rightarrow f(A)$ este morfism boolean;

- (ii) M este o sublatice mărginită a lui A ;
- (iii) dacă A este algebră Boole, **nu rezultă** că M este o subalgebră Boole a lui A ;
- (iv) $f(M) = g(M) \subseteq f(A) \cap g(A)$, dar nu are neapărat loc egalitatea în acea incluziune.

Rezolvare: (i) Cum A și B sunt latici mărginite și $f : A \rightarrow B$ este un morfism de latici mărginite, rezultă că $f(A)$ este o latice mărginită cu operațiile induse de cele ale lui B (i. e. o sublatice mărginită a lui B).

Presupunem că A este o algebră Boole, deci A este distributivă și complementată.

Fie $x, y, z \in f(A)$, arbitrare, fixate. Rezultă că există $a, b, c \in A$, astfel încât $x = f(a), y = f(b), z = f(c)$. Întrucât A este distributivă, rezultă că $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$, prin urmare, aplicând pe f în ambii membri și apoi folosind faptul că f este morfism de latici, $f(a \vee (b \wedge c)) = f((a \vee b) \wedge (a \vee c))$, așadar $f(a) \vee f(b \wedge c) = f(a \vee b) \wedge f(a \vee c)$, deci $f(a) \vee (f(b) \wedge f(c)) = (f(a) \vee f(b)) \wedge (f(a) \vee f(c))$, adică $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$. Conform echivalenței celor două legi de distributivitate în orice latice, rezultă că $f(A)$ satisface și cealaltă lege de distributivitate, deci este distributivă.

Am obținut că $f(A)$ este o latice distributivă mărginită, desigur, cu primul element $0 = f(0)$ și ultimul element $1 = f(1)$ (primul și, respectiv, ultimul element al lui B).

Fie $x \in f(A)$, arbitrar, fixat. Rezultă că există $a \in A$, astfel încât $x = f(a)$. A este complementată, prin urmare există un element $\bar{a} \in A$, astfel încât

$$\begin{cases} a \vee \bar{a} = 1 \\ \text{și} \\ a \wedge \bar{a} = 0. \end{cases} \quad \text{Prin urmare,}$$

$$\begin{cases} x \vee f(\bar{a}) = f(a) \vee f(\bar{a}) = f(a \vee \bar{a}) = f(1) = 1 \\ \text{și} \\ x \wedge f(\bar{a}) = f(a) \wedge f(\bar{a}) = f(a \wedge \bar{a}) = f(0) = 0, \end{cases} \quad \text{așadar } f(\bar{a}) \in f(A) \text{ este complement al lui } x$$

în laticea mărginită $f(A)$. Deci $f(A)$ este și complementată.

Am obținut că $f(A)$ este o latice mărginită distributivă și complementată, adică o algebră Boole.

$f : A \rightarrow B$ este un morfism de latici mărginite, prin urmare corestricția sa la $f(A)$, $f : A \rightarrow f(A)$, este, de asemenea, morfism de latici mărginite.

A și $f(A)$ sunt algebre Boole, deci satisfac existența și unicitatea complementului. Să notăm, cum este uzual, cu $\bar{}$ operația de complementare a fiecăreia dintre aceste algebre Boole. Conform calculului de mai sus, rezultă că, pentru orice element $a \in A$, complementul lui $f(a)$ în algebra Boole $f(A)$ este $f(\bar{a})$, adică $\overline{f(a)} = f(\bar{a})$, așadar f comută și cu operația de complementare.

Rezultă că $f : A \rightarrow f(A)$ este morfism de algebre Boole.

(ii) M este o submulțime a laticii mărginite A .

f și g sunt morfisme de latici mărginite, prin urmare $f(0) = 0 = g(0)$ și $f(1) = 1 = g(1)$, deci $0, 1 \in M$.

Fie $a, b \in M$, adică $a, b \in A$, astfel încât $f(a) = g(a)$ și $f(b) = g(b)$. Aplicând faptul că f și g sunt morfisme de latici, deci comută cu \vee și \wedge , obținem:

$$f(a \vee b) = f(a) \vee f(b) = g(a) \vee g(b) = g(a \vee b), \text{ așadar } a \vee b \in M;$$


$$f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b) = g(a) \wedge g(b) = g(a \wedge b), \text{ așadar } a \wedge b \in M.$$

Am obținut că M este închisă la $0, 1, \vee$ și \wedge , deci M este o sublatice mărginită a lui A .

(iii) Pentru a rezolva acest punct, vom găsi un exemplu care să illustreze situația cerută. Conform punctului (i), în cazul în care A este o algebră Boole, $f(A)$ și $g(A)$ sunt tot algebre Boole, iar corestricțiile $f : A \rightarrow f(A)$ și $g : A \rightarrow g(A)$ sunt morfisme booleene.

În exemplul de mai jos, $A = \mathcal{L}_2^2$ (A este romb), care este o algebră Boole, B este diamantul, morfismele de latici mărginite $f : A \rightarrow B$ și $g : A \rightarrow B$ corestricționate la imaginile lor ($f : A \rightarrow f(A)$ și $g : A \rightarrow g(A)$, respectiv) sunt chiar izomorfisme booleene, iar $M = \mathcal{L}_3$ (M este lanțul cu trei elemente), care nu este o algebră Boole, așadar nu este subalgebră Boole a lui A .

Fie, așadar, $A = \{0, a, b, 1\}$ și $B = \{0, x, y, z, 1\}$, cu diagramele Hasse desenate mai jos, iar $f : A \rightarrow B$ și $g : A \rightarrow B$ date de tabelul de dedesubtul acestor diagrame Hasse.



α	0	a	b	1
$f(\alpha)$	0	y	x	1
$g(\alpha)$	0	y	z	1

Este clar că f și g sunt morfisme de latici mărginite.

$f(A) = \{0, x, y, 1\}$ și $g(A) = \{0, y, z, 1\}$. A , $f(A)$ și $g(A)$ sunt algebre Boole, fiecare izomorfă cu \mathcal{L}_2^2 (rombul), iar $f : A \rightarrow f(A)$ și $g : A \rightarrow g(A)$ sunt izomorfisme booleene.

După cum se observă, submulțimea $M = \{\alpha \in A \mid f(\alpha) = g(\alpha)\}$ a lui A este $M = \{0, a, 1\} = \mathcal{L}_3$ (lanțul cu 3 elemente), care este o sublatice mărginită a lui B , este o latice mărginită și distributivă, dar nu este o algebră Boole, pentru că elementul a nu are complement în M (a se vedea și **Teorema de structură a algebrelor Boole finite**, care arată că orice algebră Boole finită are cardinalul egal cu o putere naturală a lui 2, deci M nu poate fi organizată ca o algebră Boole, pentru că are cardinalul egal cu 3).

(iv) În exemplul de la punctul (iii), are loc egalitatea: $f(M) = g(M) = f(A) \cap g(A)$, pentru că $M = \{0, a, 1\}$ și $f(\{0, a, 1\}) = g(\{0, a, 1\}) = \{0, y, 1\} = f(A) \cap g(A)$.

Dar, dacă am considera aceleași latici mărginite A și B ca în exemplul de la punctul (iii), însă morfismele de latici mărginite $f : A \rightarrow B$ și $g : A \rightarrow B$ date de tabelul următor, atunci: $f(A) = \{0, x, y, 1\}$, $g(A) = \{0, y, z, 1\}$, deci $f(A) \cap g(A) = \{0, y, 1\}$, dar $M = \{0, 1\}$, deci $f(M) = g(M) = \{0, 1\} \subsetneq f(A) \cap g(A)$.

α	0	a	b	1
$f(\alpha)$	0	x	y	1
$g(\alpha)$	0	y	z	1

A rămas de demonstrat faptul că are loc întotdeauna $f(M) = g(M) \subseteq f(A) \cap g(A)$, în ipotezele exercițiului.

Cum $M \subseteq A$, rezultă că $f(M) \subseteq f(A)$. Acum, fie $\beta \in f(M)$. Atunci există $\alpha \in M$, astfel încât $\beta = f(\alpha)$. Conform definiției lui M , faptul că $\alpha \in M$ implică $f(\alpha) = g(\alpha)$. Așadar, $\beta = g(\alpha) \in g(M) \subseteq g(A)$. Prin urmare, $f(M) \subseteq g(M) \subseteq g(A)$. Din faptul că $f(M) \subseteq f(A)$ și faptul că $f(M) \subseteq g(A)$, rezultă că $f(M) \subseteq f(A) \cap g(A)$.

Am demonstrat că $f(M) \subseteq g(M)$ și că $f(M) \subseteq f(A) \cap g(A)$.

Analog se demonstrează că $g(M) \subseteq f(M)$ (și $g(M) \subseteq f(A) \cap g(A)$, cu toate că această incluziune va rezulta oricum din egalitatea $f(M) = g(M)$ și incluziunea $f(M) \subseteq f(A) \cap g(A)$ de mai sus).

Prin urmare, $f(M) = g(M) \subseteq f(A) \cap g(A)$.

Exercițiul 3.3. Fie $\alpha, \beta, \varphi, \psi \in E$, astfel încât $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ și $\vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Să se demonstreze că: $\vdash (\psi \rightarrow \alpha) \rightarrow (\varphi \rightarrow \beta)$.

Rezolvare: Fie a, b, x, y clasele enunțurilor $\alpha, \beta, \varphi, \psi$, respectiv, în algebra Lindenbaum–Tarski E/\sim , i. e.: $a = \hat{\alpha}$, $b = \hat{\beta}$, $x = \hat{\varphi}$ și $y = \hat{\psi}$.

$\vdash \varphi \rightarrow \psi$, așadar $\widehat{\varphi \rightarrow \psi} = 1$, i. e. $\hat{\varphi} \rightarrow \hat{\psi} = 1$, adică $x \rightarrow y = 1$, deci $x \leq y$, ceea ce este echivalent cu $\bar{y} \leq \bar{x}$.

$\vdash \alpha \rightarrow \beta$, așadar $\widehat{\alpha \rightarrow \beta} = 1$, i. e. $\hat{\alpha} \rightarrow \hat{\beta} = 1$, adică $a \rightarrow b = 1$, deci $a \leq b$.

Din inegalitățile $\bar{y} \leq \bar{x}$ și $a \leq b$ rezultă că: $\bar{y} \vee a \leq \bar{x} \vee b$, adică $y \rightarrow a \leq x \rightarrow b$, deci $(y \rightarrow a) \rightarrow (x \rightarrow b) = 1$, așadar $(\hat{\psi} \rightarrow \hat{\alpha}) \rightarrow (\hat{\varphi} \rightarrow \hat{\beta}) = 1$, adică $(\psi \rightarrow \alpha) \rightarrow (\varphi \rightarrow \beta) = 1$, prin urmare $\vdash (\psi \rightarrow \alpha) \rightarrow (\varphi \rightarrow \beta)$.

Bibliografie

- [1] S. Burris, H. P. Sankappanavar, *A Course in Universal Algebra*, The Millenium Edition, disponibilă online.
- [2] D. Bușneag, D. Piciu, *Lecții de algebră*, Editura Universitaria Craiova, 2002.
- [3] D. Bușneag, D. Piciu, *Probleme de logică și teoria mulțimilor*, Craiova, 2003.
- [4] V. E. Căzănescu, *Curs de bazele informaticii*, Tipografia Universității din București, 1974, 1975, 1976.
- [5] G. Georgescu, *Elemente de logică matematică*, Academia Militară, București, 1978.
- [6] G. Georgescu, A. Iorgulescu, *Logică matematică*, Editura ASE, București, 2010.
- [7] K. Kuratowski, *Introducere în teoria mulțimilor și în topologie*, traducere din limba poloneză, Editura Tehnică, București, 1969.
- [8] S. Rudeanu, *Curs de bazele informaticii*, Tipografia Universității din București, 1982.
- [9] A. Scorpan, *Introducere în teoria axiomatică a mulțimilor*, Editura Universității din București, 1996.
- [10] Articolele cu probleme date la examenul de logică matematică și computațională, precum și celelalte articole din *Revista de logică*, publicație online, în care se află și articolul de față.
- [11] Cursurile de logică matematică și computațională de pe site-ul Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București (pe serverul de cursuri).