

Metoda Newton

Scurt istoric: antichitate

Metoda babiloniana sau metoda lui Heron: dandu-se un numar $c \in \mathbb{R}$, aceasta metoda consta in calcularea iterativa a lui $x = \sqrt{c} \Leftrightarrow x^2 - c = 0$:

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{c}{x_k} \right) \\&= x_k - \frac{1}{2x_k} (x_k^2 - c)\end{aligned}$$

Este considerata drept precursor (caz special) al metodei Newton. Utilizata de babilonieni, descrisa prima data de catre Heron din Alexandria.



Scurt istoric: secolul al XVII-lea

In 1669, Isaac Newton imbunatatescă o tehnica a perturbațiilor dezvoltată de Francois Viète pentru a afla soluțiile unei ecuații $F(x) = 0$, unde $F(x)$ este un polinom.


Având un punct de pornire x_0 , ideea principală este linearizarea:

$$F(x_0 + h) = F(x_0) + F'(x_0)h$$

Astfel, să se gasească h astfel încât $F(x_0 + h) = 0$, ce conduce la iteratia :

$$x_{k+1} = x_k - F'(x_k)^{-1}F(x_k) \quad (1)$$

Metoda originală a lui Newton a fost pur algebraică. În 1669, Joseph Raphson consideră că $F(x)$ nu trebuie să fie neapărat polinom și prezintă forma generală (1) utilizând conceptul de derivată. De aceea, metoda se numește metoda Newton-Raphson.



Metoda Newton in Optimizare

Consideram $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si problema de optimizare aferenta:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

Din conditiile de optimalitate de ordinul I pentru probleme neconstranse amintim: x^* este punct de minim local daca $\nabla f(x^*) = 0$ si $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, unde $\nabla^2 f(x^*)$ denota Hessiana lui $f(x)$ in punctul x^* .

Astfel, pentru a afla x^* trebuie sa mai intai aflam solutia ecuatiei:

$$F(x) = \nabla f(x) = 0$$

• **Interpretare:** Aplicand metoda lui Newton-Raphson in acest caz, rezulta iteratia:

$$x_{k+1} = x_k - (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$$

Metoda Newton in Optimizare

Fiind metoda iterativa, metoda lui Newton se poate scrie drept:

$$x_{k+1} = x_k + d_k$$

unde $d_k = -(\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$ se numeste directia Newton

- **Interpretare:** daca $\nabla f(x)^2 \succ 0$, atunci $\langle d_k, \nabla f(x_k) \rangle < 0$, i.e d_k este o directie de descrestere.
- **Interpretare:** metoda Newton poate fi obtinuta din aproximarea Taylor de ordinul doi a functiei obiectiv f :

$$f(x_{k+1}) \approx f(x_k) + \nabla f(x_k)^T (x_{k+1} - x_k) + \frac{1}{2} (x_{k+1} - x_k)^T \nabla^2 f(x_k) (x_{k+1} - x_k)$$

Urmatoarea iteratie, x_{k+1} , trebuie sa minimizeze aproximarea Taylor, de unde rezulta:

$$x_{k+1} = \arg \min_y \underbrace{f(x_k) + \nabla f(x_k)^T (y - x_k) + \frac{1}{2} (y - x_k)^T \nabla^2 f(x_k) (y - x_k)}_{q(y)}$$

Metoda Newton in Optimizare

Daca $\nabla^2 f(x_k) \succ 0$, atunci $q(y)$ este o functie patratica strict convexa. Din conditiile de optimalitate pentru probleme QP strict convexe, rezulta:

$$\nabla q(y) = 0 \Rightarrow \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k)(y - x_k) = 0$$

Din moment ce $y = x_{k+1}$, prin rezolvarea ecuatiei anterioare in y rezulta din nou iteratia:

$$x_{k+1} = x_k - (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$$

Observatie, din moment ce directia Newton $d_k = x_{k+1} - x_k$, atunci se poate exprima drept:


$$d_k = \arg \min_d f(x_k) + \nabla f(x_k)^T d + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x_k) d.$$

Din nou, utilizand conditiile de optimalitate, rezulta:

$$d_k = -(\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$$

Metoda Newton in Optimizare

Iteratie metoda Newton prin aproximarea patratica Taylor:



Observatie: metoda Newton pentru functii $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este chiar metoda Newton de interpolare din cursul III:

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= \arg \min_x q(x) = \arg \min_x f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2}f''(x_k)(x - x_k)^2 \\&= x_k - (f''(x_k))^{-1} f'(x_k)\end{aligned}$$

Convergenta locală a metodei Newton

Teorema (rata de convergenta locală a metodei Newton):

- fie $f \in C^2$ și x^* un minim local ce satisfacă $\nabla f(x^*) = 0$ și $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$
- fie o constantă $m > 0$ astfel încât: $\nabla^2 f(x^*) \succeq mI_n$
- presupunem că $\nabla^2 f(x)$ este Lipschitz cu constantă $M > 0$, i.e.

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq M\|x - y\| \quad \forall x, y \in \text{dom}f$$

- presupunem că punctul initial x_0 este suficient de aproape de x^* , i.e. $\|x_0 - x^*\| \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{m}{M}$

Atunci iteratia Newton $x_{k+1} = x_k - (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$ converge la x^* cu rata patratica, i.e.

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{3M}{2m} \|x_k - x^*\|^2 \quad \forall k \geq 0$$

Prima demonstratie data de Kantorovich in 1948!

Convergenta locală a Metodei Newton

Demonstratie: x^* este un minim local $\rightarrow \nabla f(x^*) = 0$.

Din teorema lui Taylor în forma integrală avem:

$$\nabla f(x_k) = \nabla f(x^*) + \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) (x_k - x^*) d\tau.$$

Se obține:

$$\begin{aligned} x_{k+1} - x^* &= x_k - x^* - (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k) \\ &= (\nabla^2 f(x_k))^{-1} [\nabla^2 f(x_k)(x_k - x^*) - \nabla f(x_k) + \nabla f(x^*)] \\ &= (\nabla^2 f(x_k))^{-1} [\nabla^2 f(x_k)(x_k - x^*) - \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) (x_k - x^*) d\tau] \\ &= (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \int_0^1 [\nabla^2 f(x_k)(x_k - x^*) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) (x_k - x^*)] d\tau \\ &= (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \int_0^1 [\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*))] (x_k - x^*) d\tau. \end{aligned}$$

Convergenta locală a Metodei Newton

Deoarece $\|\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^*)\| \leq M\|x_k - x^*\|$, avem:

$$-M\|x_k - x^*\|I_n \preceq \nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^*) \preceq M\|x_k - x^*\|I_n.$$

Mai mult, vom avea:

$$\nabla^2 f(x_k) \succeq \nabla^2 f(x^*) - M\|x_k - x^*\|I_n \succeq mI_n - M\|x_k - x^*\|I_n \succ 0,$$

sub ipoteza ca $\|x_k - x^*\| \leq \frac{2}{3} \frac{m}{M}$, de unde rezulta:

$$0 \prec (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \preceq \frac{1}{m - M\|x_k - x^*\|} I_n.$$

Concluzionam urmatoarele:

$$\begin{aligned}\|x_{k+1} - x^*\| &= \|(\nabla^2 f(x_k))^{-1}\| \cdot \left\| \int_0^1 \nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + \tau(x_k - x^*)) d\tau \right\| \cdot \\ &\leq \frac{1}{m - M\|x_k - x^*\|} \int_0^1 M(1 - \tau)\|x_k - x^*\| d\tau \|x_k - x^*\| \\ &\leq \frac{1}{m - M\|x_k - x^*\|} \int_0^1 M(1 - \tau) d\tau \|x_k - x^*\|^2\end{aligned}$$

Convergenta locala a Metodei Newton

Prin inductie se arata usor ca daca $\|x_0 - x^*\| \leq 2m/3M$, atunci $\|x_k - x^*\| \leq 2m/3M$ pentru orice $k \geq 0$.

Observam ca $\frac{1}{m-M\|x_k-x^*\|} \frac{M}{2} \leq \frac{3M}{2m} < \infty$ si deci obtinem

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \frac{3M}{2m} \|x_k - x^*\|^2.$$

Observatii: Consideram $f(x)$ patratica, strict convexa, i.e.

$f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + q^T x$, unde $Q \succ 0$. Din conditiile de optimalitate:

$$\nabla f(x^*) = Qx^* + q = 0 \Rightarrow x^* = -Q^{-1}q$$

Pornind dintr-un punct x_0 , si aplicand metoda Newton, rezulta:


$$x_1 = x_0 - (\nabla^2 f(x_0))^{-1} \nabla f(x^0) = x_0 - Q^{-1}(Qx_0 + q) = -Q^{-1}q = x^*,$$

deci pentru probleme patratice strict convexe metoda converge intr-un singur pas.

Dar metoda Newton necesita calculul inversei $\nabla^2 f(x)^{-1}$, **operatie costisitoare** $\mathcal{O}(n^3)$ pentru probleme de dimensiuni mari.


Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton

Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton


Exemplu metoda Newton cu pas variabil ales în trei variante,
aplicată pe $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$.




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton



Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton

Newton cu backtracking




Convergenta locală a Metodei Newton

Newton cu backtracking




Convergenta locală a Metodei Newton


Newton cu backtracking




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton



Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton


Newton cu backtracking




Convergenta locală a Metodei Newton



Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton




Convergenta locală a Metodei Newton

Newton cu pas ideal




Convergenta locală a Metodei Newton

Newton cu pas ideal




Convergenta locală a Metodei Newton

Newton cu pas ideal




Convergenta locală a Metodei Newton



Newton cu pas ideal



Convergenta locală a Metodei Newton



Convergenta locală a Metodei Newton



Convergenta globala a Metodei Newton

Daca pornim dintr-un punct x_0 ce nu se afla in vecinatatea lui x^* , metoda Newton trebuie modificata pentru a asigura convergenta:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$$

Pasul α_k se poate alege ideal (i.e. $\alpha_k = \min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha_k d_k)$) sau prin metoda backtracking

Teorema (convergenta globala a metodei Newton):

- Fie functia obiectiv $f \in \mathcal{C}^2$ marginita inferior si cu gradientul ∇f Lipschitz
- Consideram metoda Newton cu pas variabil α_k ales prin backtracking: $x_{k+1} = x_k - \alpha_k (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$
- Presupunem ca Hessiana satisface conditia $\beta_1 I_n \preceq (\nabla^2 f(x))^{-1} \preceq \beta_2 I_n$, unde $0 < \beta_1 \leq \beta_2$.

Atunci, metoda Newton produce un sir x_k cu proprietatea ca $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$.

Metoda Newton versus metoda gradient

- Metoda gradient cu pas α_k se obtine prin aproximarea Taylor, unde insa $\nabla^2 f(x_k)$ este inlocuita cu $\frac{1}{\alpha_k} I_n$:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$$

$$= \arg \min_y f(x_k) + \nabla f(x_k)^T (y - x_k) + \frac{1}{2\alpha_k} (y - x_k)^T I_n (y - x_k)$$

\implies complexitate pe iteratie $\mathcal{O}(n)$ plus costul evaluarii $\nabla f(x)$!

- Metoda Newton cu pas α_k se obtine prin aproximarea Taylor de ordin II:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k)$$

$$= \arg \min_y f(x_k) + \nabla f(x_k)^T (y - x_k) + \frac{1}{2\alpha_k} (y - x_k)^T \nabla^2 f(x_k) (y - x_k)$$

\implies complexitate pe iteratie $\mathcal{O}(n^3)$ plus costul evaluarii $\nabla f(x)$ si $\nabla^2 f(x)$!

Metoda Newton versus metoda gradient

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \quad (= 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2)$$

```
function [] = gradient-Newton-ideal(x0,eps)
obj = @(x)10x1^6 + 30x2^6 + x1^2 + 50x2^2;
gradient = @(x)[60x1^5 + 2x1 ; 180x2^5 + 100x2];
hessiana = @(x)[300x1^4 + 2 0; 0 900x2^4 + 100];
%% Metoda Gradient cu pas ideal
x = x0;
trajectoryg = [x0];
while (norm(gradient(x)) > eps)
    grad = gradient(x);
    objα = @(α) obj(x - α grad);
    α* = fminbnd(objα, 0, 1);

    x = x - α* gradient(x);
    trajectoryg = [trajectoryg x];
end
```

Metoda Newton versus metoda gradient


```
%% Metoda Newton cu pas ideal
x=x0;
trajectoryn = [x0];
while (norm(gradient(x)) > eps)
    grad = gradient(x);
    hess = hessian(x);
    d-newton = inv(hess)* grad;
    objα = @(α) obj(x - α *d-newton);
    α* = fminbnd(objα, 0, 1);
    x = x - α* d-newton;
    trajectoryn = [ trajectoryn x];
end
```

Metoda Newton versus metoda gradient

```
x = -0.2 : 0.1 : 0.2;
y = -0.2 : 0.1 : 0.2;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = 10*X.^6 + 30*Y.^6 + X.^2 + 50*Y.^2;
figure
plot(trajg(1,:),trajg(2,:),'r+-','LineWidth',3);
hold on
plot(trajn(1,:),trajn(2,:),'k*--','LineWidth',3);
legend('Gradient Method','Newton Method');
hold on
contour(X,Y,Z,'ShowText','on','LineWidth',2);
end
```


Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient

Comparatie intre metoda Newton si metoda gradient, ambele cu pas ideal, pentru $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 10x_1^6 + 30x_2^6 + x_1^2 + 50x_2^2$




Metoda Newton versus metoda gradient




Metoda Newton versus metoda gradient

Newton cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal




Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal



Metoda Newton versus metoda gradient



Metoda Newton versus metoda gradient

Gradient cu pas ideal

