

UTS TRU

Muhammad Ya'mal Amilun (10222070)

$$ds^2 = -f(r)c^2 dt^2 + g(r)dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

Tinjaulah sebuah ruang waktu lengkung yang memiliki metrik seperti persamaan di atas dengan koordinat bola (ct, r, θ, ϕ) .

A. Hitunglah semua symbol Christoffel untuk metrik di atas.

❖ Penurunan Levi-Civita Connection Coefficient

Christoffel simbol sering juga disebut sebagai *connection coefficient* pada suatu covariant derivative (atau yang biasanya disebut sebagai connection). Apabila suatu connection memenuhi properti *torsion free* dan *metric compatibility*, maka disebut dengan levi-civita connection. Kedua properti tersebut menyebabkan simbol christoffel memiliki persamaan seperti yang akan diturunkan di bawah.

$$Torsion Free \rightarrow \nabla_{\vec{e}_i} \vec{e}_j = \nabla_{\vec{e}_j} \vec{e}_i \rightarrow \Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$$

$$Metric Compatibility \rightarrow \nabla_{\vec{w}} (\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\nabla_{\vec{w}} \vec{u}) \cdot \vec{v} + (\nabla_{\vec{w}} \vec{v}) \cdot \vec{u} \rightarrow \partial_k g_{ij} = \Gamma_{ki}^l g_{lj} + \Gamma_{kj}^l g_{li}$$

Dari kedua properti di atas, didapatkanlah Levi – Civita Connection Coefficient

$$\Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{cd} (\partial_a g_{bd} + \partial_b g_{ad} - \partial_d g_{ab})$$

❖ Menentukan komponen-komponen simbol Christoffel

Dari persamaan di atas, untuk menentukan semua simbol Christoffelnya dibutuhkan *metric* g^{ij} dan turunan *metric* g_{ij} terhadap semua sumbu koordinatnya (ct, r, θ, ϕ) . Metric g_{ij} merupakan hasil dari dot product setiap basisnya $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$. Dari persamaan di atas $ds^2 = -f(r)c^2 dt^2 + g(r)dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$, kita dapat mengetahui bahwa semua basisnya saling orthogonal dengan metric $g_{00} = -f(r), g_{11} = g(r), g_{22} = r^2, g_{33} = \sin^2 \theta$. Selanjutnya, metric g^{ij} didapatkan dengan menginverskan metric g_{ij} sehingga memenuhi $g^{ij} g_{jk} = \delta_k^i$.

$$g_{ij} = \begin{vmatrix} -f(r) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g(r) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin^2 \theta \end{vmatrix}$$

$$g^{ij} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{f(r)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{g(r)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sin^2 \theta} \end{vmatrix}$$

Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel berisikan semua penurunan metric g_{ij} terhadap semua basis koordinatnya $(ct, r, \theta, \phi) = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ [Notasi Einstein].

	$-f(r)$	$g(r)$	r^2	$\sin^2 \theta$
∂_{ct}	0	0	0	0
∂_r	$-\frac{\partial f(r)}{\partial r}$	$-\frac{\partial g(r)}{\partial r}$	$2r$	0
∂_θ	0	0	0	0
∂_ϕ	0	0	0	$2 \sin \theta \cos \theta$

❖ Perhitungan Simbol Christoffel (Levi-Civita Connection)

$$\text{Levi - Civita Connection Coefficient} \rightarrow \Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{cd} (\partial_a g_{bd} + \partial_b g_{ad} - \partial_d g_{ab})$$

Perhatikan nilai g^{cd} akan bernilai 0 apabila $c \neq d$, sehingga c harus sama dengan d agar $\Gamma_{ab}^c \neq 0$.
Perhatikan juga nilai g_{ab} akan bernilai 0 apabila $a \neq b$, sehingga $\Gamma_{ab}^c \neq 0$ hanya jika $a = b$ atau (a or $b = d = c$).

❖ Untuk Γ_{ab}^0

$$\Gamma_{00}^0 = \Gamma_{11}^0 = \Gamma_{22}^0 = \Gamma_{33}^0 = 0$$

$$\Gamma_{01}^0 = \Gamma_{10}^0 = -\frac{1}{2f} \frac{\partial(-f)}{\partial r} = \frac{f'}{2f}$$

$$\Gamma_{02}^0 = \Gamma_{20}^0 = 0$$

$$\Gamma_{03}^0 = \Gamma_{30}^0 = 0$$

❖ Untuk Γ_{ab}^1

$$\Gamma_{00}^1 = -\frac{1}{2g} \frac{\partial(-f)}{\partial r} = \frac{f'}{2g}$$

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial r} = \frac{g'}{2g}$$

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2g} \frac{\partial r^2}{\partial r} = -\frac{r}{g}$$

$$\Gamma_{33}^1 = -\frac{1}{2g} \frac{\partial r^2 \sin^2 \theta}{\partial r} = -\frac{r \sin^2 \theta}{g}$$

$$\Gamma_{10}^1 = \Gamma_{01}^1 = 0$$

$$\Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = 0$$

$$\Gamma_{13}^1 = \Gamma_{31}^1 = 0$$

❖ Untuk Γ_{ab}^2

$$\Gamma_{00}^2 = \Gamma_{11}^2 = \Gamma_{22}^2 = 0$$

$$\Gamma_{33}^2 = -\frac{1}{2r^2} \frac{\partial r^2 \sin^2 \theta}{\partial \theta} = -\sin \theta \cos \theta$$

$$\Gamma_{20}^2 = \Gamma_{02}^2 = 0$$

$$\Gamma_{21}^2 = \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2r^2} \frac{\partial r^2}{\partial r} = \frac{1}{r}$$

$$\Gamma_{23}^2 = \Gamma_{32}^2 = 0$$

❖ Untuk Γ_{ab}^3

$$\Gamma_{00}^3 = \Gamma_{11}^3 = \Gamma_{22}^3 = \Gamma_{33}^3 = 0$$

$$\Gamma_{30}^3 = \Gamma_{03}^3 = 0$$

$$\Gamma_{31}^3 = \Gamma_{13}^3 = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial r^2 \sin^2 \theta}{\partial r} = \frac{1}{r}$$

$$\Gamma_{32}^3 = \Gamma_{23}^3 = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial r^2 \sin^2 \theta}{\partial \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Sehingga, semua simbol Christoffel tersebut dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\frac{d}{dr} f(r)}{2f(r)} & 0 & 0 \\ \frac{\frac{d}{dr} f(r)}{2f(r)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\frac{d}{dr} f(r)}{2g(r)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\frac{d}{dr} g(r)}{2g(r)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{r}{g(r)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{r \sin^2(\theta)}{g(r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin(\theta) \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{r} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \\ 0 & \frac{1}{r} & \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} & 0 \end{bmatrix}$$

B. Tensor Ricci

Tensor Ricci diturunkan dari Tensor Riemann, Tensor Riemann sendiri adalah tensor yang dapat menentukan apakah suatu ruang waktu *flat* atau *curve*.

$$R(\vec{e}_a, \vec{e}_b)\vec{e}_c = \nabla_{\vec{e}_a} \nabla_{\vec{e}_b} \vec{e}_c - \nabla_{\vec{e}_b} \nabla_{\vec{e}_a} \vec{e}_c - \nabla_{[\vec{e}_a, \vec{e}_b]} \vec{e}_c$$

Pada ruang waktu koordinat bola *lie bracket* dari basis-basisnya selalu nol $[\vec{e}_a, \vec{e}_b] = 0$

$$R(\vec{e}_a, \vec{e}_b)\vec{e}_c = \nabla_{\vec{e}_a}(\Gamma_{bc}^i \vec{e}_i) - \nabla_{\vec{e}_b}(\Gamma_{ac}^j \vec{e}_j)$$

$$R(\vec{e}_a, \vec{e}_b)\vec{e}_c = \partial_a \Gamma_{bc}^i \vec{e}_i + \Gamma_{bc}^i \nabla_{\vec{e}_a} \vec{e}_i - \partial_b \Gamma_{ac}^j \vec{e}_j - \Gamma_{ac}^j \nabla_{\vec{e}_b} \vec{e}_j$$

$$R(\vec{e}_a, \vec{e}_b)\vec{e}_c = \partial_a \Gamma_{bc}^i \vec{e}_i - \partial_b \Gamma_{ac}^j \vec{e}_j + \Gamma_{bc}^i \Gamma_{ai}^d \vec{e}_d - \Gamma_{ac}^j \Gamma_{bj}^f \vec{e}_f$$

$$\text{Ubah basisnya jadi } d \rightarrow R(\vec{e}_a, \vec{e}_b)\vec{e}_c = [R_{cab}^d] \vec{e}_d = [\partial_a \Gamma_{bc}^d - \partial_b \Gamma_{ac}^d + \Gamma_{bc}^i \Gamma_{ai}^d - \Gamma_{ac}^j \Gamma_{bj}^d] \vec{e}_d$$

$$[R_{cab}^d] \text{ disebut sebagai komponen Riemann tensor}$$

Ricci Tensor sendiri memiliki fungsi untuk *track* volume sepanjang geodesic, dengan rumus:

$$R_{cb} = R_{ckb}^k = g^{ka} (g_{kd} R_{cab}^d) = R_{bc}$$

$$R_{cb} = \partial_k \Gamma_{bc}^k - \partial_b \Gamma_{kc}^k + \Gamma_{bc}^i \Gamma_{ki}^k - \Gamma_{kc}^j \Gamma_{bj}^k$$

$$R_{00} = \partial_k \Gamma_{00}^k - \partial_0 \Gamma_{k0}^k + \Gamma_{00}^i \Gamma_{ki}^k - \Gamma_{k0}^j \Gamma_{0j}^k = \frac{f''}{2g} - \frac{f'g'}{4g^2} - \frac{f'^2}{4fg} + \frac{f'}{rg}$$

$$R_{01} = R_{10} = R_{02} = R_{20} = R_{03} = R_{30} = 0$$

$$R_{11} = \partial_k \Gamma_{11}^k - \partial_1 \Gamma_{k1}^k + \Gamma_{11}^i \Gamma_{ki}^k - \Gamma_{k1}^j \Gamma_{1j}^k = \frac{f'^2}{4f^2} - \frac{f''}{2f} + \frac{f'g'}{4fg} + \frac{g'}{rg}$$

$$R_{12} = R_{21} = R_{13} = R_{31} = 0$$

$$R_{22} = \partial_k \Gamma_{22}^k - \partial_2 \Gamma_{k2}^k + \Gamma_{22}^i \Gamma_{ki}^k - \Gamma_{k2}^j \Gamma_{2j}^k = \frac{rg'}{2g^2} - \frac{rf'}{2fg} - \frac{1}{g} + 1$$

$$R_{23} = R_{32} = 0$$

$$R_{33} = \partial_k \Gamma_{33}^k - \partial_3 \Gamma_{k3}^k + \Gamma_{33}^i \Gamma_{ki}^k - \Gamma_{k3}^j \Gamma_{3j}^k = \frac{[rf g' - rg f' + 2(g-1)fg] \sin^2 \theta}{2fg^2}$$

Sehingga, diperoleh tensor Ricci dengan $R_{ab} \neq 0$ secara diagonal $R_{00}, R_{11}, R_{22}, R_{33}$.

Kita ketahui bahwa fungsi f dan g sedemikian sehingga tensor Riccinya sama dengan nol

$$R_{ab} = R_{00} + R_{11} + R_{22} + R_{33} = 0$$

$$R_{ab} = \left(\frac{f''}{2g} - \frac{f'g'}{4g^2} - \frac{f'^2}{4fg} + \frac{f'}{rg} \right) + \left(\frac{f'^2}{4f^2} - \frac{f''}{2f} + \frac{f'g'}{4fg} + \frac{g'}{rg} \right) + \left(\frac{rg'}{2g^2} - \frac{rf'}{2fg} - \frac{1}{g} + 1 \right) + \left(\frac{[rf g' - rg f' + 2(g-1)fg] \sin^2 \theta}{2fg^2} \right) = 0$$

Apabila kita perhatikan terdapat hubungan antara R_{22} dengan $R_{33} \rightarrow R_{33} = \sin^2 \theta R_{22}$

$$R_{ab} = \left(\frac{f''}{2g} - \frac{f'g'}{4g^2} - \frac{f'^2}{4fg} + \frac{f'}{rg} \right) + \left(\frac{f'^2}{4f^2} - \frac{f''}{2f} + \frac{f'g'}{4fg} + \frac{g'}{rg} \right) + R_{22}(1 + \sin^2 \theta) = 0$$

$$R_{ab} = R_{00} + R_{11} + R_{22}(1 + \sin^2 \theta) = 0$$

Salah satu cara untuk menyelesaikannya dapat dengan menggunakan properti *Contracted Bianchi Identity* atau sering juga disebut *Einstein Equation*.

$$R_{mn;n} - \frac{1}{2} g_{mn} R_{;n} = 0$$

Untuk menggunakan persamaan tersebut (Einstein Equation) dibutuhkan Skalar Ricci yang hasilnya ada pada bagian **C. Skalar Ricci**. Apabila kita substitusi semua semua tensor Riccinya maka didapatkan sebagai berikut.

$$R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R = R_{00} + \frac{f}{2} R = -\frac{1}{r} \frac{g'}{g^2} - \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{1}{g} \right) = 0$$

$$R_{11} - \frac{1}{2} g_{11} R = R_{11} - \frac{g}{2} R = \frac{f'}{rf g} - \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{1}{g} \right) = 0$$

$$R_{22} - \frac{1}{2} g_{22} R = R_{22} - \frac{r^2}{2} R = \frac{f}{f'} - \frac{g'}{g} + \frac{rf''}{f} - \frac{rf'g'}{2fg} - \frac{rf'^2}{2f^2} = 0$$

$$R_{33} - \frac{1}{2} g_{33} R = -\sin^2 \theta R_{22} - \frac{r^2 \sin^2 \theta}{2} R = -R_{22} - \frac{r^2}{2} R = 0$$

Perhatikan, bahwa R_{00} merupakan fungsi dari g saja sehingga dapat kita selesaikan sebagai berikut

$$R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R = 0$$

$$-\frac{g'}{g} - \frac{1}{r} (g-1) = 0$$

$$\frac{dg}{g(g-1)} = -\frac{dr}{r}$$

Integralkan kedua sisi dengan aturan integral $\int \frac{dx}{ax+bx^2} = -\frac{1}{a} \ln \left(\frac{a+bx}{x} \right)$

$$\ln \left(\frac{g-1}{g} \right) = \ln r + C$$

$$\frac{C}{r} = \frac{g-1}{g}$$

$$g = \frac{1}{1 - \frac{C}{r}}$$

Selanjutnya, masukan solusi tersebut pada $R_{11} - \frac{1}{2}g_{11}R = 0$, sehingga didapatkan

$$\frac{f'}{f} \left(\frac{(r-c)}{r} \right) - \frac{1}{r} \left(1 - \left(1 - \frac{c}{r} \right) \right) = 0$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{c}{r^2 - cr}$$

$$\frac{df}{f} = \frac{c dr}{r^2 - cr}$$

$$\ln(f) = \frac{C}{C} \ln \left(\frac{r-c}{r} \right)$$

$$f = 1 - \frac{C}{r}$$

Apabila kita perhatikan, fungsi ini (f, g) sangat mirip dengan metric pada ruang waktu Schwarzschild. Sehingga dapat kita simpulkan fungsi f dan g sebagai berikut:

$$f = 1 - \frac{C}{r} \quad \text{dan} \quad g = \frac{1}{f} = \frac{1}{1 - \frac{C}{r}} \quad \text{dengan} \quad C = \frac{2GM}{c^2}$$

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)c^2 dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

C. Skalar Ricci

Ricci skalar memiliki makna fisis untuk men-track bagaimana ukuran suatu objek berubah dari ukuran standardnya pada ruangwaktu flat. Ricci skalar merupakan tensor ricci dengan menaikan salah satu indeksnya seperti berikut:

$$R = R_a^a = g^{ab}R_{ab}$$

Dalam bagian sebelumnya, kita hanya memiliki Ricci tensor pada bagian diagonalnya sehingga pada kasus ini Ricci skalarnya bernilai $R = g^{00}R_{00} + g^{11}R_{11} + g^{22}R_{22} + g^{33}R_{33}$

$$g^{00}R_{00} = -\frac{1}{f} \left(\frac{f''}{2g} - \frac{f'g'}{4g^2} - \frac{f'^2}{4fg} + \frac{f'}{rg} \right)$$

$$g^{11}R_{11} = \frac{1}{g} \left(\frac{f'^2}{4f^2} - \frac{f''}{2f} + \frac{f'g'}{4fg} + \frac{g'}{rg} \right)$$

$$g^{22}R_{22} = \frac{1}{r^2} \left(\frac{rg'}{2g^2} - \frac{rf'}{2fg} - \frac{1}{g} + 1 \right)$$

$$g^{33}R_{33} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{[rfg' - rgf' + 2(g-1)fg] \sin^2 \theta}{2fg^2} \right)$$

$$R = -\frac{f''}{fg} + \frac{f'}{2} \frac{g'}{fg^2} + \frac{f'^2}{2f^2g} - \frac{2f'}{rfg} + \frac{2g'}{rg^2} + \frac{2}{r^2} \left(1 - \frac{1}{g} \right)$$

[R dibutuhkan pada bagian b untuk menyelesaikan Einstein Equations]

Pada persamaan *Einstein Equation* atau *Contracted Bianchi Identity*, apabila kita mengatur agar skalar Riccinya sama dengan nol maka:

$$R_{mn;n} - \frac{1}{2} g_{mn} R_{,n} = 0$$

$$R_{mn;n} = R_{00} = R_{11} = R_{22} = R_{33} = 0$$

Apabila kita asumsikan $f = \frac{1}{g}$ dan $f' = \frac{g'}{g^2}$, kemudian kita substitusikan pada persamaan $R_{22} = 0$, maka akan didapatkan fungsi f dan g sebagai berikut:

$$R_{22} = \frac{rg'}{2g^2} - \frac{rf'}{2fg} - \frac{1}{g} + 1 = 0$$

$$R_{22} = \frac{rg'}{2g^2} - \frac{rg'}{2g^2} - \frac{1}{g} + 1 = 0$$

$$\frac{1}{g} = 1 \rightarrow g = 1 \text{ dan } f = 1$$