Soluções do livro "Curso de Análise" vol. $1\,$

Ronald A. Kaiser

11 de Janeiro de 2016

Notas As soluções aqui apresentadas não contém seus respectivos enunciados. Algumas hipóteses fornecidas nos enunciados não são reproduzidas aqui, mas são utilizadas em algumas demonstrações. O leitor atento não deve ter dificuldades para acompanhar as soluções. Caso tenha alguma dúvida, recorra à obra original "Curso de análise" (vol. 1) de Elon Lages Lima.

1 Capítulo 1

1.1 Questão 1

Demonstração. Para demonstrarmos que $X = A \cup B$, provaremos que **1.** $X \subset (A \cup B)$ e **2.** $(A \cup B) \subset X$.

- **1.** Sabemos que $\forall A$ e $\forall B$, $A \subset (A \cup B)$ e $B \subset (A \cup B)$. Da 2^a hipótese, $A \subset (A \cup B)$ e $B \subset (A \cup B) \Rightarrow X \subset (A \cup B)$.
- **2.** A partir da 1^a hipótese e da definição de inclusão, $x \in A \Rightarrow x \in X$ e $y \in B \Rightarrow y \in X$. Assim, todo elemento de A ou de B também pertence a X. Mais formalmente: $z \in A$ ou $z \in B \Rightarrow z \in X$, e pela definição de união, $z \in (A \cup B) \Rightarrow z \in X$. Portanto, $(A \cup B) \subset X$.

De **1.** e **2.**,
$$X = (A \cup B)$$
.

1.2 Questão 2

Enunciado Dados os conjuntos A e B, seja X um conjunto com as seguintes propriedades:

$$1^{a} X \subset A \in X \subset B$$
$$2^{a} Y \subset A \in Y \subset B \Rightarrow Y \subset X$$
Prove que $X = A \cap B$.

Demonstração. Para demonstrarmos que $X = A \cap B$, provaremos que 1. $X \subset (A \cap B)$ e 2. $(A \cap B) \subset X$.

- 1. A partir da 1^a hipótese e da definição de inclusão, segue que: $x \in X \Rightarrow x \in A$ e $x \in X \Rightarrow x \in B$. Assim, todo elemento de X pertence também aos conjuntos A e B. Portanto, $x \in X \Rightarrow x \in A$ e $x \in B$. Logo, pela definição de interseção, $x \in X \Rightarrow x \in (A \cap B)$. Donde concluímos que $X \subset (A \cap B)$.
- **2.** Sabemos que $\forall A \in \forall B, (A \cap B) \subset A \in (A \cap B) \subset B$. Da 2^a hipótese, temos que $(A \cap B) \subset A \in (A \cap B) \subset B \Rightarrow (A \cap B) \subset X$. Portanto, $(A \cap B) \subset X$.

De **1.** e **2.**,
$$X = (A \cap B)$$
.

1.3 Questão 3

Provaremos inicialmente que $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B^c$.

Demonstração. Divideremos a prova em duas partes: **1.** $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset B^c$ e **2.** $A \subset B^c \Rightarrow A \cap B = \emptyset$.

- 1. \Rightarrow) Suponhamos, por absurdo, que $A \not\subset B^c$. Neste caso, $\exists x | x \in A$ e $x \not\in B^c$. Mas, pela definição de complementar, $x \not\in B^c \Leftrightarrow x \in B$. Assim, $\exists x | x \in A$ e $x \in B \Leftrightarrow \exists x | x \in (A \cap B)$. Mas, por hipótese, $A \cap B = \emptyset$. Não pode existir tal x. Um absurdo gerado pela nossa suposição inicial. Portanto, $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset B^c$.
- **2.** \Leftarrow) Suponhamos, por absurdo, que $A \cap B \neq \emptyset$. Neste caso, $\exists x | x \in (A \cap B)$, e pela definição de interseção, $\exists x | x \in A \text{ e } x \in B$. Mas, $x \in B \Leftrightarrow x \notin B^c$. Portanto, $\exists x | x \in A \text{ e } x \notin B^c$. Logo, $A \not\subset B^c$. Uma contradição, pois temos como hipótese $A \subset B^c$. Deste modo, $A \subset B^c \Rightarrow A \cap B = \emptyset$.

De 1. e 2.,
$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B^c$$
.

Agora, vamos demonstrar que $A \cup B = E \Leftrightarrow A^c \subset B$.

Demonstração. Dividiremos a demonstração em duas partes: 1. $A \cup B = E \Rightarrow A^c \subset B \in \mathbf{2}$. $A^c \subset B \Rightarrow A \cup B = E$.

- **1.** ⇒) Suponhamos, por absurdo, que $A^c \not\subset B$. Neste caso, $\exists x | x \in A^c$ e $x \not\in B$. Como $x \not\in B \Leftrightarrow x \in B^c$, $\exists x | x \in A^c$ e $x \in B^c$. Assim, pela definição de interseção, $\exists x | x \in (A^c \cap B^c)$. Pela Lei de *de Morgan*, $\exists x | x \in (A \cup B)^c$ e portanto, $\exists x | x \not\in (A \cup B)$. Uma contradição, pois $A \cup B = E$. Não pode existir um elemento que não esteja em E. Sendo assim, $A \cup B = E \Rightarrow A^c \subset B$.
- **2.** \Leftarrow) Suponhamos, por absurdo, que $A \cup B \neq E$. Neste caso, $\exists x | x \notin (A \cup B)$. Assim, $\exists x | x \in (A \cup B)^c$. Por de Morgan, $\exists x | x \in (A^c \cap B^c)$. Pela definição de interseção, $\exists x | x \in A^c$ e $x \in B^c$. Como $x \in B^c \Leftrightarrow x \notin B$, $\exists x | x \in A^c$ e $x \notin B$. Logo, $A^c \not\subset B$. Uma contradição, pois $A^c \subset B$. Portanto, $A^c \subset B \Rightarrow A \cup B = E$.

De 1. e 2.,
$$A \cup B = E \Leftrightarrow A^c \subset B$$
.

1.4 Questão 4

Demonstração. Dividiremos a demonstração em duas partes: **1.** $A \subset B \Rightarrow A \cap B^c = \emptyset$ e **2.** $A \cap B^c = \emptyset \Rightarrow A \subset B$.

- **1.** \Rightarrow) Suponhamos, por absurdo, que $A \cap B^c \neq \emptyset$. Neste caso, $\exists x | x \in (A \cap B^c)$. Pela definição de interseção, $\exists x | x \in A$ e $x \in B^c$. Como $x \in B^c \Leftrightarrow x \notin B$, então $\exists x | x \in A$ e $x \notin B$. Portanto, $A \not\subset B$. Mas $A \not\subset B$ e $A \subset B$ (hipótese) não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Um absurdo gerado pela nossa suposição inicial. Logo, $A \subset B \Rightarrow A \cap B^c = \emptyset$.
- **2.** \Leftarrow) Suponhamos, por absurdo, que $A \not\subset B$. Neste caso, $\exists x | x \in A$ e $x \notin B$. Assim, $\exists x | x \in A$ e $x \in B^c$. Pela definição de interseção, $\exists x | x \in (A \cap B^c)$. Mas não pode existir tal x, pois por hipótese, $A \cap B^c = \emptyset$. Portanto, $A \cap B^c = \emptyset \Rightarrow A \subset B$.

De 1. e 2.,
$$A \subset B \Leftrightarrow A \cap B^c = \emptyset$$
.

1.5 Questão 5

Seja $A = \{1\}, B = \{2\} \in C = \{3\}.$ Assim, $(A \cup B) \cap C = \emptyset \in A \cup (B \cap C) = \{1\}.$ Logo, temos $(A \cup B) \cap C \neq A \cup (B \cap C).$

1.6 Questão 6

Demonstração. Dividiremos a demonstração de $X=A^c$ em duas etapas: 1. $X\subset A^c$ e 2. $A^c\subset X$.

- 1. \Rightarrow) Suponhamos, por absurdo, que $X \not\subset A^c$. Neste caso, $\exists x | x \in X$ e $x \not\in A^c$. Sendo assim, por definição de complementar, $\exists x | x \in X$ e $x \in A$. Por definição de interseção, $\exists x | x \in (X \cap A)$. Mas, por hipótese, $A \cap X = \emptyset$, não pode existir tal x. Da contradição segue que, de fato, $X \subset A^c$.
- **2.** \Leftarrow) Suponhamos, por absurdo, que $A^c \not\subset X$. Neste caso, $\exists x | x \in A^c$ e $x \not\in X$. Por definição de complementar, $\exists x | x \in A^c$ e $x \in X^c$. Por definição de interseção, $\exists x | x \in (A^c \cap X^c)$. Por de Morgan, $\exists x | x \in (A \cup B)^c$. E, novamente, pela definição de complementar, $\exists x | x \not\in (A \cup B)$. Uma contradição, pois parte da hipótese garante que $A \cup B = E$. Não pode existir tal x que não esteja em E. Assim, como o absurdo provém da nossa suposição inicial, concluímos que $A^c \subset X$.

De 1. e 2.,
$$X = A^c$$
.

1.7 Questão 7

Vamos provar inicialmente que $A \subset B \Rightarrow B \cap (A \cup C) = (B \cap C) \cup A, \forall C$.

Demonstração. Por distributividade, $B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C)$. Como, por hipótese, $A \subset B$, então $B \cap A = A$. Assim, $(B \cap A) \cup (B \cap C) = A \cup (B \cap C)$.

Por comutatividade, $A \cup (B \cap C) = (B \cap C) \cup A$. Como C não possui nada em particular, temos que, $B \cap (A \cup C) = (B \cap C) \cup A$, $\forall C$.

Agora, vamos provar que $\exists C | B \cap (A \cup C) = (B \cap C) \cup A \Rightarrow A \subset B$.

Demonstração. Se $B \cap (A \cup C) = (B \cap C) \cup A$, então $(B \cap C) \cup A \subset B \cap (A \cup C)$. Agora, consideremos um $x \in A$. Se $x \in A$, então $x \in (B \cap C) \cup A$. Mas, $(B \cap C) \cup A \subset B \cap (A \cup C)$, então, $x \in B \cap (A \cup C)$. Portanto, $x \in B$. Como todo x em A também está em B, $A \subset B$.

1.8 Questão 8

Demonstração. Dividiremos a demonstração em duas partes: **1.** $A = B \Rightarrow (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = \emptyset$ e **2.** $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = \emptyset \Rightarrow A = B$.

- **1.** \Rightarrow) Como A = B, então $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = (A \cap A^c) \cup (A^c \cap A)$. Mas, por comutatividade, $A \cap A^c = A^c \cap A$. Assim, $(A \cap A^c) \cup (A^c \cap A) = A \cap A^c$. Mas, nenhum elemento pode estar em um conjunto e em seu complementar ao mesmo tempo, portanto, $A \cap A^c = \emptyset$. Logo, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = \emptyset$, quando A = B.
- **2.** \Leftarrow) Suponhamos, por absurdo, que $A \neq B$. Assim, $A \not\subset B$ ou $B \not\subset A$.

No primeiro caso, $A \not\subset B \Rightarrow \exists x | x \in A \text{ e } x \not\in B$. Pela definição de complementar, $\exists x | x \in A \text{ e } x \in B^c$, e pela definição de interseção, $\exists x | x \in (A \cap B^c)$. Assim, $A \cap B^c \supset \{x\}$ e, por conseguinte, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \supset \{x\}$. Logo, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \neq \emptyset$. Uma contradição, pois, por hipótese, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = \emptyset$. Portanto, $A \subset B$.

De modo análogo, no segundo caso, $B \not\subset A \Rightarrow \exists x | x \in B \text{ e } x \not\in A$. Pela definição de complementar, $\exists x | x \in B \text{ e } x \in A^c$, e pela definição de interseção, $\exists x | x \in (B \cap A^c)$. Assim, $B \cap A^c = A^c \cap B \supset \{x\}$ e, por conseguinte, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \supset \{x\}$. Logo, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \neq \emptyset$. Uma contradição, pois, por hipótese, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = \emptyset$. Portanto, $B \subset A$.

Em ambos os casos, nossa suposição gerou absurdos. Logo, $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = \emptyset \Rightarrow A = B$.