

第十讲

袁晨圃

1 Ramsey Theory

证明 $R(3, 4) \leq 10$:

考虑 v_1 连出的 9 条边, 要么红边数量 ≥ 4 要么蓝边数量 ≥ 6

1) 红边 ≥ 4 :

考虑连到的 4 个点之间的边

如果有红边, 则形成红色 K_3 , 反之这四个点形成蓝色 K_4

2) 蓝边 ≥ 6 :

考虑连到的 6 个点形成的子图

由于 $R(3, 3) = 6$

若是红色 K_3 , 则已满足条件

若是蓝色 K_3 , 则加入 v_1 点, 得到蓝色 K_4 , 满足条件

证明 $R(3, 4) \leq 9$:

hint: 只多了一个 3 红 5 蓝的 case, 而且对于所有点, 都引出 3 红 5 蓝, 这合法吗?

定理 1.1:

$$R(n, m) \leq R(n-1, m) + R(n, m-1)$$

证明: 令 $t = R(n-1, m) + R(n, m-1)$

考虑 K_t 的一个节点 v_1 连出的边

要么红边 $\geq R(n-1, m)$, 要么蓝边 $\geq R(n, m-1)$ (抽屉原理)

假设引理成立, 考虑红边 $\geq R(n-1, m)$ 的情况, 子图中要么有蓝色 K_m , 要么有红色 K_{n-1} , 加入 v_1 点后变成红色 K_n

推论: $R(n, m) \leq \binom{n+m-2}{n-1}$

证明: 初值 $R(n, 2) = n$ 跟杨辉三角一样

递推关系 $R(n, m) \leq R(n-1, m) + R(n, m-1)$ 与杨辉三角一样

例: $R(3, 3) \leq \binom{4}{2} = 6$

$R(4, 4) \leq \binom{6}{3} = 20$

$R(n, n) \leq \binom{2n-2}{n-1} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{n}}$

考虑 $R(n, n)$ 的下界:

构造 $n-1$ 个红色 K_{n-1} , 不同子图之间的边都染蓝色

此时显然不存在红色 K_n

蓝色 K_n 也不存在, 因为若选出 n 个点, 必有两个点属于同一个子图 (抽屉原理), 则这两个点之间的边是红色, 所以不存在蓝色 K_n

1.1 Probabilistic Method 非构造性方法证明存在性

考虑 $R(n, n)$ 的一个非构造性下界:

$$R(n, n) \geq N = \frac{2^{\frac{n}{2}} \cdot n}{2e}$$

对每条边独立染色, $p_{\text{红}} = p_{\text{蓝}} = \frac{1}{2}$

一个图 G 是好的: $\nexists \text{ Red } K_n, \nexists \text{ Blue } K_n$

转换为证明 $\Pr(G \text{ is good}) > 0$ (因为是古典概型)

$$\Pr(G \text{ is good}) = 1 - \Pr(G \text{ is bad})$$

$$\Pr(G \text{ is bad}) = \Pr(\exists \text{ Red } K_n \cup \exists \text{ Blue } K_n) \leq \Pr(\exists \text{ Red } K_n) + \Pr(\exists \text{ Blue } K_n) = 2 \Pr(\exists \text{ Red } K_n)$$

$$\begin{aligned} \Pr(\exists \text{ Red } K_n) &= \Pr\left(\bigcup_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n < N} v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_n} \text{ is a red } K_n\right) \leq \binom{N}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \\ &\leq \left(\frac{Ne}{n}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{(n(n-1))/2} \\ &\leq \left(\frac{2^{\frac{n}{2}}}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{(n^2-n)/2} = \frac{1}{2^{n/2}} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \Pr(G \text{ is bad}) = 2 \cdot \frac{1}{2^{n/2}} < 1$$

1.2 扩展至 $R(n, m, p)$

(Red K_n) or (Blue K_n) or (Yellow K_n)

类似地

$$R(n, m, p) \leq R(n-1, m, p) + R(n, m-1, p) + R(n, m, p-1)$$