

D_N аналог леммы 3

$$f_{D_N}(x, y) = x^{N-1} + xy^2, \quad \Rightarrow \quad A_0 = \frac{\mathbb{C}[x, y]}{((N-1) \cdot x^{N-2} + y^2, 2xy)}$$

используем базис $(1, x, x^2, \dots, x^{N-2}, y)$, поэтому в нуле

$$xy = 0, \quad y^2 = -(N-1)x^{N-2}, \quad x^{N-1} = 0.$$

Пусть даны однородные координаты на $M = (s_0, s_1, \dots, s_{N-2}, \tau)$, с соответствующими векторными полями

$$\begin{aligned} e_0, e_1, \dots, e_{N-2}, h, \quad e_r = \frac{\partial}{\partial s_r}, \quad h = \frac{\partial}{\partial \tau}, \\ e_r \longleftrightarrow x^r, \quad h \longleftrightarrow y. \end{aligned}$$

В частности,

$$e_a \circ e_b = e_{a+b} \quad \text{для } a + b \leq N-2. \quad (1)$$

Пусть есть фундаментальное соотношение редукции

$$e_1^{\circ(N-1)} = \sum_{k=0}^{N-2} \alpha_k(s, \tau) e_k + \beta(s, \tau) h, \quad \text{где } \alpha_k(0) = 0, \quad \beta(0) = 0. \quad (2)$$

$\text{wt}(x) = \frac{1}{N-1}, \text{wt}(y) = \frac{N-2}{2(N-1)} \Rightarrow \text{wt}(e_r) = \frac{r}{N-1}, \text{wt}(h) = \frac{N-2}{2(N-1)}, \text{wt}(s_r) = 1 - \frac{r}{N-1}, \text{wt}(\tau) = \frac{N}{2(N-1)}$. Так как (2) имеет вес 1, получаем $\text{wt}(\alpha_k) = 1 - \frac{k}{N-1} = \text{wt}(s_k)$. Следовательно, для $r, k \in \{1, \dots, N-2\}$, верно

$$\left. \frac{\partial \alpha_k}{\partial s_r} \right|_0 = 0 \quad \text{если } k \neq r. \quad (3)$$

$$\text{Определим } B_r := \left. \frac{\partial \alpha_r}{\partial s_r} \right|_0, \quad r = 1, \dots, N-2. \quad (4)$$

Лемма 1 (D_N).

$B_r = rB_1$, для $r = 1, \dots, N-2$. Эквивалентно, $B_1 : B_2 : \dots : B_{N-2} = 1 : 2 : \dots : (N-2)$.

Доказательство. Пусть m_s тензор умножения в точке $s = (s_0, \dots, s_{N-2}, \tau)$ и

$$D_r := \left. \frac{\partial m_s}{\partial s_r} \right|_{s=0} = (\text{Lie}_{e_r}(\circ))_0.$$

D_r симметрическое билинейное отображение $D_r : T_0M \times T_0M \rightarrow T_0M$. Выберем $p, q \geq 1$ т.ч. $p + q = N-1$, из ассоциативности и (2),

$$e_p \circ e_q = e_1^{\circ(N-1)} = \sum_{k=0}^{N-2} \alpha_k(s, \tau) e_k + \beta(s, \tau) h.$$

Дифференцируя по s_r в нуле и используя (3), получаем

$$D_r(e_p, e_q) = B_r e_r + \lambda_r h, \quad \text{где } \lambda_r := \left. \frac{\partial \beta}{\partial s_r} \right|_0. \quad (5)$$

Теперь, для нечетного N , все $\lambda_r = 0$ из градуировки, для четного же N , только для одного r возможно $\lambda_r = \left. \frac{\partial \beta}{\partial s_r} \right|_0 \neq 0$

Пусть теперь $a, b \geq 1$ и $a + b \leq N - 2$. Из (1), $e_a \circ e_b = e_{a+b}$. Применим условие интегрируемости

$$\text{Lie}_{X \circ Y}(\circ) = X \circ \text{Lie}_Y(\circ) + Y \circ \text{Lie}_X(\circ)$$

с $X = e_a$ и $Y = e_b$, и ограничим в ноль. Получаем

$$\begin{aligned} D_{a+b}(U, V) &= (\text{Lie}_{e_{a+b}}(U \circ V))_0 = (e_a \circ \text{Lie}_{e_b}(U \circ V))_0 + (\text{Lie}_{e_a}(U \circ V) \circ e_b)_0 = \\ &= e_a \circ_0 D_b(U, V) + e_b \circ_0 D_a(U, V) \quad \forall U, V \in T_0 M. \end{aligned} \quad (6)$$

Возьмем $U = e_p$ и $V = e_q$. По (5), слева получаем

$$D_{a+b}(e_p, e_q) = B_{a+b}e_{a+b} + \lambda_{a+b}h.$$

Справа,

$$\begin{aligned} e_a \circ_0 D_b(e_p, e_q) &= e_a \circ_0 (B_b e_b + \lambda_b h) = B_b e_{a+b} + \lambda_b e_a \circ h, \\ e_b \circ_0 D_a(e_p, e_q) &= e_b \circ_0 (B_a e_a + \lambda_a h) = B_a e_{a+b} + \lambda_a e_b \circ h. \end{aligned}$$

Заметим, что $e_c \circ_0 h = 0$ для любого $c \geq 1$, другими словами $x^c y = 0$, что следует из $2xy = 0$. Значит, произведения, содержащие λ в (6) исчезают.

$$B_{a+b}e_{a+b} = B_b e_{a+b} + B_a e_{a+b} \quad (a, b \geq 1, a + b \leq N - 2)$$

Сравнивая коэффициенты и делая индукцию получаем

$$B_r = rB_1, \quad r = 1, \dots, N - 2.$$

□