

”,”

я

6 октября 2026 г.

Пусть нам даны весовые соотношения

$$\begin{aligned}\mathrm{wt}(\alpha_{\mu-1}) &= \frac{1}{\mu+1} \\ \mathrm{wt}(\alpha_{\mu-2}) &= \frac{2}{\mu+1} = \mathrm{wt}(s_{\mu-2}) \\ &\dots \\ \mathrm{wt}(\alpha_0) &= \frac{\mu}{\mu+1} = \mathrm{wt}(s_0)\end{aligned}$$

$$e_1^{\circ(N)} = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(s) e_k \quad \text{где} \quad \alpha_k(0) = 0. \quad (1)$$

$$\left. \frac{\partial \alpha_k}{\partial s_r} \right|_0 = 0 \quad \text{если } k \neq r. \quad (2)$$

$$e_a \circ e_b = e_{a+b} \quad \text{для } a+b \leq N-1. \quad (3)$$

Теорема 1 (Vanishing coefficients). Пусть M - неприводимое полупростое в общем многообразии с градуировкой типа A_μ , для которого выполнено

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} \pi_k s_k \cdot x^k \right), \text{ где } \pi_k \in \mathbb{C}$$

Тогда M изоморфно многообразию простой особенности A_μ .

Доказательство.

$$\text{Определим } B_r := \left. \frac{\partial \alpha_r}{\partial s_r} \right|_0, \quad r = 1, \dots, N-2. \quad (4)$$

□