$$\begin{gathered}\mathrm{wt}(x)=\frac{1}{N-1},\mathrm{wt}(y)=\frac{N-2}{2(N-1)}\\ \mathrm{wt}(e_r)=\frac{r}{N-1},\mathrm{wt}(h)=\frac{N-2}{2(N-1)}\\ \mathrm{wt}(s_r)=1-\frac{r}{N-1},\mathrm{wt}(\tau)=\frac{N}{2(N-1)}\\ \mathrm{wt}(\alpha_k)=1-\frac{k}{N-1}=\mathrm{wt}(s_k)\qquad \mathrm{wt}(\beta)=\frac{N}{2(N-1)}=\mathrm{wt}(\tau)\end{gathered}\tag{0.1}$$

Лемма 1. *Пусть дано некоторое многообразие Дубровина-Фробениуса $(M,\circ)$ размерности $\mu\geq 5$ с градуировкой D_μ. Тогда.*

1. *Существует семейство фактор алгебр, таких что*

$$T_pM\simeq B=\mathbb{C}[x,y]/\left(x^{\mu-1}-\sum_{k=0}^{\mu-2}\alpha_k(s,\tau)x^k-\beta(s,\tau)y\right)$$

2. *Для любого изоморфизма градуированных алгебр $\psi:T_0M\to B|_0$ выполнено*

$$\psi\left(\frac{\partial}{\partial s^a}\right)=c_ix^a,\psi\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)=c_\tau y\qquad c_i,c_\tau\in\mathbb{C}$$