

Évolution des paramètres biochimiques au cours du suivi des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde

D.BOUAICHI¹, N.ROUIBAH¹, B.OUAHDI¹, M.BENMAHDI¹, M. BENAKLI², N.RAAF¹

dibouaichi@hotmail.fr

1 Laboratoire de biochimie/ CPMC 2 Service hématologie /CPMC

Introduction

La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est une hémopathie maligne dont la prise en charge nécessite une surveillance biologique régulière afin de détecter précocement les perturbations métaboliques et les atteintes d'organes liées à la maladie ou à son traitement. L'évaluation de l'évolution des paramètres biochimiques au cours du suivi peut contribuer à une meilleure surveillance biologique des patients.

Notre objectif dans cette étude était d'étudier l'évolution des paramètres biochimiques au cours du suivi des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde.

Matériel et méthodes

Une étude rétrospective longitudinale a été réalisée au laboratoire de biochimie, en collaboration avec le service d'Hématologie du Centre Pierre et Marie Curie (CPMC), Alger, entre janvier 2019 et décembre 2024.





L'étude a inclus 82 patients atteints de leucémie aiguë myéloïde. Tous les résultats biochimiques disponibles, de l'initiation du traitement jusqu'au 31 décembre 2024, ont été recueillis et analysés. Dix-sept paramètres biochimiques ont été étudiés. L'évolution de ces paramètres a été analysée à l'aide d'un modèle linéaire mixte tenant compte des mesures répétées chez un même patient. Les effets fixes ont été évalués à l'aide des tests de type III.

L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel **IBM SPSS Statistics version 23**, avec un seuil de significativité fixé à $p < 0,05$.

Résultats

L'analyse a mis en évidence une évolution statistiquement significative de la phosphatase alcaline (PAL) ($p = 0,011$), du phosphore ($p < 0,001$), de la créatinine ($p = 0,023$) et du sodium ($p = 0,005$).

En revanche, aucune évolution significative n'a été observée pour les autres paramètres biochimiques étudiés ($p > 0,05$).



Discussion

La variation de la **créatinine** et du **phosphore** est particulièrement pertinente sur le plan clinique, ces paramètres peuvent être impliqués dans les complications métaboliques et rénales de la LAM, notamment dans le contexte du **syndrome de lyse tumorale**.

L'évolution significative du **sodium** peut refléter les modifications de l'équilibre hydro-électrolytique liées à l'état clinique, aux traitements ou aux complications intercurrentes. La variation de la **phosphatase alcaline** pourrait quant à elle être liée à des modifications hépatobiliaires ou osseuses, mais son caractère non spécifique limite son interprétation isolée.. Ces résultats soulignent l'intérêt d'une **surveillance biochimique régulière et longitudinale** chez les patients atteints de LAM.

Conclusion

Le suivi longitudinal des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde met en évidence une évolution significative de certains paramètres biochimiques, en particulier de la créatinine, du sodium, du phosphore et de la phosphatase alcaline.

Ces résultats soulignent l'importance d'une surveillance biologique régulière pour détecter précocement les anomalies biologiques et contribuer à une prise en charge optimale des patients.