

Apport du test de libération de l'interféron gamma (IGRA) dans le dépistage de l'infection tuberculeuse latente : expérience du service de biochimie - CHU d'Oran

HACHANI.M , OUDRER M. A , SAADI-OUSLIM A. S
Hachani0mohamed@gmail.com

- Introduction:

- Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la prévalence mondiale de l'infection tuberculeuse latente (ITL) est estimée à environ 30 % de la population. En Algérie, le Rapport annuel sur la situation épidémiologique de la tuberculose -2023- indique que l'incidence de l'ITL varie selon les wilayas, avec des taux compris entre 2 % et 7 %, tandis que le taux d'exhaustivité du dépistage est de 17,7 %.

- Objectifs :

- L'Algérie semble présenter une prévalence de l'infection tuberculeuse latente nettement inférieure à l'estimation mondiale. Toutefois, cette différence importante ne reflète probablement pas la réalité épidémiologique. En effet, le faible taux d'exhaustivité du dépistage (17,7 %) suggère une sous-estimation de la prévalence réelle, rendant les données actuellement disponibles incomplètes et insuffisamment représentatives de la situation nationale.

- Ces résultats confirment l'importance des tests IGRA pour renforcer le dépistage de l'infection tuberculeuse latente et améliorer sa détection précoce.

- Matériels et méthode:


- Ce travail a été réalisé sur un échantillon de 136 patients adressés par différents services hospitaliers, notamment la pneumologie, la médecine interne, l'endocrinologie et la gastro-hépto-entérologie. Le dépistage de l'infection tuberculeuse latente a été effectué à l'aide du test de libération de l'interféron gamma QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus®, QIAGEN). Le dosage de l'interféron gamma (IFN- γ) a été réalisé par la technique ELISA de type « sandwich », conformément aux recommandations du fabricant.

- Résultats

- Cette étude a inclus 136 patients suspectés d'une infection tuberculeuse latente. Parmi eux, 40,4 % présentaient un résultat positif au test QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus), 44,1 % un résultat négatif et 15,4% un résultat indéterminé.

- Présence importante d'infection tuberculeuse (probablement latente) avec un pourcentage proche de l'estimation de l'OMS

	status	nombres
●	Positifs	55
●	Négatifs	60
●	Indéterminé	21



- Conclusion :

- Les tests de libération de l'interféron gamma (IGRA) constituent un outil essentiel pour optimiser le dépistage de l'infection tuberculeuse latente. En améliorant la détection des cas, ils contribuent à une estimation plus précise de la prévalence de l'infection et à une meilleure appréciation de la situation épidémiologique de la tuberculose.

- Références :

- Mode d'emploi de QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)
- RAPPORT ANNUEL SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA TUBERCULOSE EN ALGERIE ANNEE 2023
- Archive des patients du service de biochimie CHUO