



Profil phénotypique Rh (C, c, E, e) des donneurs RhD négatifs : étude descriptive au sein du Centre de Transfusion Sanguine d'Oran

Y. BAOUIA¹, A.O. ZEROUAL¹

¹Centre de Transfusion Sanguine (CTS), Wilaya Oran, Algérie

INTRODUCTION

Le système Rhésus est l'un des systèmes de groupes sanguins les plus importants en transfusion sanguine. Outre l'antigène D, les antigènes C, c, E et e jouent un rôle majeur dans l'allo-immunisation. La connaissance de la distribution des phénotypes Rh chez les donneurs RhD négatifs contribue à l'optimisation de la gestion des produits sanguins labiles et à la sécurisation transfusionnelle.

OBJECTIF


Décrire la répartition des phénotypes Rh (C, c, E, e) chez les donneurs RhD négatifs au sein du CTS d'Oran.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

- **Type d'étude** : descriptive rétrospective
- **Lieu** : Centre de Transfusion Sanguine (CTS), Wilaya Oran
- **Période** : mois de mars 2026
- **Population étudiée** : 1900 donneurs de sang
- **Source des données** : registre d'immunohématologie des donneurs de sang
- **Critère étudié** : phénotypes Rh (C, c, E, e) des donneurs RhD négatifs
- **Analyse** : effectifs et pourcentages

RÉSULTATS

RÉPARTITION DES PHÉNOTYPES RH CHEZ LES DONNEURS RhD NÉGATIFS (n = 189)



DÉTAIL DES PHÉNOTYPES RH CHEZ LES DONNEURS RhD NÉGATIFS

Phénotype Rh (C, c, E, e)	Effectif (n)	Pourcentage (%)
ccee	174	92,1
Ccee	13	6,9
ccEe	2	1,1
Autres phénotypes	0	0
TOTAL	189	100

CHIFFRES CLÉS


1900
donneurs enregistrés

189 (9,95 %)
donneurs RhD négatifs

15/189 (7,9 %)
porteurs de l'antigène C et/ou E (Ccee ou ccEe)

174/189 (92,1 %)
phénotype ccee (sans antigènes C et E)

IMPACT SUR L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL)



DISCUSSION

- Le phénotype ccee est largement prédominant (92,1 %) parmi les donneurs RhD négatifs étudiés.
- La présence des antigènes C et/ou E chez 7,9 % des donneurs RhD négatifs entraîne l'étiquetage des PSL correspondants comme Rhésus positif, réduisant ainsi la disponibilité des PSL étiquetés Rhésus négatif.
- Le phénotypage Rh (C, c, E, e) permet d'identifier ces unités et d'optimiser leur gestion en vue de limiter le risque d'allo-immunisation chez les receveurs.

CONCLUSION

Ces résultats soulignent l'intérêt du phénotypage Rh (C, c, E, e) chez tous les donneurs RhD négatifs afin de limiter le risque d'allo-immunisation et d'améliorer la sécurité transfusionnelle.