



Impact du dépistage de l'anti-HBc sur l'exclusion des dons de sang et la prévention du risque résiduel de transmission du VHB



Sécurité transfusionnelle
Une responsabilité partagée

Étude rétrospective sur 5 établissements – Périodes 2025 et 1^{er} semestre 2026

Auteur : Habchi Manel

Service de transfusion sanguine / Centre de Wilaya de Sang – Algérie



Introduction

Le virus de l'hépatite B (VHB) demeure un risque majeur de transmission transfusionnelle. Le dépistage de l'anti-HBc permet d'identifier les donneurs ayant été exposés au VHB, y compris ceux porteurs d'une infection occulte, et contribue ainsi à renforcer la sécurité transfusionnelle.



Objectif

Évaluer l'impact du dépistage de l'anti-HBc sur l'exclusion des dons de sang et apprécier son intérêt dans la prévention du risque résiduel de transmission du VHB.



Matériel et méthodes

- Étude rétrospective descriptive
- Données issues de 5 établissements de collecte de sang :
 - EPH El Bir
 - Didouche Mourad (DM)
 - Zighoud Youcef (ZY)
 - KH
 - CWS
- Périodes : 2025 et 1^{er} semestre 2026
- Recherche des marqueurs :
 - Ag HBs (antigène de surface du VHB)
 - Ac anti-HBc (anticorps dirigés contre la capsid du VHB)
- Analyse des résultats par établissement et en global.



Les résultats sont exprimés en nombre de dons et en pourcentage.



Résultats

1. Répartition des dons selon le profil sérologique – 2025

Établissement	Dons totaux	Anti-HBc seul (n)	Ag HBs seul (n)	Mixte (n)
EPH El Bir	651	63	1	0
Didouche Mourad	2 167	88	4	1
Zighoud Youcef	722	26	1	0
KH	2 060	122	3	7
CWS	2 299	83	8	1
Total	7 899	382	17	9

2. Répartition des dons selon le profil sérologique – 1^{er} semestre 2026


Établissement	Dons totaux	Anti-HBc seul (n)	Ag HBs seul (n)	Mixte (n)
EPH El Bir	268	10	0	1
Didouche Mourad	799	25	2	1
Zighoud Youcef	400	20	2	1
KH	683	36	1	1
CWS	1 318	51	1	1
Total	3 468	142	6	5




Synthèse globale

Dons totaux (2025 + 1 ^{er} sem. 2026)	Anti-HBc positif (seul + mixte)	Ag HBs positif (seul + mixte)	Au moins un marqueur positif (anti-HBc ou Ag HBs)
11 367	275 (2,42 %)	23 (0,20 %)	298 (2,62 %)


4. Comparaison des profils de positivité par établissement



5. Comparaison 2025 vs 1^{er} semestre 2026 (par marqueur)



6. Répartition des dons selon le profil sérologique (par année)



Principaux résultats

- En 2025, 382 dons (4,83 %) étaient anti-HBc positifs dont 122 (1,54 %) à KH, le taux le plus élevé.
- En 1^{er} semestre 2026, 142 dons (3,84 %) étaient anti-HBc positifs.
- L'Ag HBs seul était rare : 17 dons (0,22 %) en 2025 et 6 dons (0,17 %) en 2026.
- Le profil mixte (Ag HBs + anti-HBc) restait faible : 9 dons (0,34 %) en 2025 et 5 dons (0,14 %) en 2026.
- Le CWS présentait le plus grand nombre de dons positifs, suivi de KH et Didouche Mourad.



Points clés

- L'anti-HBc permet d'identifier des donneurs à risque d'infection occulte, non détectés par l'Ag HBs seul.
- La positivité anti-HBc est plus fréquente que l'Ag HBs seul, confirmant l'intérêt de ce marqueur dans la réduction du risque résiduel.
- Des variations sont observées entre les établissements, pouvant refléter des différences de population de donneurs et/ou de pratiques de collecte.



Conclusion

- Le dépistage systématique de l'anti-HBc contribue significativement à la sécurité transfusionnelle en permettant l'exclusion des dons à risque et en participant à la prévention du risque résiduel de transmission du VHB.
- Son intégration dans les stratégies de qualification biologique des dons reste essentielle.



Mots-clés

VHB – anti-HBc – Ag HBs – don de sang – sécurité transfusionnelle



Un sang sûr, c'est une vie protégée

Auteur : Habchi Manel