

Introduction

Le tabac est un phénomène de société, de plus en plus d'hommes fument dès le jeune âge. Selon l'OMS, environ un tiers de la population de plus de 15 ans fume. Plusieurs études ont mis en évidence les effets délétères de la fumée de cigarette chez l'homme et spécialement sur la fertilité. En effet, il existe un passage de la barrière hémato-testiculaire de certaines substances contenues dans la fumée de cigarette. La présence de tels composés dans le liquide séminal des fumeurs entraîne une altération des paramètres spermioologiques et de la qualité nucléaire des spermatozoïdes, compromettant de ce fait les chances de grossesse.

Matériels et Méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée au service d'Histologie-Embryologie et Génétique Cliniques CHU Constantine sur une période de 18 mois .


Cette étude a porté sur un échantillon de 406 consultants dont 142 patients de sexe masculin fumeur, consultant dans le cadre d'une exploration d'une infertilité du couple.

Le sperme recueilli au laboratoire est mis dans une étuve à 37° C pendant 30 mn pour une liquéfaction du liquide séminal.


Résultats

Dans notre étude l'ensemble les hommes consultant pour infertilité fument en majorité (35,95%).


L'âge moyen de nos patients était de 38 ans. La mobilité était altérée chez les fumeurs avec une diminution de la vitalité et de la numération spermatique. La tératospermie était plus importante chez les fumeurs, avec une augmentation particulière des spermatozoïdes microcéphales, une relation statistiquement significative a été retrouvée entre les anomalies morphologiques des spermatozoïdes et le tabagisme.




Graph 1 : Répartition selon la consommation de la cigarette chez la population étudiée




Graph 2 : Répartition selon la numération des spermatozoïdes




Graph 3 : Répartition selon la mobilité des spermatozoïdes



Graph 4 : Répartition selon les résultats du Spermocytogramme



Graph 5 : Répartition selon le type des anomalies morphologiques des spermatozoïdes



Graph 6 : Répartition selon les différents diagnostics

Discussion

Le tabac est un véritable fléau mondial qui est en nette progression en particulier chez les jeunes. Tous les pays du monde sont concernés (50 à 60% chez les adultes de sexe masculin).

En l'an 2000, le tabagisme a été à l'origine de 4 200 000 décès dans le monde, dont la moitié est survenue dans les pays en voie de développement

Les résultats de notre étude montrent une altération des paramètres spermatiques les plus importants (concentration, mobilité, vitalité et morphologie).

En effet, il existe une diminution statistiquement significative de la concentration des spermatozoïdes (49,3% d'oligospermie). La Mobilité progressive des spermatozoïdes est statistiquement diminuée chez les fumeurs (86,66% d'asthénospermie), ainsi que la morphologie (23,23% de tératospermie), ces résultats ont été confirmé par la littérature. En effet, plusieurs études rapportent une altération du mouvement des spermatozoïdes chez les fumeurs qui serait due à l'effet des hydrocarbures et des aldéhydes qui sont responsables d'une inhibition du mouvement flagellaire .

Le tabac a aussi un effet délétère sur la fertilité masculine.

Conclusion

L'infertilité masculine occupe une place de plus en plus importante dans les étiologies de l'infertilité du couple.

Les résultats de notre étude viennent enrichir les données de la littérature concernant l'effet délétère du tabac sur la spermatogenèse. Ces résultats voient leur importance dans le conseil et la prise en charge des couples infertiles.

En effet, l'arrêt du tabac doit être le premier traitement proposé dans le cadre de la prise en charge de l'infertilité masculine.

Références bibliographiques

World Health Organization. Tobacco on health. A global status report. Geneva (Switzerland): WHO, 1997.

Hill C et al. Tabagisme et mortalité : aspects épidémiologiques. BEH 2003 ; 22-23 : p 98-100.

Stillman RJ. Smoking and reproduction. Fertil Steril. 1986 ; 46 : p545-66.

Vine MF et al. Cigarette smoking and sperm density: a meta-analysis. Fertil Steril ; 1994 ; 61 : 35-43.

Wong WY, Thomas C, Merkus H, Zielhuis GA, Doesburg W, Steegers-Theunissen R. Cigarette smoking and the risk of male factor subfertility: minor association between cotinine in seminal plasma and semen morphology. Fertil Steril. 2000 ; 74 : p 930-5.