

## Place du frottis cervico-vaginal dans le bilan initial d'infertilité

S. BELHOUT<sup>1</sup>, S. CHEBOUT<sup>1</sup>, R. ABDESSEMED<sup>1</sup>, I. BOUDERRES<sup>1</sup>, I. BOUSNINA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Service d'Histologie, Embryologie et Génétique Clinique, Centre Hospitalo-Universitaire  
Dr Benbadis - Constantine, Constantine, Algérie.

### Introduction

L'infertilité est un défi de santé publique qui affecte un nombre croissant de couples. Le frottis cervico-vaginal a un rôle indispensable dans son bilan initial permettant de détecter les pathologies souvent asymptomatiques du tractus génitale féminin pouvant entraver la fertilité.


### Objectif

- Évaluer l'intérêt diagnostique du frottis cervico-vaginal dans le bilan étiologique de l'infertilité féminine.
- Déterminer la prévalence des anomalies cervicaux-vaginales pouvant altérer la fertilité.

### Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective/prospective menée sur un échantillon de soixante 60 patientes ayant consulté dans notre service dans le cadre d'un bilan d'infertilité du couple et dont le spermogramme du conjoint était normale chez 40 couples, 20 malades avaient une asthenospermie.

Nos patientes avaient bénéficié d'un frottis cervico vaginal pour analyse cytologique et recherche de pathologies inflammatoires ou infectieuses associées.



#### Prise en charge des patientes:


La mise en évidence de ces anomalies nous a mené à instaurer un traitement adapté associant antibiotique, antiinflammatoire ou antifongiques.

### Résultats et discussion


Parmi les anomalies révélées à l'analyse cytologique une prévalence significative de frottis inflammatoires a été observée chez nos patientes, évoquant une cervicite spécifique ou non spécifique.

- Les cervicites spécifiques étaient liées à plusieurs agents pathogènes :
  - Chlamydia trachomatis: 2cas
  - HPV: 1cas
  - Gardnerella vaginalis: 3cas
  - Candidoses vulvo-vaginales: 5cas

- Les formes non spécifiques (érosions du col, cervicite et vaginites) décelés dans 70% des cas étaient probablement liées à un déséquilibre de la flore (vaginose bactérienne), à une irritation mécanique ou chimique, ou à un trouble hormonal.




Observations microscopiques  
a: Frottis inflammatoire non spécifique  
b: Frottis inflammatoire spécifique (candidose vv)



Types des inflammations cervico-vaginales

#### Après prise en charge:

- Disparition totale de l'inflammation, confirmée par des FCV de contrôle
- Vingt-cinq (25) grossesses évolutives ont été recensées.
- Le reste des patientes était perdu de vue.



Résultats après prise en charge

Les inflammations causées par ces infections altèrent la fécondation soit en bloquant le passage de l'ovocyte soit en altérant la qualité ou la progression des spermatozoïdes.

### Conclusion

L'indication des FCV pour nos patientes a mis en évidence une prévalence élevée de remaniements inflammatoires et d'infections cervico-vaginales spécifiques et non spécifiques.

La résolution de cette inflammation locale par un traitement ciblé a permis une restauration de l'écosystème vaginal et favorisé la survenue de grossesses évolutives (25 % dans notre série).

On conclut que; Le FCV, examen simple, non invasif, est indispensable dans le bilan initial d'infertilité, il permet d'identifier et traiter les cervicites et vaginites asymptomatiques qui altèrent la glaire cervicale et entravent la migration des spermatozoïdes, de prévenir les infections génitales hautes et ainsi d'optimiser les chances de conception.

### Références bibliographiques

- 1--Babu, R. S., et al. Role of pap smear in the evaluation of female infertility and detection of asymptomatic lower genital tract lesions. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 2020.
- 2-Marconi C, De Castro AR, Silva MG. Cervico vaginal cytology and its role in detecting asymptomatic lower genital tract infections in infertile women. J Low Genit Tract Dis. 2018;22(3):235-40.
- 3-Wirahusada Medical Center Study (2025). Incidence of Cervicitis in Infertile Women: A Study in Medical Center Clinic, Makassar City.