



Intérêt des marqueurs immunologiques dans le suivi de l'activité de la néphropathie lupique


L.Mahmoudi, I.Slimani, S.Yagoub, A.Adjissi, N.Lyazidi, D.Bendjeddou, S.Ayoub, S.Chaib-Mamouzi

Introduction :

La néphropathie lupique (NL) représente l'une des complications les plus fréquentes et les plus sévères du lupus érythémateux systémique (LES)(1). Plusieurs marqueurs immunologiques ont été étudiés afin de sélectionner un biomarqueur de suivi de l'activité de la maladie.

L'objectif de cette étude est d'évaluer la fréquence de certains marqueurs immunologiques et d'analyser leur performance diagnostique dans le suivi de l'activité de la NL.

Matériels et méthodes:



Résultats :

➤Caractéristiques démographiques et cliniques

Tableau 1.Caractéristiques générales de la population étudiée

43 patients LES		
Sexe	2H	41 F
Moyenne d'âge	37,84 ± 14,36	
Atteinte rénale	28 (65,1 %)	
AAN positifs	93 %	

➤Fréquence des marqueurs immunologiques dans la NL

Tableau 2. Fréquence des marqueurs selon l'activité

	NL active	NL inactive	P
anti ADN	100 %	51,1%	0,016
antinucléosomes	85,7%	7,1 %	0,000
anti C1q	92,9%	28,6%	0,001
anti ribosomes	57,1%	14,3%	0,046
C3	78,6%	21,4%	0,007
C4	64,3%	14,3%	0,018

Les anticorps anti-ADN étaient les plus fréquents chez les patients présentant une NL active (100 %).

➤Performances diagnostiques :




Figure1.ROC des marqueurs dans la néphropathie lupique active

Les anticorps anti ADN présentait la meilleure surface sous la courbe (AUC = 0.990) avec une sensibilité de 100% et une spécificité de 92%, suivi des anti nucléosomes (0,939 ,85 %, 100 %), anti C1q (0,913, 78%, 92%), anti ribosomes (0,768, 92%, 57%), C3 (0,156, 14 %, 78 %) et C4 (0,112, 57%, 14%).

Discussion :

Les anticorps anti-ADN étaient les plus fréquemment observés chez les patients avec néphropathie lupique active et ont montré les meilleures performances diagnostiques.

Ces résultats sont en accord avec plusieurs études ayant rapporté une association étroite entre les anticorps anti-ADN et l'activité de la néphropathie lupique (2).

Cette association s'explique par leur implication dans la formation de complexes immuns responsables des lésions glomérulaires et de l'activation du complément.(3,4)

Dans notre série, les anti-ADN se sont révélés plus performants que les autres biomarqueurs étudiés pour discriminer les formes actives de néphropathie lupique en concordance avec les résultats d'une étude algérienne (2).

Conclusion :

Les anticorps anti-ADN constituent le biomarqueur immunologique le plus performant pour le suivi de l'activité de la NL.

Références bibliographiques

1.Raimbourg et Daugas, 2019. Atteintes rénales du lupus. Néphrologie & Thérapeutique.
2.Allam I, Djidjik R. Les marqueurs immunologiques au cours des poussées de la néphropathie lupique 2018.
3.Pagkopoulou E, et al. Autoantibodies in SLE Diagnostic and Pathogenic Insights. J Clin Med 2025
4.Ségalen et al. Immuno-Anal Biol Spéc. 2011.