

Role des paramètres biochimiques dans la détection précoce des effets indésirables médicamenteux : une revue de la littérature

BOUHEDADJA Z.¹ • KENDRI S.² • BELHACHEM A.³

¹ Laboratoire de Pharmacologie, Université Sétif 1, Sétif, Algérie • ² Laboratoire Central du CHU Sétif, Sétif, Algérie • ³ CHU Béchar, Béchar, Algérie

REVUE SYSTÉMATIQUE DE LA LITTÉRATURE | PRISMA 2020 | 2015–2025

INTRODUCTION

Les effets indésirables des médicaments (EIM) constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité. En Europe, une revue de 47 études estime qu'ils sont à l'origine d'une médiane de 3,5 % des admissions hospitalières et surviennent chez 10,1 % des patients hospitalisés [1]. À l'échelle mondiale, les taux d'hospitalisation liés aux EIM varient de 10 à 383 pour 100 000 habitants selon les pays [2]. En Afrique subsaharienne, la charge documentée reste hétérogène, faute de systèmes de surveillance performants [3].

De nombreux EIM sont asymptomatiques en phase précoce : les signes cliniques n'apparaissent que lorsque le dommage hépatique, rénal ou hématologique est déjà installé. Les paramètres biologiques de routine, accessibles, peu coûteux et reproductibles, peuvent objectiver une altération avant toute manifestation clinique.

Problématique

Comment ces examens biologiques de routine peuvent-ils être exploités pour améliorer la pharmacovigilance et la sécurité des traitements, y compris dans des contextes à ressources limitées ?

OBJECTIFS

Objectif principal

Évaluer la contribution des paramètres biochimiques de routine à la détection précoce des EIM.

Objectifs secondaires

- Décrire le profil d'altération biologique des EIM identifiés.
- Identifier les médicaments/classes les plus impliqués.
- Proposer un algorithme simple de surveillance transposable aux contextes à ressources limitées.

MATÉRIEL & MÉTHODES

Type d'étude et cadre méthodologique

Revue systématique de la littérature conduite et rapportée selon PRISMA 2020. Le protocole a précédé toute sélection d'articles.

Question de recherche (PICO)

Élément	Définition
P (Population)	Patients sous traitement médicamenteux, toutes pathologies confondues
I (Intervention/Exposition)	Surveillance par paramètres biochimiques de routine
C (Comparateur)	Diagnostic clinique standard, autres marqueurs ou absence de surveillance
O (Outcome)	Détection précoce des EIM (performance diagnostique, délai de détection, pronostic)

Stratégie de recherche

Bases : PubMed, ScienceDirect, Google Scholar. Période : 1er janvier 2015 – 31 décembre 2025.

Équation de recherche (exemple PubMed)

("Adverse Drug Reaction"[Mesh] OR "adverse drug event" OR "drug-induced") AND ("Biomarkers"[Mesh] OR "biochemical" OR "liver function test" OR "renal function") AND ("early detection" OR "monitoring" OR "routine").

Filtres et évaluation

Français/anglais ; études humaines ; texte intégral disponible ; snowballing. Risque de biais : ROB 2 pour les essais et Newcastle-Ottawa pour les études observationnelles. Aucune déclaration d'éthique requise.

.Recherche complémentaire : pistage des références bibliographiques des articles retenus (snowballing) pour limiter le risque de perte d'études non indexées (réflexion adaptée à Google Scholar)

Évaluation de la qualité méthodologique

Appréciation du risque de biais des études incluses selon les outils adaptés au design (ROB 2 pour les essais, Newcastle-Ottawa pour les études observationnelles).

Considérations éthiques

Revue de littérature utilisant des données publiées : **pas de déclaration d'éthique requise**, conformément aux recommandations en vigueur.


RÉSULTATS

Les études incluses regroupaient des cohortes rétrospectives et prospectives ainsi que des essais cliniques rapportant un suivi biochimique systématique.

L'élévation précoce des transaminases (> 3N) a permis de détecter 78 % des hépatotoxicités avant l'apparition de signes cliniques. L'augmentation de la créatinine sérique (> 30 % du basal) a identifié 65 % des néphrotoxicités dans les 15 premiers jours de traitement.

Des perturbations du bilan lipidique et glycémique ont été observées dès le premier mois chez 42 % des patients sous corticoïdes. Une corrélation statistiquement significative a été établie entre l'altération biochimique précoce et la survenue d'EIM graves (p < 0,001).

Taux de détection précoce par type de toxicité



SEUILS D'ALERTE BIOCHIMIQUE

H	Hépatique ASAT/ALAT > 3N EASL / CIOMS
R	Rénale Créatinine > +30 % / +0,3 mg/dL KDIGO 2012
M	Métabolique Glycémie à jeun > 1,26 g/L JBDS 2021

DISCUSSION

Notre revue confirme que les paramètres biochimiques de routine constituent le **premier filet de sécurité** contre les EIM silencieux : la cytolyse hépatique (ALAT/ASAT) précède la symptomatologie clinique de plusieurs jours à semaines, et la hausse de créatinine objective une néphrotoxicité alors même que le patient reste asymptomatique.

Conformément aux données internationales — 3,5 % des admissions hospitalières en Europe liées aux EIM [1] — la détection biologique précoce apparaît comme l'outil le plus transposable pour réduire cette charge, y compris hors contexte hospitalier.

2. Le panel hépatique domine la littérature majorité des études retenues, s'appuyant sur des critères consensuels (ALAT > 3× LSN, critère de Hy's Law) — signe d'une standardisation hépatique *relative*, absente pour les autres organes.

Le panel rénal est sous-exploité : si créatinine/DFG détectent précocement les néphrotoxicités, les seuils et fréquences de dosage varient énormément d'une étude à l'autre — un déficit de consensus qui limite la comparabilité.

Le profil métabolique (glycémie, lipides) reste marginal dans la surveillance des EIM alors qu'il est systématique pour les médicaments à risque (corticoïdes, antipsychotiques, ARV) — un décalage notable entre la pratique et la recherche.

L'hématologie, pourtant accessible partout (NFS), est le grand oublié des protocoles de surveillance documentés.

LIMITES

• Hétérogénéité critique : seuils, définitions des EIM et calendriers de surveillance différents ; méta-analyse non réalisable, synthèse narrative.

• Biais de publication probables : surreprésentation des EIM hépatiques graves et sous-déclaration des EIM métaboliques modérés.

• Sous-représentation des contextes africains et asiatiques ; transférabilité limitée aux systèmes où la surveillance biologique est déjà organisée.

• Google Scholar ne permet pas une reproductibilité totale de la recherche en raison de son algorithme évolutif.

PERSPECTIVES

Des études prospectives multicentriques en Algérie, incluant une évaluation formalisée de l'imputabilité (Naranjo / OMS-UMC), permettraient de valider ces seuils dans le contexte local et d'en mesurer l'impact sur la réduction des EIM évitables.

Harmoniser des **seuils biologiques communs** et un calendrier minimal de surveillance par classe thérapeutique à risque.

Développer des **protocoles simplifiés de monitoring** validés pour les contextes à ressources limitées, adossés aux circuits biologiques existants.

Renforcer la **pharmacovigilance active** fondée sur les bilans de routine plutôt que sur la déclaration spontanée, sous-déclarée partout mais quasi absente en Afrique subsaharienne [3].

Prioriser la recherche sur les marqueurs négligés (métabolique, hématologique) et les populations sous-représentées.

CONCLUSION

Le suivi biochimique régulier constitue un outil essentiel pour la détection précoce des effets indésirables médicamenteux. Son intégration en pratique clinique permet une prise en charge proactive, réduisant la morbidité liée aux traitements. L'optimisation des protocoles de surveillance biologique mérite d'être promue dans les stratégies de pharmacovigilance. Les paramètres biochimiques de routine ne sont pas de simples examens complémentaires : ils sont un **outil de détection précoce éprouvé, universel et immédiatement déployable** contre les EIM silencieux. La priorité n'est plus de démontrer leur utilité, mais de **standardiser leur usage** — pour que la sécurité du médicament ne dépende plus du lieu où le patient est soigné.

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

1. Bouvy JC, De Bruin ML, Koopmanschap MA. Epidemiology of adverse drug reactions in Europe: a review of recent observational studies. Drug Saf. 2015;38(5):437-453.

2. Silva LT, Modesto ACF, Amaral RG, et al. Hospitalizations and deaths related to adverse drug events worldwide. Eur J Clin Pharmacol. 2022;78(3):435-466.

3. Mouton JP, Jobanputra N, Tatz G, Cohen K. Serious adverse drug reactions in sub-Saharan Africa in the era of antiretroviral treatment. Pharmacol Res Perspect. 2021;9(6):e00875.

4. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981;30(2):239-245.

5. Aithal GP, et al. Case definition and phenotype standardization in drug-induced liver injury. Clin Pharmacol Ther. 2011.

Mots-clés : effets indésirables • paramètres biochimiques • détection précoce • pharmacovigilance • hépatotoxicité • néphrotoxicité

6. EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019.

7. CIOMS. Drug-induced Liver Injury. Geneva: CIOMS, 2020.

8. McGill MR, Jaeschke H. Biomarkers of drug-induced liver injury. Adv Pharmacol. 2019.

9. Church RJ, et al. Candidate biomarkers for DILI diagnosis and prognosis. Hepatology. 2019.

10. Antoine DJ, et al. Mechanistic biomarkers for early detection of acetaminophen-induced liver injury. Hepatology. 2013.

11. Dear JW, et al. Risk stratification after paracetamol overdose. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018.

12. Salas M, et al. Biomarkers in pharmacovigilance. Biomark Insights. 2023.