




DIFFICULTÉS DIAGNOSTIQUES D'UN VARIANT RhD PARTIEL: À PROPOS D'UN CAS

R.Nouar, R.Lasgaa, R.Djerdi, S.Kehila, N.Boulemkahel

service d'Hémodiologie et transfusion sanguine, CHU Setif




INTRODUCTION

Le système Rhésus est le deuxième système de groupes sanguins le plus immunogène après le système ABO.


Le système Rh comprend plus de 50 antigènes, dont cinq sont cliniquement majeurs : **D, C, c, E, et e.**

Les variants de l'antigène D peuvent être à l'origine de difficultés diagnostiques et avoir des implications transfusionnelles et obstétricales.




METHODE ET MATERIEL

Groupe ABO et phénotype




Réalisation sur plaque

Technique de carte gel




Confirmation des résultats

Test à l'antiglobuline directe (DU)




Effectué

Une seconde détermination a été réalisée 15 jours plus tard sur plaque ainsi qu'avec deux types différents de cartes gel afin de confirmer les résultats.



VARIANT RAD PARTIEL: UN DÉFI DIAGNOSTIQUE

Antigène D complet (normal)




Nombreux épitopes présents




Ces variants peuvent ne pas réagir ou réagir faiblement avec certains réactifs anti-D, entraînant des résultats discordants

Antigène D partiel (variant)



Absence partielle de certains épitopes

VS



CAS CLINIQUE

femme s'est présentée au niveau de notre service pour la détermination de son groupe sanguin à la suite d'un avortement.

- **Antécédents :**
- Connue RH positif issue de parents Rh+
- Mariée à un conjoint Rh+
- Mère de trois enfants Rh+
- N'a jamais été transfusée
- N'a jamais reçu d'anti D au cours de ses grossesses précédentes




RESULTATS

1- PREMIERE DETERMINATION

Groupe ABO	RhD (plaque)	Carte gel	DU
 O	 RhD négatif (cceek-)	 RhD négatif	 Fortement positif

2 -DEXIEME DETERMINATION A' 15 J

RhD sur plaque	Cartes gel (deux types différents)	
 RhD faiblement positif (réaction tardive)	Carte gel type 1	Carte gel type 2
	 RhD négatif	 RhD positif



Résultats discordants entre plaque et cartes gel.



CONCLUSION

Cette discordance des résultats RhD évoquait la présence d'un variant de l'antigène D (D partiel).

La patiente a été adressée pour une étude moléculaire du gène RHD, indispensable pour caractériser le variant et adapter la prise en charge transfusionnelle et obstétricale.

IMPLICATIONS TRANSFUSIONNELLES

- Risque d'allo-immunisation anti-D
- Nécessité de transfuser des CGR compatibles RhD négatif
- Documentation rigoureuse du phénotype

IMPLICATIONS OBSTÉTRICALES

- Gestion adaptée de la prophylaxie anti-D
- Suivi immuno-hématologique rapproché
- Prévention des complications photo-néonatales

MESSAGE CLÉ : Devant une discordance RhD, penser à un variant D partiel.

Seule l'étude moléculaire permet une caractérisation précise.