

LE MONDE FACE AUX MALADIEEMERGENTES

Comparaison de l'évolution mondiale de la COVID-19 et du Mpox (2022-2025)

ZITI Meriem¹ (email : dr.ztmeriem@gmail.com, Tél : 06 64 36 97 34)
L.KARA^{1,3}, W.BAARIR.²M.CHOUBANE¹, S.ABBACHE¹, R.BOUROUCHE¹, C.KADRI¹, S.LAOUAMRI¹
1 Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive, CHU de Sétif
2 CHU de Douera
3 Laboratoire de Santé et Environnement des Hauts Plateaux Sétifien, université Ferhat Abbas Sétif

Introduction :

La COVID-19 est une maladie émergente apparue en 2019 et rapidement devenue une pandémie mondiale. Le Mpox, bien que connu depuis plusieurs décennies et endémique dans certaines régions africaines, a connu en 2022 une diffusion multirégionale inhabituelle, considérée comme un événement émergent.


Matériels et Méthodes :

Une description comparative rétrospective a été réalisée à partir des données de surveillance mondiale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La période d'étude s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Les variables analysées comprenaient le nombre annuel de cas confirmés, le nombre de décès, le nombre de pays touchés et le taux de létalité.

Objectif

viser à comparer l'évolution mondiale de la COVID-19 et du Mpox entre 2022 et 2025 afin de mettre en évidence leurs différences de diffusion et d'impact

Résultats



Références

- World Health Organization (WHO). Mpox global trends. Geneva: World Health Organization; 2026 [data as of 30 April 2026]
- World Health Organization (WHO). WHO COVID-19 Dashboard: COVID-19 data. Geneva: WHO; 2020-2026.

Résultats clés

1	 NOMBRE DE CAS (Total 2022-2025)	COVID-19 498 437 581	Mpox 174 793
2	 NOMBRE DE DÉCÈS (Total 2022-2025)	COVID-19 1 661 891	Mpox 487
3	 TAUX DE LÉTALITÉ (CFR) (Total 2022-2025)	COVID-19 0,33 %	Mpox 0,28 %
4		Malgré une diffusion mondiale beaucoup plus importante de la COVID-19, le Mpox montre une persistance de transmission sur plusieurs années.	

Données mondiales 2022-2025 | Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Conclusion

Une dynamique épidémiologique distincte entre les deux maladies souligne l'importance du maintien d'une surveillance épidémiologique renforcée et d'une coopération internationale.