



Profil clinico-biologique au cours de la cholangite biliaire primitive dans la région de Constantine

E.BOUACHA¹, N.BENACHOUR¹

¹Service d'Immunologie, Centre Hopitalo-Universitaire Dr BENBADIS Constantine

Introduction

La cholangite biliaire primitive (CBP) est une hépatopathie auto-immune rare, touchant principalement les femmes et caractérisée par une destruction progressive des petits canaux biliaires. L'objectif de ce travail est d'étudier le profil clinique et biologique chez une série de patients atteints d'une CBP.

Matériels et Méthodes

-Une étude rétrospective a été menée sur 20 mois (janvier 2024 - août 2025) incluant 20 patients atteints de CBP colligés au niveau du service d'immunologie, CHU Constantine et diagnostiqués selon les critères diagnostiques de l'European Association for the study of the liver (EASL, 2018).

-Les données cliniques ont été collectées à partir des fiches de renseignements et la recherche des anticorps anti-mitochondries (AAM) a été effectuée par immunofluorescence indirecte (IFI) sur coupe de tissus foie/estomac/rein de rat (Euroimmun). La recherche des autres auto-anticorps spécifiques de la CBP a été effectuée par Immunoblot (Euroline Autoimmune Liver Diseases)(Fig1).




Fig.1: Cibles antigéniques du dot Liver Euroimmun

Conclusion

Ces résultats soulignent la présentation clinique classique de la CBP dans notre série et réaffirment la haute valeur diagnostique du bilan immunologique.

Résultats et Discussion

- La totalité des patients étudiés étaient de sexe féminin, d'âge moyen de 49,16 ans [26-77 ans].
- Les principaux signes cliniques étaient : le prurit (16 cas), l'asthénie (15 cas), l'hépatomégalie (10 cas), les douleurs abdominales et les douleurs articulaires (9 cas). (Fig.2)
- Tous les patients présentaient une cholestase biologique, associée à une cytolysé dans 5 cas.
- Le bilan immunologique a montré la présence des anticorps AAM chez tous nos patients.
- L'immunodot a révélé la positivité des anti-AAM-M2, anti-M2-3E, anti Ro52, anti-Sp100, anti-gp210 et les anti-PML respectivement dans 100% (20 cas), 100% (20 cas), 40% (8 cas), 40% (8 cas), 30% (6 cas) et 15% (3 cas).
- Les fréquences des signes cliniques retrouvés concordent avec ceux de la littérature: Hammami et al [1], Harbi et al [2], Chouaib et al. [3]
- La cholestase était présente chez la totalité de nos patients, cette dernière n'est pas retrouvée avec la même fréquence que dans l'étude de Chouaib et al [3] . La fréquence de la cytolysé hépatique observée dans notre série concordait avec celle de l'étude de Chouaib et al. [3]
- Pour ce qui est des auto-anticorps, les anticorps anti-AMA-2 étaient prédominants, ce résultat rejoint ceux rapportés par Floreani et al. [4]
- Les fréquences des Ac anti-Sp100 et gp210 observées étaient comparables avec celles rapportées par Benlamine et al. [5]
- En effet les anticorps anti-Sp100 sont plus fréquents dans les CBP séronégatives (sans AMA2), soit seuls, soit associés aux Ac anti-gp210 [6]. Par contre les anticorps anti-gp210 sont très spécifiques de la CBP (99%) ; leur mise en évidence affirme donc le diagnostic, même en l'absence d'AMA-2.




Fig.2: Répartition en fonction des signes cliniques les plus fréquemment retrouvés.

Bibliographie

- [1]: Hammami A, Hasnaoui B, Ksaa M, Jaziri H, Elleuch N, Brahem A, Ajmi S, Ben Slama A, Jmaa A. La cholangite biliaire primitive : à propos de 71 cas. Rev Med Interne 2017 p : A109–A248.
- [2]: Harbi R, Elleuch N. La cholangite biliaire primitive : étude rétrospective d'une série tunisienne. Rev Med Interne 2019 p : A101–A220.
- [3]: Chouaib S, Abbes L, Maamouri N, Ouerghi H, Ben Hriz F, Belkahla N, Chaabouni H, Ben Mami N. La cirrhose biliaire primitive en Tunisie : à propos de 43 cas. Rev Med Interne 2009.
- [4]: Floreani A, Franceschet I, Cazzagon N, Spinazzè A, Buja A, Furlan P, Baldo V, Gershwin ME. Extrahepatic Autoimmune Conditions Associated with Primary Biliary Cirrhosis. Clinic Rev Allergy Immunol 2014.
- [5]: BenLamine Z, Ben Jazia I, Ben Ahmed M, Ben Slama A, Baccouche A, Slama F, Jemaa A, Ghedira I, Mankai A. Anti-gp210 and anti-Sp100 antibodies in primary biliary cholangitis. Arab.
- [6]: Muratori P, Muratori L, Ferrari R, Fabio Cassani F, Bianchi G, Lenzi M, Rodrigo L, Linares A, Fuentes D, Bianchi F. Characterization and clinical impact of antinuclear antibodies in primary biliary cirrhosis. Am J Gastroenterol 2003; 98(2):431-7.