

MALADIE DE BASEDOW ET SANTÉ HÉPATIQUE : UN FACTEUR DE RISQUE POUR LE NASLD ?

Boufamma A (1,2,3); Djettaoui A G ; Daas O; Benembarek K (1,2,3),

1. Laboratoire de biochimie, CHU de Constantin Ibn badis. 2. Faculté de Médecine de Constantine, Université Constantine 3.
3. Laboratoire de Biologie et de Génétique moléculaire.



Introduction

La maladie de Basedow est la principale cause d’hyperthyroïdie auto-immune. Bien qu’elle soit rare, ses complications métaboliques peuvent être sévères et nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. La maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) pourrait partager certains mécanismes physiopathologiques avec la maladie de Basedow. Peu de travaux ont néanmoins exploré ce lien potentiel.

Objectif

Notre étude a pour objectif d’évaluer la possible association entre la maladie de Basedow et la MASLD.

Résultats



Patients et Méthodes


Il s’agit d’une étude transversale descriptive portant sur 30 patients atteints de la maladie de Basedow. Le recueil des données cliniques a été réalisé à l’aide d’une fiche de renseignements, tandis que les explorations biochimiques ont été effectuées au niveau du laboratoire central de biochimie du CHU de Constantine.

Le dépistage de stéatopathie non alcoolique NAFLD était réalisé par HSI (Hepatic Steatosis Index), et l’insulinorésistance par l’indice Tyg.

La signification statistique était déterminée pour une $p < 0,05$.

Discussion

Contrairement aux données de cohortes populationnelles récentes rapportant un effet protecteur de l’hyperthyroïdie sur l’incidence de NAFLD, notre série montre une association positive entre la maladie de Basedow et un HSI élevé (cf. Labenz et al., 2021. Cette divergence pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment l’influence du traitement antithyroïdien, la présence de comorbidités métaboliques (diabète, surpoids), ainsi qu’un possible effet confondant de l’élévation des transaminases liée à la thyrotoxicose. De plus, l’utilisation d’un indice indirect comme le HSI peut surestimer la stéatose en contexte de perturbations hépatiques non métaboliques.



Conclusion

La maladie de Basedow semble associée à des altérations métaboliques pouvant influencer la santé hépatique. Nos résultats suggèrent une possible relation entre cette hyperthyroïdie auto-immune et la NAFLD, justifiant une surveillance hépatique ciblée.

Références

1. H.-F. Zhang, Q.-X. Zhang, Y.-H. Feng, S.-J. Li, B.-Y. Xie Association of thyroid disease and risk of fatty liver disease: an exposure-wide Mendelian randomization study
2. Labenz C. et al., 2021 — Impact of thyroid disorders on the incidence of non-alcoholic fatty liver disease
3. Xiang L. et al., 2024 — Association between thyroid function and nonalcoholic fatty liver disease (revue / méta-analyse narrative)