

Hyperuricémie et diabète type 2

ADIMI.M(1), OUNNOUGHI.C(1) DJABI.F (1)
(1) CHU Sétif, Laboratoire central de biologie

Introduction

L'hyperuricémie est une anomalie métabolique fréquemment observée chez les patients atteints de diabète de type 2 (DT2). Elle est impliquée dans l'insulinorésistance et pourrait contribuer au développement des complications cardio-rénales. Son évaluation chez les patients diabétiques présente un intérêt clinique croissant.

I. Objectif

Déterminer la prévalence de l'hyperuricémie chez les patients atteints de diabète de type 2 et étudier sa relation avec la glycémie.

II. Matériel et méthode

- ✓ Etude transversal au niveau du laboratoire central de biologie du CHU de Sétif.
- ✓ Etait inclus 62 patients diabétiques type 2 et ayant bénéficié d'un bilan biologique au niveau du laboratoire central de biologie.
- ✓ Les paramètres biologiques analysés comprenaient la glycémie, l'acide urique, la créatinine, l'urée, le bilan lipidique complet et l'ionogramme sanguin. .
- ✓ Le dosage s’est fait sur Cobas 6000. L’étude statistique a été effectuée avec le logiciel SPSS20.
- ✓ La relation entre l'acide urique et la glycémie a été évaluée par régression linéaire.

IV. Discussion et Conclusion

Une hyperuricémie a été retrouvée chez **61,29 %** des patients. L'analyse de régression linéaire entre l'acide urique et la glycémie a montré une **faible corrélation ($R^2 = 0,0516$)**, suggérant l'absence d'une relation linéaire importante entre ces deux paramètres dans notre population.

L'hyperuricémie est fréquente chez les patients atteints de diabète de type 2. En revanche, sa relation avec la glycémie apparaît faible, ce qui suggère que l'élévation de l'acide urique dépend d'autres facteurs métaboliques ou rénaux. Le dosage de l'acide urique demeure néanmoins pertinent dans l'évaluation globale du risque cardio-métabolique chez les patients diabétiques.

III. Résultats

