



Congrès International de Biologie Médicale Sétif
« La biologie médicale au cœur de l'interdisciplinarité »
14, 15 novembre 2025

Le rôle des biomarqueurs de l'obésité dans la prévention en santé au travail : cas des postes sédentaires

**S. ALOUANI (1), S. BENAICHA (2), S. ABBASSENE (1),
M. HAMADOUCHE (1).**

(1) Université Ferhat Abbes Sétif 1
(2) Université Mostafa Benboulaïd Batna 2



Résumé:

Introduction La sédentarité professionnelle constitue un facteur de risque majeur et croissant dans les environnements de travail. L'identification de biomarqueurs biologiques plus sensibles et spécifiques représente donc un enjeu prioritaire pour la médecine du travail.

Objectif : Déterminer les biomarqueurs biologiques de l'obésité pour la surveillance médicale des travailleurs occupant des postes sédentaires.

Conclusion: En médecine du travail, ces biomarqueurs pourraient aider à l'évaluation de la décision d'aptitude médicale, notamment pour les postes sédentaires.

Introduction:

La sédentarité professionnelle constitue un facteur de risque majeur et croissant dans les environnements de travail. Les travailleurs occupant des postes sédentaires sont exposés à un risque accru d'obésité, de syndrome métabolique et de pathologies cardiovasculaires, impactant directement leur capacité de travail et leur aptitude médicale. Si l'indice de masse corporelle reste l'indicateur le plus utilisé, il présente des limites reconnues dans la détection précoce des complications métaboliques liées à l'obésité au travail. L'identification de biomarqueurs biologiques plus sensibles et spécifiques représente donc un enjeu prioritaire pour la médecine du travail.



Résultats:

Plusieurs biomarqueurs se distinguent par leur pertinence en milieu professionnel sédentaire. Les biomarqueurs métaboliques : glycémie à jeun, HbA1c, insulínémie, bilan lipidique (TG, HDL, LDL) permettent une détection précoce de l'insulinorésistance avant l'apparition du diabète clinique.

Les biomarqueurs adipokines : leptine, adiponectine et leur ratio reflètent le dysfonctionnement du tissu adipeux viscéral, plus prédictif que l'IMC seul.

Les biomarqueurs inflammatoires : CRP ultrasensible, IL-6, TNF- α traduisent l'inflammation systémique de bas grade caractéristique de l'obésité abdominale.

Les biomarqueurs hépatiques : ALAT, GGT, score de stéatose signalent précocement la stéatohépatite non alcoolique fréquente chez les travailleurs sédentaires.

L'association IMC + tour de taille + CRP us + adiponectine présente la meilleure valeur prédictive pour identifier les travailleurs à risque élevé de décompensation métabolique.

Discussion:

Les biomarqueurs identifiés (métaboliques, adipokines, inflammatoires, hépatiques) offrent une évaluation précoce du risque cardiométabolique que l'IMC seul, notamment via l'association IMC + tour de taille + CRP us + adiponectine, combinaison simple et peu coûteuse adaptée à la médecine du travail. Leur intégration dans la surveillance périodique pourrait objectiver des situations à risque avant l'apparition de complications. Des études prospectives restent toutefois nécessaires pour valider ces biomarqueurs en pratique..

Méthode:

C'est une revue de la littérature portant sur les biomarqueurs biologiques de l'obésité évalués en milieu professionnel sédentaire.

Conclusion:

L'intégration de ces biomarqueurs biologiques dans la surveillance médicale des travailleurs sédentaires permet une prévention primaire plus précoce et plus objective que la seule évaluation clinique. En médecine du travail, ces biomarqueurs pourraient aider à l'évaluation de la décision d'aptitude médicale, notamment pour les postes sédentaires.

