

B50 Le visage caché du syndrome métabolique chez les hommes diabétiques de type 2




S. KENDRI^{1,2}, A. AMARA KORBA², W.ABBACI², F. DJABI^{1,2}
1.Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas, Sétif-1-
2.Laboratoire central, CHU de Sétif



INTRODUCTION:

Le syndrome métabolique (SM) aggrave le risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2 (DT2). Identifier les facteurs qui lui sont associés permet de comprendre les mécanismes biologiques et environnementaux qui favorisent son apparition, d'identifier les populations à risque et de développer des stratégies de prévention ciblées. Cette étude analytique explore les déterminants du SM chez les hommes avec DT2.

MATERIELS ET METHODES:



RÉSULTATS:




Tableau 1: Prévalence du SM par sous groupes et par composantes

	Consensus IDF/AHA/NHLBI	IC 95%	p-value
Tranches d'âge			
30-39 ans (n=7)	5 (71,4%)	[35,9% – 91,8%]	p < 0,001
40-49 ans (n=14)	5 (35,7%)	[16,3% – 61,2%]	
50-59 ans (n=28)	23 (82,1%)	[64,4% – 92,1%]	
60-69 ans (n=59)	55 (93,2%)	[83,8% – 97,3%]	
70 et plus (n=32)	28 (87,5%)	[71,9% – 95,0%]	
État trophique			
Normal (n=26)	15 (57,7%)	[38,9% – 74,5%]	p < 0,001
Excès pondéral (n=75)	64 (85,3%)	[75,6% – 91,6%]	
Obésité (n=39)	37 (94,9%)	[83,1% – 98,6%]	
Paramètres cliniques et biologiques			
PA élevée (n=106)	98 (92,5%)	[85,9% – 96,1%]	p < 0,001
HDL-c bas (n=88)	86 (97,7%)	[92,1% – 99,4%]	p < 0,001
TG élevés (n=50)	49 (98,0%)	[89,5% – 99,7%]	p < 0,001
TT ≥94 cm (n=100)	92 (92,0%)	[85,1% – 95,9%]	p < 0,001

DISCUSSION:

Dans notre cohorte, la forte prévalence du SM suggère un impact cardiométabolique marqué.

La prévalence maximale du SM observée dans le groupe d'âge de 60 à 69 ans suggère une association positive entre l'avancée en âge et le risque métabolique.

L'élévation des TG, constitue le déterminant le plus fortement associé au SM. Ce résultat s'explique par le rôle central des TG dans la résistance à l'insuline et les perturbations métaboliques sous-jacentes

CONCLUSION:

Plusieurs facteurs sont significativement associés au SM chez les hommes DT2. Leur identification constitue un enjeu majeur permettant de cibler les individus à risque afin de mettre en œuvre des stratégies de prévention personnalisées et, par conséquent, de réduire l'impact global du SM sur la santé publique.

RÉFÉRENCES :

1. Swarup, S., Ahmed, I., Grigorova, Y., & Zeltser, R. (2024). Metabolic syndrome. In StatPearls. StatPearls Publishing
2. Boccardi, V., & Sinclair, A. J. (2026). Rethinking insulin resistance in aging: A reserve-oriented clinical framework. Ageing research reviews, 119, 103180.
3. Alcover, S., Ramos-Regalado, L., Girón, G., Muñoz-García, N., & Vilahur, G. (2025). HDL-Cholesterol and Triglycerides Dynamics: Essential Players in Metabolic Syndrome. Antioxidants, 14(4), 434