

Brucellose en Algérie : analyse comparative à l'interface homme-animal

Auteurs: DAMENE Hanane^{1*}, KADJA¹ Louiza, BOUKERT Razika²

1. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et l'Univers, Sciences vétérinaires, université de 8 Mai Guelma.
2. Institut des Sciences Vétérinaires, Université de Blida-1.

*Auteur correspondant : damenehanane@gmail.com

Poster N°:
M10

INTRODUCTION

La brucellose représente un enjeu majeur de la santé publique et animale. Chez l'homme, elle affecte plus de **500 000** personnes/ an dans le monde et **7 000** cas/ an en Algérie, le pays se classe au 10^{ème} rang mondial en termes d'incidence. *B. melitensis* (caprins et ovins) constitué l'espèce la plus incriminée dans l'infection humaine à l'échelle mondiale, en particulier au sein du bassin méditerranéen. La présente étude vise à estimer les tendances épidémiologiques spatio-temporelles de la brucellose humaine en Algérie et de les comparer aux données publiées concernant la brucellose animale.




Figure 1. Résumé sur les principales voies de transmission de la brucellose chez l'homme.

MATÉRIEL & MÉTHODES

Une étude rétrospective et comparative sur la brucellose humaine et animale basée sur la collecte des données à partir :

Des relevés épidémiologiques mensuels publiés par (2015-2024) :

Des articles publiés dans deux bases des données:

INSP
Institut national
du Santé public

Google
scholar

PubMed®

TI = Somme des cas de 10 ans/ Somme personnes à risque de 10 ans (nombre d'habitants dans la wilaya dans l'année - (nombre de cas dans l'année n/2).

RÉSULTATS & DISCUSSION

Au total de 95392 cas (21,80 cas/ 10⁵ hab) de brucellose humaine ont été enregistré en Algérie durant la période d'étude.




Figure 2. Évolution de l'incidence de la brucellose humaine en Algérie de 2015 au 2024 (pour 10⁵ habitants).

D'après l'illustration ci-dessus, on remarque qu'au sein d'un intervalle de dix ans, l'incidence de la brucellose humaine a connue un pic en 2020 atteignant 13151 cas (**29,68 cas/ 10⁵ hab**).

CONCLUSION

La brucellose demeure endémique en Algérie, affectant à la fois la santé animale et humaine, avec une répartition géographique hétérogène liée aux plusieurs facteurs. La persistance de cette zoonose nécessite une réévaluation et renforcement des programmes de surveillance de la maladie chez l'animal. Par ailleurs, la sensibilisation des éleveurs et le grand public sur l'importance du respect des normes sanitaires lors de la production et de la consommation des produits d'origine animale.




Figure 3. Carte de répartition du taux d'incidence de la brucellose humaine et de prévalence de la brucellose caprine par wilaya en Algérie.

Les taux les plus élevés se concentrent dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Nord-centre du pays. À l'inverse, la bande côtière du Nord et grandes wilayas de sud, présente une incidence faible.

La comparaison des données par wilaya montre que l'évolution des cas humains rapportés est similaire à celle observée chez les caprins (Fig. 3).

Nos résultats ont révélé que le taux d'incidence de brucellose en Algérie est élevé par rapport aux pays limitrophes comme la Tunisie (3,9/105hab), (Khamassi et al, 2017), le Maroc (3,3 105hab) (Ducrotoy et al, 2015).

La distribution spatiale de la brucellose humaine en Algérie reflète probablement la vocation pastorale de ces régions, où l'élevage extensif de petits ruminants (notamment caprin) constitue une activité économique majeure, favorisant le contact étroit entre l'homme et les réservoirs animaux de *Brucella spp*. La concordance entre le taux d'infection de l'homme et les caprins suggère la transmission zoonotique. Plus de 89 % des personnes contractent la brucellose par consommation du lait cru ou ses dérivés, et 10 %, des cas sont d'origine professionnelle (Aggad et al, 2006).