

1^{er} congrès international de Biologie médicale de Sétif -CBMS 2026

Épidémiologie de l'hépatite B à Tiaret : analyse des tendances et des facteurs associés

Souad Aiche; Fadhéla Smail; Mira Chikhaoui


01 Introduction

L'hépatite B représente un important problème de santé publique en raison de sa fréquence et de ses conséquences à long terme. L'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) peut évoluer vers une forme chronique et entraîner des complications graves, notamment la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire (Behzadi et al., 2019; Mauss et al., 2020). En Algérie, l'hépatite B demeure une infection préoccupante, avec une fréquence variable selon les régions malgré l'introduction de la vaccination en 2003 (Bensalem et al., 2017; Boumansour et al., 2016). Cette variabilité régionale souligne l'intérêt des études épidémiologiques locales pour mieux apprécier l'ampleur de l'infection et identifier les populations les plus concernées.

02 Matériel et Méthodes

Dans le cadre de notre étude expérimentale, nous avons analysé les données issues de deux volets complémentaires. Le premier correspond à une étude rétrospective portant sur un effectif de **49 450 personnes**. Le second concerne une enquête menée auprès de **44 patients** infectés par le virus de l'hépatite B (VHB), dont les données ont été recueillies et analysées afin de caractériser leur profil sociodémographique et clinique.

Sexe	Valeur	Titrage de HBsAg (UI)
Féminin	Moyenne	5,295
	ET	2,587
	Max	9,187
	Min	1,448
Masculin	Moyenne	5,372
	ET	2,116
	Max	7,957
	Min	1,676
Moyenne générale		5,337



05 Conclusion

L'hépatite B présente une fréquence de **0,17 %** dans la région de Tiaret entre 2020 et 2022, avec une prédominance masculine. Les principaux modes de transmission identifiés étaient les rapports sexuels (27,27 %) et la Hijama (20,45 %). Ces résultats soulignent l'importance de renforcer la prévention, la sensibilisation et le dépistage, notamment vis-à-vis des principaux facteurs de transmission.

02 Objectifs

Cette étude vise à:

- Évaluer la prévalence de l'hépatite B dans la région de Tiaret.
- Déterminer les caractéristiques sociodémographiques et cliniques des personnes infectées par le virus de l'hépatite B (VHB).
- Décrire le profil des personnes touchées par cette infection dans la région étudiée.



04 Résultats

Unités hospitalières	Nombre des sujets atteints de l'hépatite B		
	Homme	Femme	Total
2 EPSP de Tiaret	18	9	27/10638
Maternité, complexe mère et enfants de Tiaret	0	2	2 /6257
Banque du sang	6	0	6/13351
Services gastro- entérologue	7	4	11/14260
02 Laboratoires privés	21	17	38/ 4944
Total	52 (61,90%)	32 (38,09%)	84/ 49450 (0,17%)