

1^{er} congrès international de Biologie médicale de Sétif -CBMS 2026

Étude Épidémiologique et Clinique sur la Syphilis au Niveau de la Région de Tiaret

Souad Aiche; Mira Chikhaoui; Fadhéla Smail

01 Introduction

La syphilis est une infection sexuellement transmissible causée par la bactérie *Treponema pallidum*. Elle connaît actuellement une résurgence mondiale préoccupante, avec près de six millions de nouveaux cas estimés chaque année (Aho et al., 2022). Transmise principalement par voie sexuelle ou de la mère à l'enfant, elle peut engendrer de graves complications cliniques si elle n'est pas prise en charge (Benhaddou-Mihoubi et al., 2021). En Algérie, cette infection continue de représenter un problème persistant de santé publique. C'est dans ce contexte épidémiologique que notre étude vise à déterminer la prévalence de la syphilis dans la région de Tiaret, afin de mieux évaluer la situation locale.

02 Objectifs

- Évaluer la prévalence de la syphilis dans la région de Tiaret;
- Décrire le profil des patients touchés;
- Identifier les tests diagnostiques utilisés.




02 Matériel et Méthodes

Nous avons mené une étude descriptive, rétrospective et transversale dans la région de Tiaret à partir des données recueillies entre 2019 et 2021 auprès de plusieurs structures hospitalières et de la DSP. Cette démarche a été complétée par une immersion de cinq mois (janvier–mai 2022) consacrée à l'analyse des différentes techniques de diagnostic de la syphilis utilisées dans ces établissements.



04 Résultats et discussion

Différentes techniques de diagnostic utilisées pour la détection de la syphilis



05 Conclusion

La syphilis connaît une recrudescence mondiale malgré l'efficacité de la pénicilline. Dans la région de Tiaret (2019–2021), sa prévalence était de 0,29 %, avec une prédominance féminine (59,46 %), notamment chez les femmes enceintes. Les cas concernaient principalement les adultes de 20 à 44 ans, sans co-infection VIH. La pénicilline G benzathine demeure le traitement de référence. Un renforcement du dépistage, de la surveillance épidémiologique et des actions de prévention est recommandé.

Cette étude vise à:

Structures Hospitalières		EPSP de Tiaret	EPH de Tiaret (Banque du sang)	EHS (Maternité)	EPSP de Ksar Challala	EPH de Ksar Challala	Taux Total
Prévalence Totale de la syphilis		35 (5275)	22 (12176)	11 (9145)	14 (2034)	14 (4092)	96 (32722) 0,29%
Prévalence de syphilis pendant chaque année	Année 2019	8 (1129)	13 (5026)	5 (2970)	8 (708)	2 (787)	36 (10620) 0,33%
	Année 2020	18 (2408)	4 (2276)	2 (2709)	2 (530)	1 (1518)	27 (9441) 0,28%
	Année 2021	9 (1738)	5 (4874)	4 (3466)	4 (796)	11 (1787)	33 (126561) 0,26%

Structures Hospitalières		EPSP de Tiaret	EPH de Tiaret (Banque du sang)	EHS (Maternité)	EPSP de Ksar Challala	EPH de Ksar Challala	Taux Total
Sexe	Masculin	11	/	/	9	10	30 (74) 40,54%
	Féminin	24	/	11	5	4	44 (74) 59,46%
Diagnostic	BW	/	/	9145	1240	2472	12857 (32722) 39,29%
	TPHA	5275	12176	/	/	1567	19018 (32722) 58,12%
	Non identifié	/	/	/	794	53	53 (32722) 2,59%