

Profil Epidémiologique Des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) Dans La Wilaya De Bejaia, 2010 - 2024



A BOUMAZA^{1,3} ; H HAMIDJ^{2,3} ; D HALLAL^{1,3} ; NH BOUKERDOUS^{1,3} ;
Y BENLATRECHE^{1,3} ; L CHAABANE¹ ; H BOUKHERIS^{1,3}



(1)Service d'épidémiologie et Médecine Préventive, CHU de Bejaia.
(2)Service des maladies infectieuses et tropicales
(3)Université Abderrahmane Mira de Bejaia, Faculté de Médecine.

Introduction

Les infections sexuellement transmissibles continuent de poser d'importantes problèmes de santé publique, causant 2,5millions de décès chaque année selon le dernier rapport de l'OMS 2024.plus d'un million de nouveaux cas d'IST curables sont recensés chaque jour dans le monde. Les jeunes adultes et les adolescents présentent les taux d'incidence les plus élevés. Le système de santé en Algérie, bien que classé quatrième en Afrique, n'a pu échapper à une augmentation des IST. En Algérie la prévalence du VIH/sida (principale IST faisant l'objet de données nationales consolidées en absence du registre exhaustif centralisant en temps réel la prévalence de l'ensemble des autres IST)reste estimée à **moins de 0,1%** de la population générale. Ce qui caractérise une épidémie de type concentré.

Objectifs

En raison de la gravité des IST et afin de contribuer à une meilleure compréhension de la situation épidémiologique de ce type de maladies, nous présentons dans ce travail un aperçu général des caractéristiques épidémiologiques des IST dans la wilaya de Bejaia.

Matériels et Méthodes

Il s'agit d'une étude épidémiologique descriptive rétrospective réalisée sur une période de 15 ans (1^{er} janvier 2010 au 31 Décembre 2024), menée sur tous les patients résidents dans la wilaya de Bejaia et diagnostiqués avec une infection sexuellement transmissible. Les données ont été extraites du registre des IST de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Bejaia ; la saisie et l'analyse des données étaient réalisées à l'aide d'un logiciel SPSS version 26.

Résultats et discussion

FIGURE1 :répartition des IST selon le sexe, wilaya de Bejaia;2010-2024




FIGURE 3: Répartition des IST Selon la type d'infection, wilaya de Bejaia;2010-2024




FIGURE 5: Répartition des IST Selon les circonstances de découverte, wilaya de Bejaia;2010-2024





FIGURE4:Données d'incidence des IST par année, wilaya de Bejaia;2010-2024



Répartition des IST selon l'hospitalisation, wilaya de Bejaia;2010-2024






FIGURE 2:Répartition des IST Selon la tranche d'âge, wilaya de Bejaia;2010-2024



Répartition des IST selon la commune de résidence ,wilaya de Bejaia;2010-2024



L'âge moyen au diagnostic était 41,7±15,3ans.Les IST les plus répandues dans notre étude étaient respectivement les hépatites virales B (60%), syphilis (23%) et le VIH chez presque 17% des malades. Les données de notre étude montre une incidence en hausse des IST dans la wilaya de Bejaia une nette augmentation été enregistré durant les années 2014,2015 et 2016 expliqué par l'installation du centre du référence du VIH au sein du CHU de Bejaia, puis on remarque une baisse de l'incidence des IST durant les années 2020,2021 en rapport avec la pandémie covid 19. (augmentation de +7% depuis l'année 2010 à 2024).

Dans 92% des cas de notre étude les IST étaient de découverte fortuite, et ont provoqués l'hospitalisation chez 13% des infectés. Par ordre de fréquence les communes où on a enregistré le plus grand nombre des IST étaient la commune de Bejaia (29%),suivi d'akbou(14%) puis seddouk , tazmalt et souk eletnine.

Conclusion

La prévention demeure l'action la plus objective pour inhiber la croissance des taux des IST. les stratégies mondiales du secteur de la santé contre le VIH ,l'hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles 2022-2030 ont été adoptées par l'assemblée mondiale de la santé en 2022.en Algérie bien que le système de santé soit structuré pour encadrer ces pathologies(programmes nationaux de riposte, centres de références),les tabous socio-culturels freinent encore le dépistage systématique et précoce. A cet effet , il devient d'ordre d'urgence de renforcer l'accent mis sur la prévention primaire et la sensibilisation sur le mode de transmission de ces infections, afin d'atteindre les cibles des objectifs de développement durable (ODD) liées à la santé d'ici 2030.

Références

- revue générale des infections sexuellement transmissibles,division of infectious diseases,university of alabama.
- Les IST bactériennes en 2023,VIH.org.
- ONUSIDA Algérie.