




ECTOPARASITOSEs DIAGNOSTIQUÉEs AU CHU DE CONSTANTINE

BELATTAR Nedjda, BELMILI T, HOUT O.R, MERRADJI A.
Laboratoire de parasitologie et de mycologie CHU de Constantine¹.



Introduction

Les ectoparasitoses regroupent un ensemble d'infestations parasitaires causées par des arthropodes vivant à la surface du corps de leurs hôtes.

Elles sont largement répandues à travers le monde et constituent un motif fréquent de consultation, exposant ainsi les professionnels de santé à divers difficultés diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques.

Malgré leur importance en santé publique, les données disponibles en Algérie restent limitées, les études publiées étant peu nombreuse et portant principalement sur des cas cliniques sporadiques, en dehors de la pédiculose.

Cette étude a pour objectif de décrire le profil épidémiologique des patients atteints d'ectoparasitoses et de répertorier les agents incriminés et leurs fréquences. .

Matériel et méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive, menée au laboratoire de parasitologie-mycologie sur une période allant de janvier **2015** à décembre **2025** et ayant concerné **532** prélèvements effectués chez des individus de tous âge et des deux sexes. Les patients étaient adressés au laboratoire par un dermatologue, un médecin généraliste ou consultaient sur place.

Les données ont été recueillies des registres d'activité du laboratoire. Les renseignements cliniques étaient toutefois souvent incomplets ou absents.

Le diagnostic a été établi par des examens macroscopiques et microscopiques, selon le type d'ectoparasitose suspectée. Le raclage cutané était réalisé notamment en cas de gale ou de démodicé, et l'inspection visuelle des zones atteintes avec confirmation microscopique en cas des pédiculoses.

L'identification parasitologique des espèces isolées s'est basée sur la mise en évidence d'un ou plusieurs parasites sous diverses formes: adultes, larves, œufs ou lentes et parfois leurs scybales en cas de scabiose.

Résultats




Fig N°1 : Pourcentage des résultats obtenus




Fig N° 2: Répartition des résultats positifs selon les années




Fig N° 3: Répartition des ectoparasitoses en fonction du sexe




Fig N° 4: Distribution des cas positifs par tranche d'âge




Fig N°5 : Répartition des cas positifs en fonction de l'ectoparasitose diagnostiquée

ECTOPARASITOSE	ECTOPARASITE	NOMBRE	POURCENTAGE
Gale	<i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>hominis</i>	21	24.71%
Pédiculose du cuir chevelu	<i>Pediculus humanus capitis</i>	56	65.88%
Pédiculose corporelle	<i>Pediculus humanus corporis</i>	00	00
Phthirase	<i>Phthirus pubis</i>	5	5.88%
Démodicé	<i>Demodex</i> sp	3	3.53%

Tableau N°1: Répartition des espèces des ectoparasites diagnostiqués

Discussion

Les données relatives aux ectoparasitoses en Algérie restent limitées, en raison du faible nombre d'études publiées sur ce sujet.

- La prévalence des ectoparasitoses déterminée (**15.98%**) est légèrement supérieure à celle obtenue au CHU Mustapha pacha-Alger par Benkhrouf et al.(2012), qui était de de 11%. Cette faible prévalence pourrait s'expliquer, en partie, par la tendance de certains cliniciens à instaurer un traitement d'emblée sans confirmation étiologique par un diagnostic biologique, notamment en cas de gale et de pédiculose. En revanche, pour les ectoparasitoses moins fréquemment rencontrées, le médecin pouvant privilégier d'autres étiologies.
- La répartition annuelle des cas d'ectoparasitoses montre que la fréquence la plus élevée a été enregistrée en **2024** avec **26** cas. Cette augmentation pourrait traduire une recrudescence des cas au cours de cette année, après une période de faible fréquence observée entre **2020 et 2022** . Cette diminution pourrait être liée, entre autres, aux mesures sanitaires mise en place durant la pandémie de COVID-19, ayant potentiellement réduit les contacts interpersonnels et par conséquent la transmission de certaines ectoparasitoses.
- Les ectoparasitoses concernaient les deux sexes, avec une prédominance féminine (**72.9%**) et un sexe ratio (F/H) de **2.6**. Cette prédominance pourrait être liée à une plus grande tendance des femmes à consulter pour des affections cutanées ou des atteintes des phanères. Des facteurs socioculturels ou comportementaux pourraient également contribuer à cette différence. Ces résultats soulignent l'importance de sensibiliser l'ensemble de la population, indépendamment sexe. Des résultats similaires ont été notés dans une étude réalisée en France par L. de Gentile et al. (2021)
- Toutes les tranches d'âges étaient représentées, avec un âge moyen de **12 ans** et des extrêmes allant de **03 mois à 70 ans**. La tranche d'âge la plus touchée était celle de **[0-10] ans**, principalement en cas de pédiculose du cuir chevelu. Cette observation est en concordance avec les résultats de Koutou et al. (2015) .

La pédiculose constituait l'ectoparasitose plus fréquemment rencontrée (**66%**). Il s'agissait exclusivement de pédiculose du cuir chevelu, due à ***Pediculus humanus capitis***; suivie par la gale à ***Sarcoptes scabiei*** (**24.71%**) puis par la phthirase à ***Phthirus pubis*** (**5.88%**) et la démodicé à ***Demodex sp*** (**3,53%**).

Pediculus humanus capitis est l'ectoparasite le plus souvent identifié (**65,88%**), résultat concordant avec ceux rapportés par Koutou et al. (2015) et Hamzi et al. (2016).

Conclusion

Cette étude met en évidence la diversité des ectoparasitoses diagnostiquées au laboratoire et souligne le manque de données disponibles en Algérie. Des études complémentaires sont nécessaires pour mieux caractériser leur situation.

Le recours au diagnostic biologique permet une confirmation étiologique et contribue à une prise en charge thérapeutique et prophylactique adaptée.

Références bibliographiques

- [1] Ectoparasitosis - PAHO/WHO | Pan American Health Organization [Internet]. [cité 2 juill 2025]. Disponible sur: <https://www.paho.org/en/topics/ectoparasitosis>
- [2] HAROUNA M, et al. PRÉVALENCE ET FACTEURS ASSOCIÉS À LA GALE EN MILIEU CARCÉRAL À DOSSO, NIGER. Médecine Trop Santé Int. 6 juill 2023;3(3):mtsi.v3i3.2023.398.
- [3] Scabiose, pédiculoses et piqûres d'arthropodes. J Pédiatrie Puériculture. 1 août 2021;34(4):204 22.
- [4] Chabasse D, Guiguen C. Ectoparasitoses courantes en France, apport du laboratoire. Rev Francoph Lab. 1 sept 2017;2017(495):25 37.
- [5] Hamzi Samia HS. pédiculose de cuir chevelu en milieu scolaire. 2016;
- [6] koutou et Al. Health sciences and disease . Pédiculose en Milieu Scolaire Camerounais: Prévalence et Facteurs Associés. 2015
- [7] Z.Benmansour MM. etude prospective de la pédiculose en milieu scolaire. 08mai2014;