



2026-2학기 도시교통통계학

# 4강. 상관관계

---

2026. 9. 23.

# 지난 강의 요약

---

- 자연현상의 상당 수는 평균을 중심으로 좌우 대칭인 종모양의 정규분포를 따른다.
- 정규분포는 평균과 표준편차에 따라 그 모양과 크기가 달라진다.
- 특정 현상이 정규분포를 따른다면 그 현상의 평균과 표준편차만으로 해당 현상의 발생빈도를 완벽하게 묘사할 수 있다.
- 정규분포 중에서 평균이 0이고 표준편차가 1인 정규분포를 표준정규분포라 한다.
- 어떤 자료에서 평균을 빼고 표준편차로 나눈 것을 자료의 표준화라고 하며, 정규분포를 따르는 자료를 표준화한 값은 표준정규분포를 따른다.

## 지난 강의 요약

---

- 정규분포를 따르는 자료는 평균을 중심으로  $\pm 1$ 표준편차 이내에 약 68%가,  $\pm 2$ 표준편차 이내에 약 95%가 포함된다.
- 특정 자료가 정규분포와 유사한 분포를 따를 경우 이 분포를 정규분포로 간주하고, 정규분포표를 사용하여 특정 구간 내에 속한 자료의 비중을 계산할 수 있으며 이를 정규분포로의 근사라 한다.
- 만약 특정 자료가 정규분포를 따르지 않을 경우 평균과 표준편차만으로 이 자료의 분포를 명확히 묘사할 수 없으며, 이 경우 자료를 100개의 균등한 영역으로 나눈 지점의 값인 분위수를 사용하는 것이 도움이 된다.
- 분위수를 활용하여 자료의 분포를 나타내는 대표적인 방식으로는 상자그림이 있다.
- 히스토그램이 서로 다른 자료의 분포를 비교하기 어려운 반면, 상자그림은 서로 다른 자료 간 분포를 비교하기 용이하다.

---



# 자료의 요약: 두 개의 변수

결합분포와 산포도 · 공분산 · 상관계수

# 결합분포와 산포도

결합분포(joint distribution): 하나의 변수에 대한 분포가 아니라 두 변수 사이의 상호관계를 고려한 분포

→ 산포도(scatter plot): 두 변수의 결합분포를 나타내기 위해 한 변수를 x축에, 다른 변수를 y축에 표시하여 점으로 나타낸 것




산포도에서 우리가 알 수 있는 값

- x의 평균과 표준편차
- y의 평균과 표준편차

→ x와 y는 평균과 표준편차를 통해 각각 요약 가능

→ 이것만으로 충분할까?

## 결합분포와 산포도



(a), (b) 모두  $x$ ,  $y$ 의 평균과 표준편차는 동일, 하지만  $x$ ,  $y$ 의 결합분포 특성은 다름

→ (a)와 (b)의 차이를 반영할 수 있도록  $x$ 와  $y$ 의 결합분포는 어떻게 요약할까?

# 공분산

## 두 변수의 선형관계를 나타내는 통계량

$$ax+by=c$$

$$Cov_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n - 1)}$$

표본 공분산의 자유도는  $n-1$   
( $\because \bar{x}, \bar{y}$ 가 주어져 있을 때  $\bar{y}$ 를 알더라도  $\bar{x}$ 를 구하기 위해서는  $n-1$ 개의 표본이 필요하므로)

- **공분산(Covariance)**: 하나의 변수에 대한 편차곱의 평균, 즉 분산(variance)를 두 변수에 대한 편차곱의 평균으로 바꾼 것
  - 공분산이 (+)이면 양의 관계, (-)이면 음의 관계
- **공분산의 한계**: 서로 다른 관계들의 강도를 상호 비교하기 어려움
  1. 측정단위를 그대로 지님: x가 키(cm)이고 y가 몸무게(kg)일 경우 공분산은 cm\*kg이라는 단위를 지님
  2. 값의 한계가 없음: 측정단위에 따라서 값이 크게 변하며 한계가 없음
  - 해결방법: 공분산을 두 변수의 표준편차로 나누어 표준단위로 변환하자!

# 상관계수

두 변수 간 선형관계의 방향과 강도를 측정단위와 무관하게  $-1 \sim +1$ 의 값으로 나타내는 통계량

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)} \cdot \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 / (n - 1)}} = \frac{Cov_{xy}}{SD_x \cdot SD_y}$$

- 상관계수의 범위:  $-1 \leq r \leq +1$


(1 또는 -1: 완전한 양의 상관 또는 음의 상관)

→ 모든 점들이 하나의 선 위에 위치

- 상관계수의 의미

두 변수의 결합분포가 하나의 선 주위로 밀집된 정도

= x의 1표준편차 변화에 대해 평균적으로 나타나는 y의 표준  
편차 단위 변화량



주: 각각의 산포도는 가로, 세로 모두 평균 3, 표준편차 1의 동일한 값을 갖는다. 각각의 산포도에는 50개씩의 점이 찍혀 있다.

# 상관계수의 부호


- 양의 상관관계: x가 커질 때 y도 함께 커지는 경향

→ 산포도가 오른쪽 위로 향한다

- 음의 상관관계: x가 커질 때 y는 작아지는 경향

→ 산포도가 오른쪽 아래로 향한다

→ 다음으로 넘기면 아래 산포도의 점들이 같은 자리에서 부호만 바뀐 위치로 이동한다



$r = +0.75$  (양의 상관관계)

# 상관계수의 부호


- 양의 상관관계: x가 커질 때 y도 함께 커지는 경향

→ 산포도가 오른쪽 위로 향한다

- 음의 상관관계: x가 커질 때 y는 작아지는 경향

→ 산포도가 오른쪽 아래로 향한다

→ 다음으로 넘기면 아래 산포도의 점들이 같은 자리에서 부호만 바뀐 위치로 이동한다




$r = -0.75$  (음의 상관관계)

# 상관계수의 한계

상관관계는 두 변수의 선형관계의 방향과 강도를 측정하므로 다음의 두 상황에서 올바른 통계량이 될 수 없다.


1. 특이한 값, 즉 이상치(outlier)가 존재할 때 → 이 값이 선형관계의 특성을 크게 왜곡시킴
2. 두 변수 간의 관계가 비선형일 때 → 선형관계를 측정하는 상관계수로는 두 변수 간 관계를 요약할 수 없음



# 상관계수의 한계


상관관계는 두 변수의 선형관계의 방향과 강도를 측정하므로 다음의 두 상황에서 올바른 통계량이 될 수 없다.

1. 특이한 값, 즉 이상치(outlier)가 존재할 때 → 이 값이 선형관계의 특성을 크게 왜곡시킴
2. 두 변수 간의 관계가 비선형일 때 → 선형관계를 측정하는 상관계수로는 두 변수 간 관계를 요약할 수 없음



# 상관계수의 유의사항



1. 상관관계(correlation)는 인과관계(causality)가 아님: 혼동요인(confounding factor)과 역(reverse)인과관계 때문
2. 평균이나 비율의 상관관계는 주의: 평균이나 비율은 이미 편차를 감소시키기 때문



건강상태와 운동량의 관계

# 상관계수의 유의사항

1. 상관관계(correlation)는 인과관계(causality)가 아님: 혼동요인(confounding factor)과 역(reverse)인과관계 때문
2. 평균이나 비율의 상관관계는 주의: 평균이나 비율은 이미 편차를 감소시키기 때문



## 연습문제) 상관계수 구하기

---

Q) 두 변수 (X, Y)에 대한 자료가  $(-1, 1)$ ,  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$ 로 주어져 있다고 하자. X, Y 간의 상관계수는 얼마인가?

류근관, 5장 연습문제 3번


# 연습문제) 상관계수 구하기

Q) 두 변수 (X, Y)에 대한 자료가 (-1, 1), (0,0), (1,1)로 주어져 있다고 하자. X, Y 간의 상관계수는 얼마인가?

류근관, 5장 연습문제 3번

$$r = \frac{\frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}}{\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \cdot \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}} = \frac{Cov_{xy}}{SD_x \cdot SD_y}$$

- X의 평균: 0
- Y의 평균: 2/3
- X, Y의 공분산:  $(-1-0)*(1-2/3)+(0-0)*(0-2/3)+(1-0)*(1-2/3)$   
= 0



# 평균, 분산, 표준편차의 중요성

우리가 분석하는 많은 지표나 분석법 등은 평균(중심경향성)과 표준편차(분산도)를 활용하거나 이를 변형한 것

$$r = \frac{\frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}}{\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \cdot \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}} = \frac{Cov_{xy}}{SD_x \cdot SD_y} \quad Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

$$\beta_1 = r * \frac{SD_y}{SD_x}$$

$$I = \frac{\frac{\sum_i^n \sum_j^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\left(\sum_i^n \sum_j^n w_{ij}\right)}}{\frac{\sum_i^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \frac{n \sum_i^n \sum_j^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\left(\sum_i^n \sum_j^n w_{ij}\right) \sum_i^n (x_i - \bar{x})^2}$$

## 오늘 강의 요약

---

- 하나의 변수에 대한 분포가 아니라 두 변수 사이의 상호관계를 고려한 분포를 **결합분포**라고 하며, 두 변수의 결합분포를 나타내기 위해 한 변수를 x축에, 다른 변수를 y축에 표시하여 점으로 나타낸 것을 **산포도(scatter plot)**이라고 한다.
- 평균과 분산이 동일한 두 변수가 존재하더라도 두 변수 간의 관계는 서로 다를 수 있다.
- 두 변수 간의 관계를 요약한 대표적인 수치는 두 변수 간 선형관계를 나타내는 **공분산(covariance)**이다.
- 공분산은 자료의 단위에 의존하기 때문에, 서로 다른 선형관계 간의 비교가 어렵다.
- 공분산의 단위를 제거하기 위해 두 변수 간 공분산을 각 변수의 표준편차로 나누어  $-1 \sim 1$ 사이의 값을 갖도록 조정한 통계량을 **상관계수**라 한다.

# 오늘 강의 요약

---

- 두 변수 간 관계가 음(-)의 상관관계를 가질 경우 -1에 가까운 값을, 정(+)의 상관관계를 가질 경우 +1에 가까운 값이 나타나며, 두 변수 간 선형관계가 존재하지 않을 경우 0에 가까운 값이 나타난다.
- 상관계수는 두 변수 간 선형관계만을 수치화하기 때문에 **비선형 관계는 나타낼 수 없다**.
- 상관계수는 **이상치에 민감하다**.
- 평균이나 비율로 계산한 상관계수는 이미 변수의 편차가 소거된 상태이기 때문에, 실제 두 변수 간의 선형관계를 왜곡할 여지가 있다.
- 상관관계는 두 변수 간의 선형의 연관성(association)만 나타낼 뿐이며, **인과관계(causality)는 아니다**.

# Q & A

---

권규상 Kyusang Kwon  
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr