موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: الرياضيات — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$

1. احسب u_1 و u_2.
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 6$.
3. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا، ثم استنتج أنها متقاربة.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 6$.
   a. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   b. اكتب u_n بدلالة n، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   c. احسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

التمرين الثاني (05 نقاط)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4 = 0$.
2. في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\,\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B، C التي لاحقاتها: $z_A = \sqrt{3} + i$، $z_B = \sqrt{3} - i$، $z_C = 2i$.
   a. اكتب z_A و z_B على الشكل الأسي.
   b. بيّن أن النقط A، B، C تنتمي إلى دائرة يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.
3. اكتب العدد $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسي، واستنتج طبيعة المثلث ABC.
4. عيّن لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالدوران R الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

tafawoq.site

التمرين الثالث (04 نقاط)

يحتوي كيس على 7 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس: 4 كريات حمراء و 3 كريات خضراء. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد كريتين من الكيس.

1. احسب احتمال الحادثة E: «سحب كريتين من نفس اللون».
2. احسب احتمال الحادثة F: «سحب كرية خضراء على الأقل».
3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات الحمراء المسحوبة.
   a. عيّن قيم المتغير العشوائي X ، ثم عرّف قانون احتماله.
   b. احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$.

التمرين الرابع (07 نقاط)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (2-x)e^x - 2$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\,\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة الأولى بيانيًا.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = (1-x)e^x$ ، ثم ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
3. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$: أحدهما 0 والآخر α حيث $1{,}59 < \alpha < 1{,}6$.
5. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -2$ ، ثم ارسم (T) و (C_f).
6. تحقق أن الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = (3-x)e^x - 2x$ دالة أصلية للدالة f ، ثم احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = 1$.

بالتوفيق

tafawoq.site