


Tarea

21.97. Dos varillas delgadas de longitud L están a lo largo del eje x , una entre $x = \frac{1}{2}a$ y $x = \frac{1}{2}a + L$, y la otra entre $x = -\frac{1}{2}a$ y $x = -\frac{1}{2}a - L$. Cada varilla tiene carga positiva Q distribuida uniformemente en toda su longitud.



- Calcule el campo eléctrico producido por la segunda varilla en puntos a lo largo del eje x positivo.
- Demuestre que la magnitud de la fuerza que ejerce una varilla sobre la otra es:

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 L^2} \ln \left[\frac{(a+L)^2}{a(a+2L)} \right]$$


- Demuestre que si $a \gg L$, la magnitud de esta fuerza se reduce a:

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

Sugerencia: Use la expansión: $\ln(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \dots$, válida para $|z| \ll 1$. Considere todas las expansiones al menos hasta el orden $\frac{L^2}{a^2}$. Interprete este resultado.

Solución:

a)



Los vectores de posición de las cargas son:

$$\vec{r} = x\hat{u}_x$$

$$\vec{r}' = -\left(\frac{a}{2} + x'\right) \hat{u}_x$$

Considerando la distribución homogénea de la carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dx'}$$

El campo eléctrico es:

$$\vec{E} = \int_Q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Reemplazando $dq = \lambda dx'$ y los vectores de posición \vec{r} y \vec{r}' :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \lambda dx' \frac{(x\hat{u}_x + \frac{a}{2}\hat{u}_x + x'\hat{u}_x)}{|x\hat{u}_x + \frac{a}{2}\hat{u}_x + x'\hat{u}_x|^3} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L dx' \frac{(x + \frac{a}{2} + x')}{(x + \frac{a}{2} + x')^3} \hat{u}_x \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx'}{(x + \frac{a}{2} + x')^2} \hat{u}_x \end{aligned}$$

Realizando un cambio de variable para resolver la integral:

$$\begin{aligned} u &= x + \frac{a}{2} + x' \\ du &= dx' \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\int \frac{du}{u^2} = \int u^{-2} du = \frac{u^{-2+1}}{-2+1} = \frac{u^{-1}}{-1} = -\frac{1}{u}$$


Reemplazando en la función original:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{x + \frac{a}{2} + x'} \Big|_0^L \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{x + \frac{a}{2} + L} + \frac{1}{x + \frac{a}{2}} \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x + \frac{a}{2}} - \frac{1}{x + \frac{a}{2} + L} \right) \hat{u}_x \end{aligned}$$

Reemplazando $\lambda = Q/L$:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \left(\frac{2}{2x+a} - \frac{2}{2x+a+2L} \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{2x+a} - \frac{1}{2x+a+2L} \right) \hat{u}_x\end{aligned}$$

b)



La fuerza ejercida por la varilla sobre un diferencial dq en el eje x es:

$$\vec{F} = \int_Q \vec{E} dq = \int_Q \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{2x+a} - \frac{1}{2x+a+2L} \right) dq \hat{u}_x$$

Reemplazando $dq = \lambda dx$:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+L} \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{2x+a} - \frac{1}{2x+a+2L} \right) \lambda dx \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda Q}{L} \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+L} \frac{1}{2x+a} - \frac{1}{2x+a+2L} dx \hat{u}_x\end{aligned}$$

Reemplazando $\lambda = Q/L$:

$$\vec{F} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(\int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+L} \frac{dx}{2x+a} - \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+L} \frac{dx}{2x+a+2L} \right) \hat{u}_x$$

Realizando un cambio de variable para resolver la integral:

$$u = 2x + a$$

$$du = 2 dx$$

Por tanto:

$$\int \frac{1}{2} \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{\ln u}{2}$$

Reemplazando en la función original:

$$\begin{aligned}
 \vec{F} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \frac{1}{2} \left(\ln(2x+a) \Big|_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+L} - \ln(2x+a+2L) \Big|_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}+L} \right) \hat{u}_x \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} (\ln(2(\frac{a}{2}+L)+a) - \ln(2(\frac{a}{2})+a) \\
 &\quad - \ln(2(\frac{a}{2}+L)+a+2L) + \ln(2(\frac{a}{2})+a+2L)) \hat{u}_x \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} (\ln(2a+2L) - \ln(2a) - \ln(2a+4L) + \ln(2a+2L)) \hat{u}_x \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \ln \left(\frac{(2a+2L)(2a+2L)}{2a(2a+4L)} \right) \hat{u}_x \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \ln \left(\frac{4(a+L)^2}{4a(a+2L)} \right) \hat{u}_x \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \ln \left(\frac{(a+L)^2}{a(a+2L)} \right) \hat{u}_x
 \end{aligned}$$

c)

Transformando la función a expresiones tipo $1 + \frac{L}{a}$:

$$\begin{aligned}
 (a+L) &= \frac{a}{a}(a+L) = a \left(1 + \frac{L}{a} \right) \\
 (a+2L) &= \frac{a}{a}(a+2L) = a \left(1 + \frac{2L}{a} \right)
 \end{aligned}$$

Reemplazando en la función original:

$$\begin{aligned}
 \vec{F} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \ln \left(\frac{a^2(1+\frac{L}{a})^2}{a^2(1+\frac{2L}{a})} \right) \hat{u}_x \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \ln \left(\frac{(1+\frac{L}{a})^2}{(1+\frac{2L}{a})} \right) \hat{u}_x \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(2 \ln \left(1 + \frac{L}{a} \right) - \ln \left(1 + \frac{2L}{a} \right) \right) \hat{u}_x
 \end{aligned}$$

Sabiendo que para $|z| \ll 1$:

$$\ln(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \dots$$

Y considerando $a \gg L$:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(2 \left(\frac{L}{a} - \frac{1}{2} \left(\frac{L}{a} \right)^2 \right) - \left(\frac{2L}{a} - \frac{1}{2} \left(\frac{2L}{a} \right)^2 \right) \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(2 \left(\frac{L}{a} - \frac{L^2}{2a^2} \right) - \left(\frac{2L}{a} - \frac{4L^2}{2a^2} \right) \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(2 \left(\frac{2aL - L^2}{2a^2} \right) - \left(\frac{4aL - 4L^2}{2a^2} \right) \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(\left(\frac{4aL - 2L^2}{2a^2} \right) - \left(\frac{4aL - 4L^2}{2a^2} \right) \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(\frac{4aL - 2L^2 - 4aL + 4L^2}{2a^2} \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L^2} \left(\frac{2L^2}{2a^2} \right) \hat{u}_x \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{a^2} \hat{u}_x\end{aligned}$$