中国化学奥林匹克竞赛初赛讲义 勘误表

(第二次印刷)

王畅 林肃浩

2024-06-08 更新于 2025-06-29

本文档的最新版本可访问 https://cchobook.github.io/supplementary_materials/errata2.pdf 下载.

以下页码等信息参照**浙江大学出版社 2024 年 6 月第二次印刷**之《中国化学奥林匹克竞赛初赛讲义》,ISBN 为 978-7-308-23901-1. 条目结尾为提供反馈的读者署名,若无署名则为作者自行订正.

旧版勘误:第一次印刷(https://cchobook.github.io/supplementary_materials/errata1.pdf)

- ◆ 第 3 页, 例题 1.6 解答第 2 个方程式 原文 CH₂O+MnO₂+4 H⁺ → CO₂+2 Mn²⁺+3 H₂O 更正 CH₂O+2 MnO₂+4 H⁺ → CO₂+2 Mn²⁺+3 H₂O 匿名(利川市 第五中学)
- ◆第 302 页, 注记 原文 环丙酮和环己酮的羰基吸收前者波数小…… 更正 环丙酮和环己酮的羰基吸收前者波数大, 这是因为环丙酮环内张力大, 羰基碳于环内 C-C 键的 p 成分增加, C=O 键的 s 成分增加, 从而增强了 C=O 键. 匿名
- ◆第 354 页, 习题 1.31 答案 原文 所有对亚胺醌结构中的环系均画成苯环结构. 更正 相应环系应为醌式结构, 且第四个反应方程式左侧删去 H₂O, 右侧 OH⁻的系数应为 1. 高语祥(上海外国语大学附属外国语学校)