

# 衡阳师范学院 2018-2019 学年第二学期 化学与材料科学学院化学专业 2020 级 《高等数学 (II)》期末考试试题 A 卷 参考答案及评分标准

考核类型: 闭卷

考试时量: 120 分钟

题号	一	二	三	四	总分	合分人	复查人
总分	15	15	10	60	100		
得分							

学 院
专 业
班 级
学 号
姓 名

得分	评阅人

## 一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1.  $0.3 \times 10^{45} \text{N} =$  ( )  
 A.  $0.3 \times 10^{45}$     B.  $12.3^\circ$     C.  $0.3 \times 10^{45} \text{kg m/s}^2$     D.  $3 \times 10^{45} \text{kg m s}^{-2}$
2. 求初值问题  $y' = y, y(0) = 1$  的特解为  $y =$  ( )  
 A.  $e^x + 1$     B.  $\frac{1}{2}x^2 + 1$     C.  $x^2 + C$ , 其中  $C$  为任意常数    D.  $e^x$
3. 求初值问题  $y' = y, y(0) = 1$  的特解为  $y =$  ( )  
 A.  $e^x + 1$     B.  $\frac{1}{2}x^2 + 1$     C.  $x^2 + C$ , 其中  $C$  为任意常数    D.  $e^x$
4. 求初值问题  $y' = y, y(0) = 1$  的特解为  $y =$  ( )  
 A.  $e^x + 1$     B.  $\frac{1}{2}x^2 + 1$     C.  $x^2 + C$ , 其中  $C$  为任意常数    D.  $e^x$
5. 求初值问题  $y' = y, y(0) = 1$  的特解为  $y =$  ( )  
 A.  $e^x + 1$     B.  $\frac{1}{2}x^2 + 1$     C.  $x^2 + C$ , 其中  $C$  为任意常数    D.  $e^x$

得分	评阅人

## 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 求椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$  在点  $(-2, 1)$  处的切线方程  $x - 2y + 4 = 0$ .
7. 求椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$  在点  $(-2, 1)$  处的切线方程  $x - 2y + 4 = 0$ .

8. 吃饭, 睡觉, 打豆豆.

9. 求椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$  在点  $(-2, 1)$  处的切线方程  $x - 2y + 4 = 0$ .

得分	评阅人

三、判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

10. 若二元函数  $f(x, y)$  在点  $(1, 1)$  处连续, 则其在该点处可微。 ✗

11. 如果常数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 那么  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . ✓

12. 若二元函数  $f(x, y)$  在点  $(1, 1)$  处连续, 则其在该点处可微。 ✗

13. 如果常数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 那么  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . ✓

14. 如果常数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 那么  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . ✓

得分	评阅人

四、解答题 (共 60 分)

15. 试将微分方程  $x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, x > 0$  转换成一阶非齐次线性微分方程的标准形式, 然后使用常数变易法求解, 最后对求得的结果进行验算。

解: 一阶非齐次线性微分方程的标准形式为:  $\frac{dy}{dx} + \frac{-3}{x}y = x$ . .....2 分

先解其对应的齐次线性微分方程  $\frac{dy}{dx} + \frac{-3}{x}y = 0$ . 得:  $y = cx^3$ , 其中  $c$  为任意的实常数。 .....5 分

使用常数变易法将常数  $c$  替换成与  $x$  相关的函数  $c(x)$  代入原微分方程解得:  $\frac{dc(x)}{dx} = \frac{1}{x^2}$ , 即  $c(x) = -\frac{1}{x} + C$ , 其中  $C$  为任意常数。故原微分方程的通解为:

$$y = Cx^3 - x^2, x > 0 \quad \text{其中 } C \text{ 为任意常数。} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

检验: 代入原微分方程, 左边为  $x(3Cx^2 - 2x) = 3Cx^3 - 2x^2$ , 右边为  $x^2 + 3Cx^3 - 3x^2 = 3Cx^3 - 2x^2$ . 验算可得结果正确。 .....10 分

16. 试求出不共线三点  $P(1, -1, 0), Q(2, 1, -1), R(-1, 1, 2)$  所确定的平面的单位法向量。

解: 设法向量为  $\vec{n}$ , 则  $\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (6, 0, 6)$ . .....7 分

故其单位法向量  $\pm \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1)$ . .....10 分

17. 试求出不共线三点  $P(1, -1, 0), Q(2, 1, -1), R(-1, 1, 2)$  所确定的平面的单位法向量。

解: 设法向量为  $\vec{n}$ , 则  $\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (6, 0, 6)$ . .....7 分

故其单位法向量  $\pm \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1)$ . .....10 分

18. 试求出不共线三点  $P(1, -1, 0), Q(2, 1, -1), R(-1, 1, 2)$  所确定的平面的单位法向量。

解: 设法向量为  $\vec{n}$ , 则  $\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (6, 0, 6)$ . .....7 分

故其单位法向量  $\pm \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1)$ . .....10 分

19. 求函数  $f(x, y) = x + y$  在  $g(x, y) = x^2 + y^2 = 1$  限制下的条件最大值与最小值。(提示：可以使用拉格朗日乘数法。)

解：注：此题也可以不使用乘数法。小题可以看几何意义，大题可以用三角函数代换。另外也可以使用从限制条件中解出  $y$  代入  $f$  来解无条件极值。

设  $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda[g(x, y) - 1]$  由
 
$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 1 - 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

.....4 分

由前两式相减得  $x = y$  或者  $\lambda = 0$ (舍去).....5 分

将  $x = y$  代入最后一式得  $x^2 = \frac{1}{2}$ , 所以  $x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}$  或者  $x = y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ .....7 分

于是  $f$  的条件极值为  $f(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2}, f(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\sqrt{2}$ .....9 分

综上所述,  $f$  的最大值为  $\sqrt{2}$ , 最小值为  $-\sqrt{2}$ .....10 分

20. 朱自清是怎么描写时间过得比较快的？

解：去的尽管去了，来的尽管来着；去来的中间，又怎样地匆匆呢？早上我起来的时候，小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊，轻轻悄悄地挪移了；我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了，伸出手遮挽时，他又从遮挽着的手边过去，天黑时，我躺在床上，他便伶伶俐俐地从我身上跨过，从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见，这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

在逃去如飞的日子里，在千门万户的世界里的我能做些什么呢？只有徘徊罢了，只有匆匆罢了；在八千多日的匆匆里，除徘徊外，又剩些什么呢？过去的日子如轻烟，被微风吹散了，如薄雾，被初阳蒸融了；我留着些什么痕迹呢？我何曾留着像游丝样的痕迹呢？我赤裸裸来到这世界，转眼间也将赤裸裸的回去罢？但不能平的，为什么偏要白白走这一遭啊？