

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

上海 数学试卷

考生注意

1. 本场考试时间 120 分钟, 试卷共 4 页, 满分 150 分, 答题纸共 2 页.
2. 作答前, 在答题纸正面填写姓名、准考证号, 反面填写姓名, 将核对后的条形码贴在答题纸指定位置.
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域, 不得错位, 在试卷上作答一律不得分.
4. 用 2B 铅笔作答选择题, 用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题.

一、填空题 (本大题共有 12 题, 满分 54 分, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分)
考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

4 1. 行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为 _____.

4 2. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为 _____.

4 3. 在 $(1+x)^7$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 _____ (结果用数值表示).

4 4. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$, 若 $f(x)$ 的反函数的图像经过点 $(3, 1)$, 则 $a =$ _____.

4 5. 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 1-7i$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

4 6. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_3 = 0$, $a_6 + a_7 = 14$, 则 $S_7 =$ _____.

5 7. 已知 $\alpha \in \left\{-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\right\}$. 若幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 $\alpha =$ _____.

5 8. 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0)$ 、 $B(2, 0)$, E 、 F 是 y 轴上的两个动点, 且 $|\overrightarrow{EF}| = 2$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}$ 的最小值为 _____.

5 9. 有编号互不相同的五个砝码, 其中 5 克、3 克、1 克砝码各一个, 2 克砝码两个. 从中随机选取三个, 则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是 _____ (结果用最简分数表示).

5 10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n+1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 前 n 项和为 S_n . 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{2}$, 则 $q =$ _____.

5 11. 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + ax}$ 的图像经过点 $P\left(p, \frac{6}{5}\right)$ 、 $Q\left(q, -\frac{1}{5}\right)$, 若 $2^{p+q} = 36pq$, 则 $a =$ _____.

5 12. 已知实数 x_1 、 x_2 、 y_1 、 y_2 满足: $x_1^2 + y_1^2 = 1$, $x_2^2 + y_2^2 = 1$, $x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{|x_1 + y_1 - 1|}{\sqrt{2}} + \frac{|x_2 + y_2 - 1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值为 _____.

二、选择题 (本大题共有 4 题, 满分 20 分, 每题 5 分) 每题有且只有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.

5 13. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的动点, 则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 ().


- (A) $2\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $2\sqrt{5}$ (D) $4\sqrt{2}$

5 14. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 的 ().

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

5 15. 《九章算术》中, 称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马. 设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱, 如图. 若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点, 以 AA_1 为底面矩形的一边, 则这样的阳马的个数是 ().

- (A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16



5 16. 设 D 是含数 1 的有限实数集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图像重合, 则在以下各项中, $f(1)$ 的可能取值只能是 ().


- (A) $\sqrt{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) 0

三、解答题（本大题共有 5 题，满分 76 分） 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (本题满分 14 分)

已知圆锥的顶点为 P ，底面圆心为 O ，半径为 2.

- 6
- (1) 设圆锥的母线长为 4, 求圆锥的体积;
- 8
- (2) 设 $PO = 4$, OA 、 OB 是底面半径, 且 $\angle AOB = 90^\circ$, M 为线段 AB 的中点, 如图. 求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小.



.....

.....

.....

18. (本题满分 14 分)

设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = a \sin 2x + 2 \cos^2 x$

- 6
- (1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 求 a 的值;
- 8
- (2) 若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} + 1$, 求方程 $f(x) = 1 - \sqrt{2}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的解.

.....

.....

.....

19. (本题满分 14 分)

某群体的人均通勤时间, 是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时, 某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤. 分析显示: 当 S 中 $x\%$ ($0 < x < 100$) 的成员自驾时, 自驾群体的人均通勤时间为

$$f(x) = \begin{cases} 30, & 0 < x \leq 30, \\ 2x + \frac{1800}{x} - 90, & 30 < x < 100 \end{cases} \quad (\text{单位: 分钟}),$$

而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响, 恒为 40 分钟. 试根据上述分析结果回答下列问题:

- 6
- (1) 当 x 在什么范围内时, 公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?

- 8 (2) 求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式；讨论 $g(x)$ 的单调性，并说明其实际意义.

.....

20. (本题满分 16 分)

设常数 $t > 2$ ，在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F(2,0)$ ，直线 $l: x = t$ ，曲线 $\Gamma: y^2 = 8x$ ($0 \leq x \leq t, y \geq 0$). l 与 x 轴交于点 A 、与 Γ 交于点 B . P 、 Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点.

- 4 (1) 用 t 为表示点 B 到点 F 的距离；
 6 (2) 设 $t=3$ ， $|FQ| = 2$ ，线段 OQ 的中点在直线 FP 上，求 $\triangle AQP$ 的面积；
 6 (3) 设 $t=8$ ，是否存在以 FP 、 FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$ ，使得点 E 在 Γ 上？若存在，求点 P 的坐标；若不存在，说明理由.

.....

21. (本题满分 18 分)

给定无穷数列 $\{a_n\}$ ，若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足：对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ ，都有 $|b_n - a_n| \leq 1$ ，则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”.

- 4 (1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列， $b_n = a_{n+1} + 1, n \in \mathbf{N}^*$ ，判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近，并说明理由；
 6 (2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为： $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 8$ ， $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列，记集合 $M = \{x | x = b_i, i = 1, 2, 3, 4\}$ ，求 M 中元素的个数 m ；
 8 (3) $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列. 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足： $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近，且在 $b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数，求 d 的取值范围.

.....

