

Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf Schuljahr 2022/2023

Die Mandelbrot-Menge

Mathematische Grundlagen und die visuelle Darstellung

verfasst von

Christoph Derszteler

Leistungskurs Mathematik

Betreuerin: Frau Dammers

Abgabetermin: 23.02.2023 12:00 Uhr CET

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Benötiges Vorwissen	4
	2.1 Komplexe Zahlen	4
	2.1.1 Addition von komplexen Zahlen	4
	2.1.2 Multiplikation von komplexen Zahlen	
3	Fazit	6
4	Literatur und Quellen	7
5	Selbstständigkeitserklärung	8
6	Anhang	9

1 Einleitung

Die Mandelbrot-Menge ist verglichen mit anderen mathematischen Phänomenen äußerst bekannt, was nicht nur an ihrer visuellen Attraktivität liegt, sondern vielmehr auch an Benoît Mandelbrot beziehungsweise seinen Intentionen selbst. Dieser sorgte mit seinen vielen Vorträgen und Büchern dafür, dass sich Fraktale, vornehmlich die Mandelbrot-Menge, in der Bevölkerung weit verbreiteten¹. Die Schönheit der Mandelbrot-Menge ist unbestreitbar, jedoch steckt mehr in dieser als nur ansehnliche, sich wiederholende Muster.

Obwohl die Natur mit ihren fraktal-ähnlichen Formationen wie dem Aufbau einer Schneeflocke, dem Verlauf eines Flusses oder die Verteilung von Baumästen [nna] die Inspiration für Mandelbrot war [ZK14], so liegt der Ursprung dieser Arbeit in den für manche simpler erscheinenden, viel moderneren aber dennoch genauso spannenden, computer-generierten Videos², die man im Internet finden kann. Mit unter anderem der Frage, wie diese Videos in Ansätzen generiert werden können und vielem weiteren beschäftigt sich diese Arbeit.

Dafür jedoch und zum vollen Verständnis der Mandelbrot-Menge ist Wissen außerhalb des regulären Schullehrplans erforderlich, das in Kapitel 2 näher erörtert wird. Kapitel 3 beschäftigt sich daraufhin mit der Mandelbrot-Menge selbst und insbesondere mit der Analyse visueller Darstellungen dieser. Abschließend befasst sich diese Arbeit in Kapitel 4 mit der praktischen Anwendung der Mandelbrot-Menge in Form von Bildgenerierungen mithilfe von Computern als auch anderweitigen Zusammenhänge zwischen dem theoretischen, mathematischen Konzept der Mandelbrot-Menge und der realen Welt.

¹[IBM11], Vgl. letzten Absatz.

 $^{^{2}}$ Vgl. bspw. [Tow17].

2 Benötiges Vorwissen

Dieses Kapitel befasst sich mit den benötigten mathematischen Grundlagen, um der restlichen Arbeit beziehungsweise der weiteren Ausführung der Mandelbrot-Menge selbst folgen zu können. Dafür wird zunächst das Konzept der komplexen Zahlen als auch der für den weiteren Verlauf benötigter Umgang mit diesen erörtert. Darauffolgend soll lediglich das Prinzip und die Eigenschaften von Iterationen grob anhand zweier Beispiele skizziert werden.

2.1 Komplexe Zahlen

Unter komplexen Zahlen versteht man die nächst größere Zahlenmenge nach den reellen Zahlen \mathbb{R} , die zusätzlich zu einem Realteil auch einen Imaginärteil besitzen. Sie werden im weiteren Verlauf in der kartesischen Form z = a + bi dargestellt, wobei a der Realteil und bi der Imaginärteil ist. Der Buchstabe i steht hierbei für die imaginäre Einheit und ist definiert durch die Gleichung $i^2 = -1$.

2.1.1 Addition von komplexen Zahlen

Viele Rechenoperationen mit komplexen Zahlen funktionieren anders, als man sie von den reellen oder natürlichen Zahlen gewohnt ist. Zur Addition zwei komplexer Zahlen addiert man den Realteil und den Imaginärteil getrennt voneinander und fügt diesen danach wieder zusammen [Lic02]: $(a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i) = a_1 + a_2 + (b_1 + b_2)i$. Ein illustriertes Beispiel, gegeben sei $z_1 = -3 + 6i$ und $z_2 = 2 + 0.5i$:

$$z_1 + z_2 = (-3 + 6i) + (2 + 0.5i) = (-3 + 2) + (6 + 0.5)i = -1 + 6.5i$$
 (2.1)

2.1.2 Multiplikation von komplexen Zahlen

Die Multiplikation funktioniert ebenfalls nicht so, wie man sie von den reellen Zahlen gewohnt ist. Um komplexe Zahlen zu multiplizieren, bedient man sich statt-

dessen dem Distributivgesetz, indem man den zweiten Faktor erneut in seinen Realteil und seinen Imaginärteil trennt und diese jeweils einzeln mit dem ersten Faktor multipliziert [Lic02]. Die zwei entstehenden Produkte lassen sich dann wie oben beschrieben addieren. Bei der Multiplikation mit dem Imaginärteil multipliziert man unter anderem zwei imaginäre Elemente miteinander. Da $i^2 = -1$ gilt, entsteht durch diese Multiplikation ein negatives, aber reales Produkt. Dadurch gilt:

$$(a+bi)(c+di)$$

$$= c(a+bi) + di(a+bi)$$

$$= ac + bci + adi + bdi^{2}$$

$$= ac + bci + adi - bdi$$

$$= ac - bd + (bc + ad)i$$

$$(2.2)$$

Ein weiteres, illustriertes Beispiel, gegeben sei erneut $z_1 = -3 + 6i$ und $z_2 = 2 + 0.5i$:

$$z_1 \cdot z_2$$

$$= (-3 + 6i) \cdot (2 + 0.5i)$$

$$= (-3 \cdot 2 - 6 \cdot 0.5) + (6 \cdot 2 + (-3) \cdot 0.5)i$$

$$= (-6 - 3) + (12 - 1.5)i$$

$$= -9 + 10.5i$$
(2.3)

Das für die Mandelbrot-Menge besonders wichtige Quadrieren von komplexen Zahlen lässt sich mit der kartesischen Form ebenfalls herleiten. Für eine gegeben, zu quadrierende, komplexe Zahl z_1 gilt:

$$z_1^2 = z_1 + z_1 = (a+bi) \cdot (a+bi) = a \cdot (a+bi) + bi \cdot (a+bi)$$
$$= a^2 + abi + abi - b^2 = a^2 - b^2 + 2abi \quad (2.4)$$

3 Fazit

4 Literatur und Quellen

- [IBM11] IBM. Fractal Geometry. 21. Mai 2011. URL: https://www.ibm.
 com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/fractal/ (besucht am
 16.01.2023).
- [Lic02] Klaus Lichtenegger. Komplexe Analysis. Mai 2002, S. 2-3. URL: https://www.math.tugraz.at/~lichtenegger/kompan.pdf (besucht am 16.01.2023).
- [nna] Mike (nnart). Fractals in Nature. How Do Fractals Appear in Nature?

 10 Outstanding Examples. URL: https://nnart.org/fractals-in-nature/ (besucht am 16.01.2023).
- [Tow17] Maths Town. Eye of the Universe. Eye of the Universe Mandelbrot Fractal Zoom (e1091) (4k 60fps). 28. Aug. 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=pCpLWbHVNhk (besucht am 16.01.2023).
- [ZK14] Iris Zink und Hanna Kotarba. Der kosmische Code. Der kosmische Code. 28. Sep. 2014. URL: https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/faszination-universum-der-kosmische-code-mit-harald-lesch-100.html (besucht am 16.01.2023).

5 Selbstständigkeitserklärung

6 Anhang