

Пятиминутка №1

1. **Расстояние Хэмминга** - число несовпадающих координат векторов $x, y \in E_q^n$, обозначается через $d(x, y) = |\{i \in \{1, \dots, n\} : x_i \neq y_i\}|$.
2. **Вес Хэмминга** - число ненулевых координат вектора x , обозначается: $\omega(x)$, $\omega(x) = d(x, 0)$.
3. **Код** - обозначается через C и является подмножеством кодовых слов: $C \subseteq E_q^n$.
4. **Параметры кода** - $(n, |C|, d)$, где: n - длина кода, $|C|$ - мощность кода, d - минимальное кодовое расстояние, т.е. минимум расстояний по всем парам кодовых слов из C .
5. **Кодер** - биекция из множества информационных сообщений M , $M \subseteq E^k$ в множество кодовых слов C .
6. **Принцип максимума правдоподобия** - пусть для передачи использовался код C , если y - полученный вектор, то декодируем его в ближайшее кодовое слово $x \in C$.
7. **Число исправляемых ошибок** - пусть C код с кодовым расстоянием d , и пусть при передаче кодового слова $x \in C$ возникло не более $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ ошибок, тогда декодер восстановит сообщение.
8. **Число обнаруживаемых ошибок** - пусть C код с кодовым расстоянием d , и пусть при передаче кодового слова $x \in C$ возникло не менее 1 и не более $(d-1)$ и из канала связи получили вектор y . В этом случае кодер может запросить снова передачу данных, так как y - не кодовое слово. То есть код обнаруживает $(d-1)$ ошибок.
9. **Линейный код** - код C называется линейным, если C является векторным подпространством E_q^n .
10. **Размерность линейного кода** C - число векторов в базисе C , обозначается через k .
11. **Параметры линейного кода** - $[n, k, d]$, где n - длина кода, k - размерность, d - минимальное кодовое расстояние.
12. **Кодовое расстояние линейного кода** - оно равно минимальному весу среди ненулевых кодовых слов.

13. **Порождающая матрица** - матрица $G_{k \times n}$ строки которой образуют базис C , называется порождающей матрицей кода C .
14. **Проверочная матрица** - матрица $H_{(n-k) \times n}$ имеющая $n - k$ строк и n столбцов называется проверочной, если выполнено $Hx^T = 0^{n-k} \Leftrightarrow x \in C$.
15. **Порождающая матрица в каноническом виде** - порождающая матрица G называется заданной в каноническом виде, если $G = [E_k | A]$, где E_k - единичная матрица.
16. **Проверочная матрица в каноническом виде** - проверочная матрица H называется заданной в каноническом виде, если $H = [A | E_{n-k}]$, где E_{n-k} - единичная матрица.
17. **Теорема связывающая порождающую и проверочную матрицы** - если $[E_k | A]$ - порождающая матрица в каноническом виде кода C , тогда $[-A^T | E_{n-k}]$ - является проверочной матрицей в каноническом виде кода C . Верно и обратное.

Пятиминутка №2

1. **Теорема о столбцах проверочной матрицы** Пусть H - проверочная матрица линейного кода C . Кодовое расстояние C равно d тогда и только тогда когда любые $d - 1$ столбцов H линейно независимы и существует d линейно зависимых столбцов.

Или кратко:

Пусть H - проверочная матрица линейного кода C , тогда $d_C = d \Leftrightarrow \forall d - 1$ столбцов проверочной матрицы H линейно независимы, и $\exists d$ линейно зависимых столбцов.

2. Замечание 1

* двоичный код с проверочной матрицей H .

Кодовое расстояние C равно 1 тогда и только тогда когда в его проверочной матрице H существует нулевой столбец.

3. **Замечание 2** Кодовое расстояние C равно 2 тогда и только тогда когда в H нет нулевых столбцов и есть пара одинаковых столбцов.
4. **Замечание 3** Кодовое расстояние C равно 3 тогда и только тогда когда в H нет нулевых столбцов, столбцы попарно различны и есть столбец равный сумме двух других.

5. **Код Хэмминга** Пусть $r \geq 2$. Двоичным кодом Хэмминга (с r проверками на четность) называется код с проверочной матрицей H , столбцами которой являются все ненулевые векторы длины r . Параметры кода Хэмминга:

$n = 2^r - 1$ - длина кода;

$k = n - r$ - размерность кода;

$d = 3$ - минимальное кодовое расстояние (все векторы попарно различны, нет нулевых, сумма двух любых столбцов встречается в матрице.)

6. **Граница Хэмминга. Теорема** Пусть C - двоичный код длины n и кодовым расстоянием d . Тогда

$$|C| \leq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} C_n^i}$$

7. **Шар** $B(x, j)$ радиуса j с центром в векторе x называется множество всех векторов, находящихся на расстоянии Хэмминга не более j от x .

Или кратко:

$$B(x, j) = \{y \in E_q^n : d(x, y) \leq j\}$$

8. **Граница Хэмминга для q -значных кодов** Пусть C - q -значный код длины n и кодовым расстоянием d . Тогда

$$|C| \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} C_n^i (q-1)^i}$$

9. q -значный код называется **совершенным** если его мощность достигает границы Хэмминга.

Или кратко:

$C \subseteq E_q^n$ - **совершенный** код, если

$$|C| = \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} C_n^i (q-1)^i}$$

10. Двоичный код Хэмминга является совершенным кодом с $d = 3$.

Длина $n = 2^r - 1$

Мощность кода равна 2^{n-r}

Кодовое расстояние 3

Граница Хэмминга: $2^{n-r} \leq 2^n / (1 + n) = 2^{n-r}$

11. **Теорема (Граница Синглтона)** Пусть C – q -значный код с параметрами $n, |C|, d$. Тогда $\log_q |C| \leq n - d + 1$.
e.g. $C = (000), (111)$
12. **Полный четновесовой код** $\{x : x \in E^n, w(x) = 0(mod 2)\}$ Параметры $n, |C| = 2^{n-1}, d = 2$
13. **Граница Плоткина** Пусть – двоичный код длины n с минимальным расстоянием d , и $2d > n$. Тогда справедливо неравенство

$$|C| \leq 2 \lfloor d/(2d - n) \rfloor$$

Пятиминутка №3

1. **Код Адамара** Рассмотрим код, столбцы порождающей матрицы G которого состоят из всех ненулевых векторов длины k :

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ этот код называется кодом Адамара.}$$

Его параметры: $[2^k - 1, k, 2^k - 1]$

2. **Утверждение(Код Адамара)** Код Адамара имеет параметры $[2^k - 1, k, 2^k - 1]$ и достигает границы Плоткина.
3. **Граница Варшамова-Гилберта** Пусть $\sum_{i=0}^{d-2} C_{n-1}^i < 2^r$. Тогда существует линейный код длины $n, k \geq n - r, d' \geq d$.
4. **Оптимальный код** Код, имеющий максимальную мощность среди всех кодов той же длины и кодовым расстоянием называется **оптимальным**.
5. **Теорема (Конструкция Плоткина)** Пусть C и D коды одинаковой длины n с кодовым расстоянием d_1 и d_2 соответственно. Тогда код $C^{2n} = \{(x, x + y) : x \in C, y \in D\}$ имеет длину $2n$, мощность $|C| * |D|$, кодовое расстояние $\min\{2d_1, d_2\}$.
6. **Утверждение (эквивалентность кода Хэмминга)** Всякий линейный совершенный код с кодовым расстоянием 3 есть код Хэмминга и наоборот.

7. **Эквивалентные двоичные коды** Двоичные коды C и D длины n называются **эквивалентными**, если существует перестановка координатных позиций π и вектор $x \in E^n$, такие что

$$x + \pi(C) = D,$$

где $x + \pi(C)$ определяется как следующий код:

$$\{x + (y_{\pi(1)}, \dots, y_{\pi(n)}) : y \in C\}$$

Обозначим $(y_{\pi(1)}, \dots, y_{\pi(n)})$ через $\pi(y)$.

Перестановка π и сдвиг на x сохраняют расстояние между любыми словами:

$$d(x + \pi(y), x + \pi(y')) = d(\pi(y), \pi(y')) = d(y, y')$$

Поэтому эквивалентные коды имеют одинаковые параметры.

8. **Смежный класс по коду** Если C - линейный код длины n , то **смежным классом** по коду C называется:

$$x + C = \{(x_1, \dots, x_n) + y : y \in C\}$$

для некоторого $x \in E^n$.

9. **Замечание (смежные классы кода Хэмминга)** Коды, эквивалентные коду Хэмминга - все коды Хэмминга (содержащие 0^n) и смежные классы по ним, не содержащие 0^n .
10. **Теорема Васильев, 1962** Пусть C - произвольный двоичный совершенный код длины n с кодовым расстоянием 3 и λ - произвольная функция из кода C в множество $\{0, 1\}$. И пусть $|x| \doteq \omega(x) \bmod 2$. Множество:

$$V_{C,\lambda} = \{(x + y, |x| + \lambda(y), x) : x \in E^n, y \in C\}$$

является совершенным двоичным кодом длины $2 \cdot n + 1$ с кодовым расстоянием 3.

11. **Следствие из теоремы Васильева** Двоичные совершенные коды, не эквивалентные кодам Хэмминга, существуют для любой длины n , $n \geq 15$.

12. **Теорема, Зиновьев, Леонтьев, Титвайнен, 1973** Пусть $q = p^m$ тогда всякий нетривиальный (то есть отличный от всего пространства и имеющий мощность больше 2) совершенный код имеет параметры совпадающие с одним из следующих кодов:
1. q -значный код Хэмминга,
 2. Двоичный код Голя $n = 23, k = 12, d = 7$,
 3. Троичный ($q = 3$) код Голя $n = 11, k = 6, d = 5$.
13. **Лидер смежного класса** - любой вектор наименьшего веса в этом классе.
14. **Утверждение о векторе ошибок** Пусть $y = c + e$ - полученный вектор, $c \in C$. тогда вектор ошибок e принадлежит тому же смежному классу что и y .