

GINECOLOGIA

Menoclim | Menoclim Pro | Discretal | Trial Gel Ginal Cent | Ribastamin 150 | Modifical | Taxus 400 Lactamax | Medilaxan | Misoprost 200 Beta



Rápida biodisponibilidad local del principio activo.

Mayor comodidad de aplicación.

Excelente presentación comercial.

Optima disolución.

Mínima cantidad de excipientes.

ESTRIOL Ovulos 0,5 mg Crema vaginal 0,1 g / 100 g

Terapia estrogénica local en bajas dosis



BENEFICIA A MUJERES CON VEJIGA HIPERACTIVA PREVIENE INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES | RESTAURA EL TROFISMO UROGENITAL

Mejora la satisfacción sexual:

Normaliza la lubricación vaginal. Aumenta el flujo sanguíneo y la sensación en los tejidos vaginales.

Envases con 10 óvulos OPAMI @ IDMA

Envases con 15 g de crema vaginal y aplicador

Mennclim® En el tratamiento de la atrofia vaginal...

RESTABLECE EL BIENESTAR FEMENINO

Dispareunia . Atrofia . Prurito . Incontinencia urinaria . Urgencia miccional

Rápida biodisponibilidad local del principio activo dada la composición farmacéutica de los óvulos vaginales

Mayor comodidad de aplicación que los comprimidos vaginales debido a la forma anatómica de los óvulos.

Excelente presentación comercial que asegura la integridad del producto hasta su aplicación.

Eficacia y seguridad sin efectos sistémicos, no altera los parámetros metabólicos.

Controla los signos y síntomas de la atrofia vaginal

Trial Gel 17 B-ESTRADIOL

Permite el tratamiento con la menor dosis efectiva de estradiol

Efectiva absorción y óptima tolerancia Rápido alivio de la sintomatología menopáusica

NO MANCHA LA PIEL NI LA ROPA Cosméticamente agradable

Envases con 80 g de gel y 2 jeringas dosificadoras OPAMI @ IDMA

Discreta TIBOLONA 1.25 mg. 2.50 mg

El tratamiento oral de la postmenopausia con mayor tolerancia

Mejora la libido . Elimina la sequedad vaginal Aumenta el placer sexual. Reduce el riesgo de fracturas Alivia rápidamente los síntomas vasomotores.

Envases con 30 comprimidos

OPAMI (Ø) ICAA

Ginal Gent cápsulas blandas vaginales

EN INFECCIONES VAGINALES

VAGINOSIS . VAGINITIS . VULVITIS BACTERIANA . CANDIDIASIS TRICHOMONIASIS

Restaura la mucosa vaginal. Combate la infección. Suprime el prurito, dolor y ardor vaginal. Fácil aplicación. Inmediata disolución.

Envase con 6 cápsulas blandas vaginales

METRONIDAZOL
MICONAZOL
NEOMICINA
POLIMIXINA
CENTELLA ASIATICA



Ribastamin 150

Facilita el tratamiento. Aleja las fracturas



Unico bifosfonato por vía oral estudiado específicamente en fracturas de cadera.

Reduce el riesgo de fractura a partir del 6to, mes de tratamiento.

Envases con 1 y 3 comprimidos recubiertos RICP OPAMI O ICMA





The second of th **IBANDRONATO**



Simpleza y eficacia frente a la osteoporosis

OPTIMIZA EL TRATAMIENTO:

Por potencia y eficacia | Por comodidad posológica Por compliance y alto perfil de seguridad

Envases con 1 comprimido recubierto OPAMI @ IDMA

AXUS 400 UI

Refuerza la estructura ósea

Más calcio disponible para el hueso por mayor aporte de vitamina D.

Envases con 30 comprimidos masticables de agradable sabor







Recomendado por la OMS para el manejo médico del aborto

Acción terapéutica: agente uterotónico y de maduración cervical, análogo sintético de la prostaglandina E1 (PGE1).

Indicaciones: dilatación y preparación del cérvix de útero no grávido previa a una histeroscopía u otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina.

Posología: este medicamento debe ser usado por médicos, por vía vaginal. La dosis debe ser adaptada a la respuesta de la paciente y deberá mantenerse siempre a los niveles más bajos que produzcan una respuesta uterina satifactoria.

La posología recomentada es de 2 comprimidos vaginales de 200 mcg (400 mcg) insertados en el fondo del saco vaginal, 2 a 8 horas antes, en úteros sin historia de cesárea previa o cicatrices uterinas.

Contraindicaciones:

Pacientes en las que fármacos oxitóxicos están generalmente contraindicados o en las que las contracciones prolongadas del útero se consideren inapropiadas. Antecedentes de hipersensibilidad al misoprostol, a las prostaglandinas o a alguno de los excipientes de los comprimidos.

Embarazo o sospecha de embarazo.

LABORATORIOS BETA, PIONERO EN MISOPROSTOL

Laboratorios Beta produce y comercializa misoprostol ininterrumpidamente desde 1986.







