


BETA C R A D i

A woman with dark hair in a bun, wearing a light-colored sports bra and leggings, is sitting in a yoga pose (Padmasana) on a dark, textured rock. She is facing away from the camera, looking out over a body of water towards a sunset or sunrise. The sky is a mix of purple, pink, and orange. The large, stylized orange letters 'BETA C', 'R A', and 'D i' are overlaid on the image. A thin orange rectangular border frames the woman and the rock.

CARDIOLOGICA

Ateroclar | Ateronova | Clonax |
Medilaxan | Oxagesic Forte

ATEROCLAR[®]

ATORVASTATIN 10 mg - 20 mg - 40 mg

Proyecto de vida para las arterias

A diferencia de otras estatinas permite su ingesta en cualquier momento del día sin pérdida de potencia.

Amplía el porcentaje de pacientes que logran el objetivo terapéutico.

Es más eficaz para reducir el colesterol LDL y triglicéridos.



Envases con 30 comprimidos recubiertos.

PAMI



ppp

IONA

A
C
L
A
R
E



ATERONOVA®

ROSUVASTATINA 10 mg - 20 mg

Controla las dislipemias

REDUCE EL RIESGO DE INFARTO DE
MIOCARDIO y ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

En prevención cardiovascular Primaria-secundaria /

Perfil lipídico alterado:

- Reduce el colesterol total y LDL
- Incrementa el colesterol HDL
- Reduce los triglicéridos
- Excelente tolerancia y seguridad



1 a 2 comprimidos al día en cualquier momento del día.

Envases con 30 comprimidos recubiertos

OPAMI



IOMA





- Permite un control glucémico adecuado en pacientes insuficientemente controlados con la monoterapia con metformina, o con la combinación de metformina más una sulfonilurea o insulina.
- La combinación de metformina más vildagliptina reduce la HbA1c, la glucemia en ayunas y la glucemia postprandial en comparación con la monoterapia con metformina.
- La combinación de metformina más vildagliptina permite que más pacientes logren un control glucémico adecuado sin experimentar hipoglucemia en comparación con la combinación de metformina más glimepirida.
- El riesgo de hipoglucemia con la combinación de metformina más vildagliptina no aumenta en comparación con la monoterapia con metformina

- Simplifica la dosificación

- Mejora el cumplimiento del tratamiento

AVAMIDE

VILDAGLIPTINA 50 mg

- Mínimo riesgo de hipoglucemia.
 - No produce aumento de peso.
 - Mejora efectivamente el control glucémico.
 - Preserva la función de las células α y β del páncreas.
 - Reduce la lipotoxicidad.
 - Mejora la resistencia a la insulina.
 - Excelente tolerabilidad.
 - **Mínimo potencial de interacciones medicamentosas.**
 - **Puede utilizarse en pacientes con insuficiencia renal moderada, severa y en estadio terminal (50 mg una vez al día).**
- Envases con 30 y 60 comprimidos



AVAMIDE MET

VILDAGLIPTINA | METFORMINA

50 1000

30 y 60 comprimidos
recubiertos



50 850

30 y 60 comprimidos
recubiertos



CLONAX[®]

CLONAZEPAM 0,5 mg - 1 mg - 2 mg

Recupera la serenidad del paciente y su entorno

Rápido control de la ansiedad generalizada.
Eficaz y seguro en trastornos de pánico y fobia social.
Mejora la calidad del sueño.

Envases con 30 y 50 comprimidos bi-ranurados



Otras presentaciones:

CLONAX RAPID: envases con 30 comprimidos sublinguales

OXAGESIC[®] FORTE

DICLOFENAC 50 mg / PARACETAMOL 500 mg

Reduce drásticamente el dolor

Rápido inicio de acción.
Mayor concentración de paracetamol.
Mayor adherencia al tratamiento por mayor actividad analgésica.

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos



MEDILAXAN®

GRANULADO

MUCILAGO DE LLANTEN + SENOSIDOS A y B



Aporta una alta concentración
de fibras a la dieta.

Normaliza naturalmente la función intestinal.

Fibras vegetales purificadas para el tratamiento
del paciente estreñado.

Envases con 250 y 100 gramos de polvo



NO CONTIENE AZUCAR

COMPRIMIDOS

PSYLLIUM + SENOSIDOS



Asegura el resultado entre
las 6 y 8 horas de su toma.

Normaliza el ritmo evacuatorio por
acción directa sobre la motilidad colónica.



Envases con 30 comprimidos recubiertos

AGLUCIDE[®] MR 60

GLICLAZIDA 60 mg

MÁS QUE UN HIPOGLUCEMIANTE

Facilita el cumplimiento del tratamiento
por parte del paciente

Permite un satisfactorio
control metabólico
en tratamientos prolongados.

Posee eficaz acción
hipoglucemiante.

Previene las complicaciones
microvasculares.



Envases con 30 y 60 comprimidos
ranurados de liberación modificada



OPAMI
REG. P.

IOMA



www.laboratoriosbeta.com.ar
betapro@betalab.com.ar
0800-444-2382 (BETA)



6564-CARIOI.9T