

Puede utilizarse en pacientes con insuficiencia renal moderada, severa y en estadío terminal (50 mg una vez al día).

Preserva la función de las células α y β del páncreas.
Reduce la lipotoxicidad.

Mejora la resistencia a la insulina

AVAMIDE MET

50 850 50 1000

Simplif<mark>ica la dos</mark>ificación y mejora el cumplimiento del tratamiento.

VILDAGLIPTINA | METFORMINA

30 y 60 comprimidos recubiertos

La combinación de metformina más vildagliptina reduce la HbA1c, la glucemia en ayunas y la glucemia postprandial en comparación con la monoterapia con metformina.



GLINIDE ROSIGLITAZONA 4 mg - 8 mg Pone a la glucosa donde debe estar

Mejora la sensibilidad a la insulina.

Controla eficazmente la glucemia.

Mínimo riesgo de hipoglucemia.

Efectividad sostenida a largo plazo.

Seguridad cardiovascular comprobada por la FDA.*



Envases con 30 comprimidos recubiertos

* En pacientes con Diabetes Tipo 2 con inadecuada respuesta a otros antidiabéticos o insulina provocó un descenso del riesgo cardiovascular.



OPAMI

CERELUC ** PIOGLITAZONA 15 mg - 30 mg - 45 mg Insulino sensibilizador

Unico hipoglucemiante oral que actúa sobre los receptores PPAR-gama y PPAR-alfa. Normaliza la glucemia. Estimula la secreción de insulina. Reduce la insulinorresistencia. Reduce triglicéridos e incrementa el colesterol HDL.



Envases con 30 comprimidos



OPAMI

SESTRINE® REPAGLINIDA 0,5 mg - 1 mg - 2 mg

No requiere ajustes en pacientes con disfunción renal.

Rápida actividad secretora de insulina. Regula la glucosa postprandial. Corta duración de acción.

Bajo riesgo hipoglucémico.



SESTRINE 0,5 mg: envases con 30 comprimidos SESTRINE 1 mg / 2 mg: envases con 30 y 90 comprimidos



OPAMI

ATEROCLAR®

ATORVASTATIN 10 mg - 20 mg - 40 mg

PROYECTO DE VIDA PARA LAS ARTERIAS

A diferencia de otras estatinas permite su ingesta en cualquier momento del día sin pérdida de potencia.

Amplía el porcentaje de pacientes que logran el objetivo terapéutico.

Es más eficaz para reducir el colesterol LDL y triglicéridos.



Envases con 30 comprimidos recubiertos.



ATERONOVA®

REDUCE EL RIESGO DE:

Infarto de miocardio |
Accidente cerebrovascular |
Reduce la mortalidad |

ROSUVASTATINA 10 mg - 20 mg

CONTROLA LAS DISLIPEMIAS

En prevención cardiovascular

Primaria-secundaria / Perfil lipídico alterado:

Reduce el colesterol total y LDL.

Incrementa el colesterol HDL.

Reduce los triglicéridos.

Excelente tolerancia y seguridad.




Envases con 30 comprimidos recubiertos



OPAMI IOMA





LAGTAWAX®

CABERGOLINA 0,5 mg

LA MEJOR OPCION EN EL CONTROL DE LA SECRECION DE PROLACTINA

El agonista dopaminérgico más potente.

Terapia de primera línea en hiperprolactinemia.

Mayor eficacia para normalizar los niveles de prolactina.

Mayor frecuencia de reducción del volumende prolactinomas.



Envases con 2 y 8 comprimidos ranurados



IOMA OPAMI

RIBASTAMIN® 150

RISEDRONATO SODICO 150 mg

FACILITA EL TRATAMIENTO, ALEJA LAS FRACTURAS

1 sola toma mensual

En mujeres postmenopáusicas con osteoporosis reduce el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales (incluyendo cadera).

Otra presentación:

RIBASTAMIN ® 150 Duo: 1 comprimido recubierto de 150 mg de risedronato y 30 comprimidos masticables de carbonato de calcio y vitamina D₃



Envases con 1 y 3 comprimidos recubiertos



AGLUCIDE MR 60

GLICLAZIDA 60 mg

MAS QUE UN HIPOGLUCEMIANTE

Facilita el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente.

Permite un satisfactorio control metabólico en tratamientos prolongados.

Posee eficaz acción hipoglucemiante.

Previene las complicaciones microvasculares.



Envases con 30 y 60 comprimidos ranurados de liberación modificada









