

LA EVOLUCIÓN EN EL



CONTROL TERAPÉUTICO

EVOLUCION

LEVETIRACETAM
500 mg/1000 mg

Leptam[®]



Mejor calidad de vida



Leptam[®] LEVETIRACETAM
500 mg/1000 mg

LA EVOLUCIÓN EN EL CONTROL TERAPÉUTICO



500 mg

Envases con 30 y 60 comprimidos recubiertos

1000 mg

Envases con 30 comprimidos recubiertos

Eficacia clínica comparable a los antiepilépticos clásicos.

Eficaz tanto en monoterapia como en terapia combinada.

Eficacia clínica sostenida a largo plazo y mejor adherencia al tratamiento.

Rápido ajuste de dosis.

Los niveles plasmáticos alcanzan el estado de equilibrio en pocos días.

Absorción del fármaco no interferida por los alimentos.

Sin interacciones medicamentosas significativas con otros fármacos, incluidos otros antiepilépticos.

Buen perfil de seguridad y tolerabilidad.



Leptam[®]

LEVETIRACETAM 500 mg/1000 mg

LA EVOLUCIÓN EN EL CONTROL TERAPÉUTICO



500 mg

Envases con 30 y 60
comprimidos recubiertos



1000 mg

Envases con 30
comprimidos recubiertos



MONOTERAPIA

El levetiracetam está indicado como monoterapia en el tratamiento de las crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria, en pacientes mayores de 16 años con diagnóstico de epilepsia.

Dosis de inicio

Adultos y mayores de 16 años: 250 mg dos veces al día.

Titulación/ajuste/escalonamiento de dosis

Aumentar a 500 mg dos veces al día tras dos semanas de tratamiento (dosis terapéutica de inicio).

En función de la respuesta clínica, los ajustes de dosis se harán a razón de 250 mg cada 2 semanas.

Dosis máxima diaria: 1500 mg dos veces al día

TERAPIA COADYUVANTE

El levetiracetam está indicado como terapia coadyuvante:

- En el tratamiento de las crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria, en adultos y en niños desde 1 mes de edad con epilepsia.
- En el tratamiento de las crisis mioclónicas en adultos y adolescentes mayores de 12 años con Epilepsia Mioclónica Juvenil.
- En el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias en adultos y adolescentes mayores de 12 años con Epilepsia Generalizada Idiopática.

Dosis de inicio

Terapia concomitante en adultos (≥ 18 años) y adolescentes (de 12 a 17 años) con un peso superior a 50 kg: 500 mg dos veces al día

Titulación/ajuste/escalonamiento de dosis

Aumentar a 500 mg dos veces al día tras dos semanas de tratamiento (dosis terapéutica de inicio).

En función de la respuesta clínica, los ajustes de dosis se harán a razón de 500 mg cada 2 ó 4 semanas.

Dosis máxima diaria 1500 mg dos veces al día

