

BETA NEUROPSIQUIATRIA



Leptam®

LEVETIRACETAM 500 . 1000 mg

LA EVOLUCIÓN
EN EL CONTROL
TERAPÉUTICO

Eficacia clínica sostenida a largo plazo y
mejor adherencia al tratamiento

Su mecanismo de acción único puede hacerlo útil
en los casos en que otros anticonvulsivantes han fallado

Rápido ajuste de dosis

Sin interacciones medicamentosas
significativas con otros fármacos

500 mg:
envases con 30 y 60
comprimidos recubiertos

1000 mg:
envases con 30
comprimidos recubiertos

trexol®



OLANZAPINA 5 mg . 10 mg

PERMITE VIVIR LA REALIDAD

EFICACIA Y SEGURIDAD

COMPRODADAS EN:

| Esquizofrenia en pacientes adultos y adolescentes.

| Trastorno bipolar Tipo I (episodios maníacos o mixtos)

Monoterapia:

Indicada para el tratamiento agudo de episodios maníacos o mixtos asociados al trastorno bipolar Tipo I (DSM IV) en pacientes adultos y adolescentes.

Terapia adjunta con litio o valproato:

Indicada en combinación con litio o valproato en el tratamiento de episodios maníacos o mixtos asociados al trastorno bipolar I (DSM IV).

| En combinación con Fluoxetina

Indicada para el tratamiento de depresión bipolar y para el tratamiento de depresión mayor resistente al tratamiento.



Envases con 28 comprimidos recubiertos



Psicoasten®

PAROXETINA 10 mg . 20 mg . 40 mg

RECUPERA EL EQUILIBRIO EMOCIONAL

Rápido inicio de la acción antidepresiva.

Eficacia, selectividad y potencia comprobadas.

Excelente perfil de tolerancia y seguridad.

Envases con 30 comprimidos recubiertos   

UNA PRESENTACIÓN ADECUADA PARA CADA TRATAMIENTO

Psicoasten® LC

PAROXETINA 12,5 mg . 25 mg . 37,5 mg



Envases con 30 comprimidos de Liberación Controlada   

Dominium®



QUETIAPINA 25 mg . 100 mg . 200 mg

DOMINA LAS MANIFESTACIONES DE LA
ENFERMEDAD

En el tratamiento de ESQUIZOFRENIA y MANIA BIPOLAR
(adolescentes y adultos)

DEPRESION BIPOLAR

Mejora significativamente los
síntomas positivos y negativos
de la esquizofrenia.

No altera la capacidad
cognitiva del paciente.

Envases con 30 comprimidos recubiertos

OPAMI INSSIP

BESTERIA

IOMA

PQP

DOMINIUM® 200 mg QUETIAPINA

DOMINIUM® 100 mg QUETIAPINA

DOMINIUM® 25 mg QUETIAPINA

Axiomat®

ESCITALOPRAM 10 mg . 20 mg

EN COMPRIMIDOS RANURADOS QUE FACILITAN
EL AJUSTE DE DOSIS

CAMBIA LO COTIDIANO

EN EL TRATAMIENTO DE:

Depresión

Fobia social

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno de pánico, con o sin agorafobia

Trastorno obsesivo compulsivo



Envases con 30 comprimidos recubiertos

PAMI IOMA PAP

Clonax® CLONAZEPAM

0,5 mg . 1 mg . 2 mg

SERENIDAD CON ACTIVIDAD

Excelente control de la ansiedad generalizada.

Eficaz y seguro en trastornos de pánico y fobia social.

Envases con 30 y 50 comprimidos bi-ranurados 

OTRA PRESENTACIÓN:

CLONAX RAPID: envases con 30 comprimidos sublinguales

Lotoquis® Simple FENITOÍNA CALCICA



Envases con 50 y 100 comprimidos de 100 mg

Lotoquis® FENITOÍNA 100 mg FENOBARBITAL 100 mg

Envases con 100 comprimidos



Lotoquis® 5 FENITOÍNA 100 mg FENOBARBITAL 50 mg

Envases con 100 comprimidos



Siblix® ARIPIPRAZOL

5 mg . 10 mg . 15 mg

ESTABILIZA EL SISTEMA DOPAMINA-SEROTONINA
CUANDO SE ENCUENTRA ALTERADO



Envases con 30 comprimidos



Psicotil®

SERTRALINA 50 mg . 100 mg

DISFRUTANDO DE UNA VIDA PLENA

INDICADO EN:

Depresión
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)
Ataque de pánico | Fobia social
Trastorno disfórico pre-menstrual
Estrés postraumático



Envases con 30 comprimidos recubiertos **IOMA** |  | 

POSOLOGIA: dosis de 50 a 200 mg/día

Doxaline®

DULOXETINA 30 mg . 60 mg

ACCIÓN DUAL QUE POTENCIA LOS RESULTADOS

Tratamiento del trastorno depresivo mayor.

Tratamiento del dolor neuropático asociado a la neuropatía periférica de origen diabético.

Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada.

Fibromialgia. Dolor musculoesquelético crónico.

DOXALINE 30 mg: envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos

DOXALINE 60 mg : envases con 30 comprimidos recubiertos

IOMA |  | 

Dropicine®

RISPERIDONA

0,5 mg . 1 mg

2 mg . 3 mg



INTEGRA AL PACIENTE A LO COTIDIANO

Eficacia terapéutica con mínima acción sedativa.

Carece de efectos anticolinérgicos y posee una baja incidencia de síntomas extrapiramidales.

Menor modificación del peso corporal con relación a otros antipsicóticos.

Controla la conducta agresiva del paciente.



0,5 mg: envases con 20 comprimidos recubiertos

1 mg . 2 mg . 3 mg: envases con 20 y 60 comprimidos recubiertos

Flocur® ACIDO TOLFENAMICO Flocur® Rapid

EN EL TRATAMIENTO DE DOLOR
DE CABEZA, CEFALEAS Y MIGRAÑAS

Restituye social y laboralmente al paciente,
posibilitando además profilaxis de la crisis
de migrañas recurrentes.

FLOCUR: 20 cápsulas

FLOCUR RAPID: 15 comprimidos ranurados



Lagotran® LAMOTRIGINA

25 mg . 50 mg
100 mg . 200 mg

EFICACIA Y SEGURIDAD COMPROBADAS

EN TRASTORNO BIPOLAR

Actúa en uno de los estadios agudos sin agravar el otro.

Efectivo en la profilaxis, tanto de episodios depresivos como maníacos.

Ha demostrado ser más efectivo que el Valproato en la fase depresiva.

Mantiene al paciente libre de crisis por más tiempo.

EN EPILEPSIA

Efectivo en crisis parciales y generalizadas, incluyendo crisis tónico-clónicas y síndrome de Lennox-Gastaut.

Inhibe la liberación patológica de aminoácidos excitatorios como el glutamato durante la crisis.

Sin interacciones medicamentosas significativas, puede administrarse con DAES o Valproato.



Envases con 30 comprimidos dispersables



Neurex®

Naturalmente efectivo
L-ACETILCARNITINA

NEUROACTIVADOR FISIOLÓGICO CENTRAL Y PERIFÉRICO

Permite tratar eficazmente neuropatías diabéticas sensitivas sintomáticas y asintomáticas.

Comprobada actividad sobre neuropatías autonómicas (gástricas, cardíacas, disfunción sexual).

Su excelente biodisponibilidad, permite administrar una dosis única diaria.

Significativa disminución de la sintomatología dolorosa.

Envases con 40 comprimidos



Neurosomat®

PRAMIPEXOL 0,25 mg . 1 mg

MARCA LA DIFERENCIA

En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y Síndrome de piernas inquietas

Envases con 30 comprimidos ranurados



Brintenal®

SELEGILINA 5 mg

En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
Excelente tolerancia, aún en tratamientos prolongados.

Envases con 60 comprimidos



EN EL TRATAMIENTO DE DEMENCIAS MODERADAS A SEVERAS:
Sólos o asociados mejoran la capacidad cognitiva del paciente

Cristaclar® DONEPECILO 5 mg . 10 mg

AUMENTA LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE

Aumenta la acetilcolina disponible en el cerebro.

Detiene el deterioro cognitivo funcional.

Envases con 30 comprimidos recubiertos



Doble mecanismo de acción. Doble beneficio terapéutico

Conexine® MEMANTINA 10 mg . 20 mg

EXCLUSIVO MECANISMO DE ACCIÓN

Antagoniza la neurotoxicidad inducida por el glutamato.

Favorece la neuroplasticidad.


Envases con 30 comprimidos recubiertos





DESPERTAR INTELIGENTE!

Efectivo en pacientes con excesiva somnolencia diurna asociada con narcolepsia, pacientes con somnolencia asociada al síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño y en el trastorno de sueño ocasionado por turnos rotatorios de trabajo.



AGENTE NO ANFETAMINICO
PROMOTOR DEL DESPERTAR



Vigicer®

MODAFINILO 200 mg

OPAMI
INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD PÚBLICA

Envases con 15 y 30 comprimidos ranurados



www.laboratoriosbeta.com.ar
betapro@betalab.com.ar
0800-444-2382 (BETA)

6607-NPQIU15-T